Octacidomycine, IV: Neue Totalsynthese von *rac*-Octacidomycin und strukturverwandten Oligocarbonsäuren

Octacidomycins, IV: A New Total Synthesis of *rac*-Octacidomycin and Structurally Related Oligocarboxylic Acids

Andreas Krause, Helmut Lackner*

Institut für Organische Chemie der Universität Göttingen, Tammannstraße 2, D-37077 Göttingen

Z. Naturforsch. **53b**, 1043–1050 (1998); eingegangen am 22. Juni 1998

Antibiotics, Octacidomycins, Oligocarboxylic Acids, Synthesis, NMR Data

Following a new strategy, an improved total synthesis of the unique antibiotic octacidomycin (**1**) and of structurally related oligocarboxylic acids was developed (Scheme 1,2). Starting from **3** and the tetraethylester of 1,17-dibromo-6,6,12,12-heptadecane-tetracarboxylic acid (**6**) as a key compound, systematical fragment condensations lead to the nonatriacontane-pentadecacarboxylic acid **11** and hence to the 1,3,9,15,21,27,33,39-nonatriacontane-octacarboxylic acid **1**. The synthetic pathway can easily be modified and generally be applied for the synthesis of a broad variety of hitherto unknown oligocarboxylic acids or their esters, respectively, and even of cyclic analogues (Scheme 2).

Aus *Streptomyces*-Kulturen wurde ein aus sechs C₇-Einheiten und einem terminalen C₅-Teil bestehendes, neuartiges Antibioticum, das Octacidomycin (**1**), isoliert und seine Struktur durch Abbau und Totalsynthese aufgeklärt [1,2]. Die C₃₉-Kohlenwasserstoffkette trägt in fast regelmäßigen Abständen acht Hydroxycarbonylreste als einzige funktionelle Gruppen. Analog aufgebaute Tri- bis Hexacarbonsäuren [2] waren ebenso wie eine auf isoprenoid-artigen C₅-Einheiten basierende Octacarbonsäure mit verkürztem Carboxylgruppenabstand (**2**) antibiotisch inaktiv [3,4]. Da die erste Totalsynthese von **1** [2] sowohl von der Strategie als auch von den Ausbeuten her noch unbefriedigend war und weitere Strukturvarianten aufgebaut werden sollten, wurde eine neue Octacidomycinsynthese nach dem Baukastenprinzip entwickelt. Die Konfiguration der sechs einander sehr ähnlichen Chiralitätszen-

tren von **1** ist nach wie vor ungeklärt, beeinflusst jedoch die antibiotische Aktivität kaum [2].

Ansatzpunkte zur Lösung der bei der ersten Octacidomycin-Synthese aufgetretenen, überwiegend durch den Einsatz von Ethylestern bedingten Probleme hatte bereits der Aufbau des C₅-Typ-Analogs **2** [4] geliefert. Dementsprechend wurden jetzt *ausschließlich* neue, stärker CH-acide [5] Malonesterderivate wie **3**, **8** etc. als Alkylierungskomponenten verwendet, wobei dann durchgehend mit Natriumethanolat als Base – anstatt wie früher mit LDA/HMPTA [2] – gearbeitet werden konnte. Auch entfielen dadurch konkurrierende tertiäre Wasserstoffe innerhalb der Kettenbausteine (bessere Steuerbarkeit und Selektivität der Kupplungsreaktionen), die Zwischenverbindungen wurden achiral und die NMR-Analyse der Produktgemische vereinfachte sich beträchtlich.

* Sonderdruckerfordernungen an Prof. Dr. H. Lackner.

Entscheidend war außerdem die sorgfältige Optimierung der Reaktionsparameter (Tab. I), die zu deutlich höheren Ausbeuten und reineren Produkten führte. Allerdings ließen sich diese Parameter nicht, wie zunächst erhofft, von C₅- auf C₇-Typ-Bausteine übertragen, so daß alle Syntheseschritte erneut in ausgedehnten Serienversuchen optimiert werden mußten.

Die neue Startverbindung, der Heptantetracarbonsäureester **3** (Schema 1), wurde aus Malonsäurediethylester (**5**), 1,5-Dibrompentan (**4**) und frisch bereitetem Natriumethanolat (3:1:2) synthetisiert (Ausb. 73%). Zur Darstellung des Schlüsselbausteins **6** mußte **3** beidseitig mit **4** alkyliert werden. Die „normale“ Reaktionsführung (Deprotonierung von **3**, Alkylhalogenidzugabe) versagte hier jedoch völlig; erst die *inverse* Methode [6] (sehr langsame Deprotonierung der **3/4**-Mischung) führte nach Optimierung der übrigen Parameter (Mengenverhältnis von **3**, **4** und Base: 1 : 6 : 3; s. Tab. I) und der Aufarbeitung in 72-proz. Ausbeute zu **6**. Die dabei als Nebenreaktion erwartete HBr-Eliminierung zum 1,16-Heptadecadien-tetracarbonsäure-tetraethylester blieb hier - im Gegensatz zum C₅-Typ-Analogon [4] - nahezu aus (ca. 1%). Die Umsetzung von **6** mit **5** und Na-

triumethanolat (*inverse* Methode; Tab. I) ergab den Octaethylester **8** (49%) als wichtiges Kupplungsfragment (Schema 1). Der für den Aufbau des Pentadecaesters **10** erforderliche Heptaester **9** war durch Verknüpfung von **6** mit dem Baustein **7** (aus 3-Brompropansäureethylester und **5** [4]) zugänglich (74%). Die Umsetzung äquimolarer Mengen **8** und **9** lieferte schließlich mit **10** die vollständige C₃₉-Basiskette des Octacidomycins (Ausb. 41%) als weißen Feststoff, der strukturkonforme analytische Daten gab. Für die schwierige Verseifung der 15 eng benachbarten Ethoxycarbonylgruppen bewährte sich von zahlreichen Methoden am besten 96-stündiges Kochen in 15-proz. methanolischer KOH (4-facher Überschuß) [4]. Nach Abtrennung des Kaliumchlorids ließ sich die Pentadecarbonsäure **11**, deren NMR-Spektren keine Ethylsignale mehr zeigten, in 83% Ausbeute als weißer, bei 162–165 °C schmelzender Feststoff isolieren. Die anschließende Decarboxylierung durch trockenes Erhitzen auf 140 °C im Vakuum (1 h) führte zum gewünschten *rac*-Octacidomycin (**1**) (Ausb. 68%), dessen spektroskopische Daten denen des Naturstoffes entsprachen. Sowohl **1** als überraschenderweise auch **11** zeigten die bekannte antibakterielle Wirkung gegen *Bac. subtilis* [2].

berer Kettenlängen – zumeist bemerkenswert gute Ausbeuten erzielen. Veränderungen der Basisstruktur der gewünschten Oligocarbonsäuren, d. h. Verkürzung oder Verlängerung des Ethoxycarbonylgruppenabstandes in den Bauelementen (C₅-, C₇-, C₈-Typ) oder auch nur der Austausch von Ethyl- gegen Methyl-ester, erfordern jedoch eine Neuoptimierung der jeweiligen Reaktionsstufen. Dies dürfte sowohl auf Unterschieden in der CH-Acidität als auch auf Veränderungen der sterischen Verhältnisse und den daraus resultierenden Konformationsänderungen der Bausteine beruhen [7]. Die Ausbeuten bei analogen Reaktionen und die Kristallisierbarkeit der Produkte fallen von den konformativ steiferen C₅- zu den beweglicheren C₈-Typ-Verbindungen hin ab.

Insgesamt betrachtet, eröffnen die obigen Synthesen einen effizienten Zugangsweg nicht nur zu dem ungewöhnlich strukturierten Octacidomycin (**1**), sondern auch zu einer sehr interessanten, neuen Gruppe von strukturverwandten linearen und cyclischen Oligocarbonsäuren unterschiedlicher Kettenlänge.

Experimenteller Teil

Allgemeine Angaben vgl. Lit. [4]. Elektrospray-Massenspektren: Finnigan-MAT LCQ. – Ethanol-Trocknung: CaO, Dest. über Mg, Molsieb. Alle Alkylierungsreaktionen in ausgeheizten Apparaturen unter N₂. – Säulenchromatographie (SC): Neutrales Kieselgel (0.063–0.2 mm; J. T. Baker, B. V., Belgien). Standardverhältnis Produkt zu Adsorbens 1:100 (w/w). Solvenssystem (auch für R_f – Werte): Chloroform / Ethylacetat 10:1. – Zu den Plattendiffusionstesten s. Lit. [1]; HHD = Hemmhofdurchmesser bei 6 mm-Plättchen mit ca. 15 µg Substanz.

1,1,7,7-Heptantetracarbonsäure-tetraethylester (**3**)

Die Lösung von 2.3 g (100 mmol) Natrium in 30 ml absol. Ethanol wurde bei 80 °C tropfenweise (0.3 ml/min) mit 23 ml (150 mmol) Malonsäurediethylester (**5**) versetzt. Nach 30 min Rühren bei Siedetemperatur tropfte man innerhalb von 20 min 6.8 ml (50 mmol) 1,5-Dibrompentan (**4**) hinzu und kochte weitere 30 min unter Rückfluß. Der Eindampfdruckstand (i. Vak.) wurde in 120 ml Eiswasser aufgenommen und die Mischung 3mal mit je 50 ml Ether extrahiert. Der mit MgSO₄ getrocknete Gesamtextrakt wurde i. Vak. eingedampft und das Rohprodukt bei 0.01 Torr fraktio-

niert destilliert. Ausb. 73% farbloses Öl. – Der 1.5-fache Überschuß an Malonester unterdrückt weitgehend die Nebenreaktion zum 1,1-Cyclohexandicarbonsäure-diethylester (Sdp. 65 °C/0.01 Torr).

3: Sdp. 168 °C / 0.01 Torr; $n_D^{20} = 1.4443$. – ¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): δ = 1.26–1.40 (m, 6 H, 3-, 4- und 5-CH₂), 1.28 (t, *J* = 7.2 Hz, 12 H, 3'-CH₃), 1.80–1.98 (dt, *J* = 7.0 und 7.6 Hz, 4 H, 2- und 6-CH₂), 3.30 (t, *J* = 7.6 Hz, 2 H, 1- und 7-CH), 4.18 (q, *J* = 7.2 Hz, 8 H, 2'-CH₂). – ¹³C-NMR (50.3 MHz, CDCl₃): δ = 14.09 (C-3'), 27.06 (C-3/C-5), 28.60 (C-2/C-6), 28.87 (C-4), 51.98 (C-1/C-7), 61.30 (C-2'), 169.51 (C-1'). – MS (70 eV): *m/z* (%) = 389 (2) [M + H]⁺, 343 (35) [M – C₂H₅O]⁺, 297 (23), 251 (13), 229 (100), 205 (5), 183 (13), 160 (64), 137 (18), 73 (13).

C₁₉H₃₂O₈ (388.5)

Ber. C 58.74 H 8.00%,

Gef. C 58.28 H 8.00%.

Allgemeine Arbeitsvorschrift (AAV) zur Darstellung von 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 und 19 mit jeweils in Reihenversuchen optimierten Reaktionsparametern:

Die siedende Mischung aus absol. Ethanol (a), CH-acider Komponente (b) und Alkylhalogenid (c) wurde innerhalb der Zugabezeit (t) tropfenweise mit frisch bereiteter 20-proz. Natriumethanolat-Lösung (d) versetzt (Tab. I). Dann wurde noch 30 min gekocht, die Reaktion durch Zugabe von 10 ml Wasser abgebrochen und die erkalte Mischung 2-mal mit je 15 ml Ether und Ethylacetat extrahiert. Der Gesamtextrakt wurde mit MgSO₄ getrocknet, i. Vak. eingedampft und der Rückstand säulenchromatographisch (SC) bzw. durch fraktionierte Destillation bei 0.01 Torr (Dest.) gereinigt. Kristallisierende Produkte wurden aus *n*-Pentan umkristallisiert.

1,17-Dibrom-6,6,12,12-heptadecan-tetracarbonsäure-tetraethylester (**6**)

Farblose Kristalle (1.2 g) vom Schmp. 46 °C. – R_f = 0.75. – ¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃): δ = 1.06–1.25 (m, 8 H, 3-/15- und 4-/14-CH₂), 1.21 (t, *J* = 7.2 Hz, 2 H, 9-CH₂), 1.22 (t, *J* = 7.3 Hz, 12 H, 3'-CH₃), 1.38–1.46 (m, 4 H, 7- und 11-CH₂), 1.76–1.88 (m, 12 H, 2-/16-, 5-/13- und 8-/10-CH₂), 3.37 (t, *J* = 6.8 Hz, 4 H, 1- und 17-CH₂Br), 4.13 (q, *J* = 7.3 Hz, 8 H, 2'-CH₂). – ¹³C-NMR (125.7 MHz, CDCl₃): δ = 14.07 (C-3'), 23.18, 23.79 (C-3/C-15 und C-4/C-14), 28.31 (C-7/C-11), 30.09 (C-9), 32.06, 32.21, 32.34 (C-2/C-16, C-5/C-13 und C-8/C-

Tab. I. Optimierte Reaktionsparameter und Ausbeuten der Alkylierungsreaktionen.

	a [ml]	b	c	d [mmol]	t [min]	Ausb.[%]
6	2.0	2.5	15.0	7.5	240	72
8	5.0	10.9	2.7	13.5	180	49
9	2.0	1.5	1.5	1.5	60	74
10	1.0	0.6	0.6	0.6	80	41
12	2.0	1.3	1.3	1.6	60	43
13	3.0	2.1	0.7	1.4	90	31
14	2.0	1.3	1.3	1.3	60 ^a	20
15	1.0	3.8	5.8	4.8	60	64
16	1.0	0.8	0.8	0.8	30	9
18	4.0	3.3	1.0	12.5	90 ^b	56
19	15.0	8.7	5.8	17.4	240 ^c	43

^a Nach beendeter Zugabe sofort aufgearbeitet; ^b direkt nach dem Weiterkochen i. Vak. eingedampft, Rückstand in 30 ml Wasser aufgenommen; ^c 10 min nach Beendigung der Zugabe mit 15 ml Aceton/Ether (1:1) extrahiert.

10), 33.56 (C-1/C-17), 57.36 (C-6/C-12), 60.99 (C-2'), 171.70 (C-1'). – MS (70 eV): m/z (%) = 685/687/689 (98/100/70) [M + H]⁺, 684/686/688 (3/27/50) [M]⁺, 639/641/643 (35/75/38) [M – C₂H₅O]⁺, 638/640/642 (20/38/30) [M – C₂H₅OH]⁺.

C₂₉H₅₀Br₂O₈ (686.5)
Ber. C 50.74 H 7.34%,
Gef. C 50.93 H 7.30%.

1,1,7,7,13,13,19,19-Nonadecan-octacarbonsäure-octaethylester (8)

1.1 g farbloses Harz (SC), bei < 0.001 Torr 2 d getrocknet. – R_f = 0.65. – ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 0.98–1.19 (m, 8 H, 3-/17- und 4-/16-CH₂), 1.17, 1.20 (2 t, J = 7.2 Hz, 24 H, 3'-CH₃), 1.10–1.29 (m, 8 H, 5-/15- und 8-/12-CH₂), 1.19 (t, J = 7.2 Hz, 2 H, 10-CH₂), 1.67–1.87 (m, 12 H, 2-/18-, 6-/14- und 9-/11-CH₂), 3.22 (t, J = 7.6 Hz, 2 H, 1-/19-CH), 4.10, 4.13 (2 q, J = 7.2 Hz, 16 H, 2'-CH₂). – ¹³C-NMR (50.3 MHz, CDCl₃): δ = 13.80 (C-3'), 23.54, 23.62 (C-3/C-17 und C-4/C-16), 26.87 (C-5/C-15), 28.35 (C-9/C-11), 29.25 (C-8/C-12), 29.94 (C-10), 31.88 (C-6/C-14)*, 31.92 (C-2/C-18)*, 51.68 (C-1/C-19), 57.13 (C-7/C-13), 60.69, 60.97 (C-2'), 169.20, 171.52 (C-1') [8]. – MS (DCI/NH₃): m/z (%) = 878 (1) [M + 2 NH₃]⁺, 794 (8), 406 (100).

C₄₃H₇₂O₁₆ (845.0)
Ber. C 61.12 H 8.59%,
Gef. C 61.01 H 8.66%.

* Zuordnung der Signale vertauschbar.

20-Brom-1,3,3,9,9,15,15-eicosan-heptacarbonsäure-heptaethylester (9)

0.97 g farbloses Harz (SC), bei < 0.001 Torr 2 d getrocknet. – n_D^{20} = 1.4555; R_f = 0.71. – ¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃): δ = 1.10–1.24 (m, 10 H, 3-, 4-, 9-, 14- und 16-CH₂), 1.19–1.26 (m, 21 H, 3'-CH₃), 1.24–1.32 (m, 2 H, 15-CH₂), 1.41–1.47 (m, 4 H, 7- und 17-CH₂), 1.79–1.89 (m, 12 H, 2-, 5-, 8-, 10-, 11- und 13-CH₂), 2.16–2.22 (m, 2 H, 19-CH₂), 2.23–2.28 (m, 2 H, 20-CH₂), 3.38 (t, J = 6.8 Hz, 2 H, 1-CH₂Br), 4.10–4.20 (m, 12 H, 2'-CH₂). – ¹³C-NMR (125.7 MHz, CDCl₃): δ = 14.09 (C-3'), 23.17, 23.79, 23.84, 23.89 (C-3, C-4, C-9, C-14 und C-16), 27.61 (C-19)*, 28.31 (C-7/C-17), 29.56 (C-20)*, 30.16 (C-15), 32.06, 32.21, 32.24, 32.29, 32.33 (C-2, C-5, C-8, C-10, C-11 und C-13), 33.54 (C-1), 56.72, 57.36, 57.40 (C-6, C-12 und C-18), 60.47, 60.92, 60.98, 61.17 (C-2'), 171.18, 171.69, 171.74, 172.73 (C-1'). – MS (DCI/NH₃): m/z (%) = 884/886 (6/8) [M + 2H + NH₄]⁺, 606 (100), 350 (82).

C₄₁H₆₉BrO₁₄ (865.9)
Ber. C 56.90 H 8.03%,
Gef. C 57.00 H 8.08%.

1,1,7,7,13,13,19,19,25,25,31,31,37,37,39-Nonatriacontanpentadecacarbonsäure-penta-decaethylester (10)

388 mg farbloser Feststoff (SC), R_f = 0.62. – ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 1.06–1.23 (m, 18 H, 3-, 4-, 10-, 16-, 22-, 28-, 33-, 34- und 35-CH₂), 1.19–1.30 (m, 45 H, 3'-CH₃), 1.24–1.38 (m, 18 H, 5-, 8-, 12-, 14-, 18-, 20-, 24-, 26- und 30-CH₂), 1.74–1.93 (m, 24 H, 2-, 6-, 9-, 11-, 15-, 17-, 21-, 23-, 27-, 29-, 32- und 36-CH₂), 2.15–2.32 (m, 4 H, 38- und 39-CH₂), 3.29 (t, J = 7.2 Hz, 1 H, 1-CH), 4.08–4.25 (m, 30 H, 2'-CH₂). – ¹³C-NMR (75.5 MHz, CDCl₃): δ = 14.11 (C-3'), 24.00 (C-3, C-4, C-10, C-16, C-22, C-28, C-33, C-34 und C-35), 27.16, 30.27 (C-5, C-8, C-12, C-14, C-18, C-20, C-24, C-26 und C-30), 27.73, 29.59 (C-38 und C-39), 28.65, 32.39 (C-2, C-6, C-9, C-11, C-15, C-17, C-21, C-23, C-27, C-29, C-32 und C-36), 51.98 (C-1), 56.75, 57.43 (C-7, C-13, C-19, C-25, C-31 und C-37), 60.53, 60.96, 61.25 (C-2'), 169.46, 171.20, 171.79 (C-1'). – MS (CI/NH₃): m/z (%) = 1648 (8) [M + 2 H + NH₄]⁺, 1628 (2) [M]⁺, 1576 (12), 246 (100) [10].

C₈₄H₁₄₀O₃₀ (1630.0)
Ber. C 61.89 H 8.66%,
Gef. C 61.98 H 8.65%.

18-Brom-1,1,7,7,13,13-octadecan-hexacarbonsäure-hexaethylester (12)

430 mg farbloses Öl (SC), $n_D^{20} = 1.4680$, $R_f = 0.70$. – $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.08$ – 1.23 (m, 8 H, 4-, 9-, 15- und 16- CH_2), 1.18 – 1.30 (m, 18 H, 3'- CH_3), 1.26 – 1.33 (m, 4 H, 5- und 10- CH_2), 1.38 – 1.48 (m, 4 H, 8- und 12- CH_2), 1.78 – 1.91 (m, 12 H, 2-, 3-, 6-, 11-, 14- und 17- CH_2), 3.29 (t, $J = 7.6$ Hz, 1 H, 1-CH), 3.39 (t, $J = 7.2$ Hz, 2 H, 18- CH_2Br), 4.08 – 4.29 (m, 12 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (125.7 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.08$ (C-3'), 23.21, 23.82, 23.87 (C-4, C-9, C-15 und C-16), 25.17, 28.34 (C-8/C-12), 27.14, 29.48 (C-5/C-10), 28.60, 28.63, 32.18, 32.24, 32.26, 32.36 (C-2, C-3, C-6, C-11, C-14 und C-17), 33.57 (C-18), 51.97 (C-1), 57.39, 57.42 (C-7/C-13), 60.95, 61.01, 61.23 (C-2'), 169.45, 171.71, 171.78 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 782/784 (96/100) $[\text{M} + \text{NH}_4^+]$, 704 (58) $[\text{M} - \text{Br}]^+$; MS (70 eV): m/z (%) = 765/767 (1/1) $[\text{M} + \text{H}]^+$, 685 (2) $[\text{M} - \text{Br}]^+$, 229 (100).

$\text{C}_{36}\text{H}_{61}\text{BrO}_{12}$ (765.8)

Ber. C 56.46 H 8.03%,

Gef. C 56.32 H 7.96%.

1,1,7,7,13,13,19,19,21-

Heneicosannonacarbonsäure-nonaethylester (13)

190 mg farblos, bei 41–43 °C schmelzender Feststoff (SC), $n_D^{20} = 1.4425$, $R_f = 0.62$. – $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.08$ – 1.18 (m, 10 H, 3-, 4-, 10-, 16- und 17- CH_2), 1.21 – 1.29 (m, 27 H, 3'- CH_3), 1.28 – 1.34 (m, 8 H, 5-, 8-, 12- und 15- CH_2), 1.78 – 1.94 (m, 12 H, 2-, 6-, 9-, 11-, 14- und 18- CH_2), 2.18 – 2.25 (m, 2 H, 20- CH_2), 2.37 – 2.42 (m, 2 H, 21- CH_2), 3.29 (t, $J = 7.5$ Hz, 1 H, 1-CH), 4.11 – 4.24 (m, 18 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (50.3 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.07$, 14.20 (C-3'), 23.93 (C-3, C-4, C-10, C-15, C-16 und C-17), 27.18 (C-20)*, 28.67, 32.20 (C-2, C-6, C-9, C-11, C-14 und C-18), 29.57 (C-21)*, 30.25 (C-5, C-8 und C-12), 51.98 (C-1), 57.43 (C-7, C-13 und C-19), 60.97, 61.47 (C-2'), 169.46, 171.78 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 962 (17) $[\text{M} + \text{NH}_4^+]$, 278 (100).

$\text{C}_{48}\text{H}_{80}\text{O}_{18}$ (945.2)

Ber. C 60.99 H 8.53%,

Gef. C 60.13 H 8.42%.

12-Brom-1,1,7,7-dodecan-tetracarbonsäure-tetraethylester (14)

140 mg farbloses Harz (SC), $R_f = 0.68$. – $^1\text{H-NMR}$ (200 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.05$ – 1.41 (m, 18 H, 4-, 9-, 10- CH_2 und 3'- CH_3), 1.34 – 1.56 (m, 4 H, 2- und 6- CH_2), 1.74 – 1.98 (m, 8 H, 3-, 5-, 8- und 11-

CH_2), 3.30 (t, $J = 7.6$ Hz, 1 H, 1-CH), 3.40 (t, $J = 6.8$ Hz, 2 H, 12- CH_2Br), 4.10 – 4.27 (m, 8 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (75.5 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.12$ (C-3'), 23.79, 23.30 (C-4, C-5), 27.14 (C-9), 28.38 (C-10), 28.64 (C-2), 29.53 (C-3), 32.07 (C-6), 32.10 (C-8), 32.40 (C-11), 33.03 (C-12), 52.00 (C-1), 57.41 (C-7), 61.07, 61.30 (C-2'), 169.51, 171.70 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 554/556 (98/100) $[\text{M} + \text{NH}_4^+]$, 477 (75) $[\text{M} + 2 \text{H} + \text{NH}_4^+ - \text{Br}]$; MS (70 eV): m/z (%) = 537/539 (20/18) $[\text{M} + \text{H}]^+$, 229 (100).

$\text{C}_{24}\text{H}_{41}\text{BrO}_8$ (537.5)

Ber. C 53.63 H 7.68%,

Gef. C 54.49 H 7.75%.

8-Brom-3,3,1-octantricarbonsäure-triethylester (15)

1.0 g farbloses Öl (SC), $R_f = 0.68$. – $^1\text{H-NMR}$ (200 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.18$ – 1.27 (m, 2 H, 6- CH_2), 1.18 – 1.35 (m, 9 H, 3'- CH_3), 1.37 – 1.56 (m, 2 H, 5- CH_2), 1.79 – 1.98 (m, 4 H, 4- und 7- CH_2), 2.13 – 2.35 (m, 4 H, 1- und 2- CH_2), 3.38 (t, $J = 6.8$ Hz, 2 H, 8- CH_2Br), 4.07 – 4.25 (m, 6 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (50.3 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.08$, 14.19 (C-3'), 23.19 (C-5), 26.79 (C-6), 27.65 (C-2), 29.58 (C-1), 31.85 (C-7), 32.33 (C-4), 33.57 (C-8), 56.73 (C-3), 60.56, 61.28 (C-2'), 171.12, 172.73 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 426/428 (100) $[\text{M} + \text{NH}_4^+]$, 409/411 (8) $[\text{M} + \text{H}]^+$; MS (70 eV): m/z (%) = 409/411 (1) $[\text{M} + \text{H}]^+$, 335 (5), 260 (100), 186 (37). – Ber. $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{BrO}_6$ (409.32) [9].

1,1,7,7,13,13,19,19,25,25,27-Heptacosan-undecacarbonsäure-undecaethylester (16)

85 mg farbloses Öl (SC), $n_D^{20} = 1.4505$, $R_f = 0.50$. – $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.06$ – 1.29 (m, 12 H, 3-, 4-, 10-, 16-, 22- und 23- CH_2), 1.18 – 1.31 (m, 33 H, 3'- CH_3), 1.28 – 1.40 (m, 12 H, 5-, 8-, 12-, 14-, 18- und 21- CH_2), 1.77 – 1.93 (m, 16 H, 2-, 6-, 9-, 11-, 15-, 17-, 20- und 24- CH_2), 2.15 – 2.32 (m, 4 H, 26- und 27- CH_2), 3.29 (t, $J = 7.6$ Hz, 1 H, 1-CH), 4.07 – 4.25 (m, 22 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (50.3 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.08$, 14.19 (C-3'), 23.77 (C-3, C-4, C-10, C-16, C-21, C-22 und C-23), 27.12, 29.58 (C-5, C-8, C-12, C-14 und C-18), 27.59 (C-26)*, 28.63, 32.77 (C-2, C-6, C-9, C-11, C-15, C-17, C-20 und C-24), 29.50 (C-27)*, 51.98 (C-1), 56.75 (C-7, C-13, C-19 und C-25), 60.53, 61.27 (C-2'), 169.44, 171.20 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 1123 (1), 995 (4), 506 (100) – [10].

$\text{C}_{60}\text{H}_{100}\text{O}_{22}$ (1173.4)

Ber. C 61.41 H 8.59%,

Gef. C 61.79 H 8.71%.

1,1,8,8-Octan-tetracarbonsäure-tetraethylester (18)

1.4 g farblose Flüssigkeit (Dest.), Sdp. 158 °C / 0.01 Torr, $n_D^{20} = 1.4510$. – $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.26\text{--}1.36$ (m, 8 H, 3-/6- und 4-/5- CH_2), 1.28 (t, $J = 7.2$ Hz, 12 H, 3'- CH_3), 1.82–1.94 (dt, $J = 7.0$ und 7.6 Hz, 4 H, 2- und 7- CH_2), 3.30 (t, $J = 7.6$ Hz, 2 H, 1- und 8-CH), 4.20 (q, $J = 7.2$ Hz, 8 H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (125.7 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.11$ (C-3'), 27.20 (C-2/C-7), 28.67 (C-3/C-6), 28.94 (C-4/C-5), 52.02 (C-1/C-8), 61.25 (C-2'), 169.50 (C-1'). – MS (DCI/ NH_3): m/z (%) = 420 (100) [$\text{M} + \text{NH}_4^+$], 340 (10). – Ber. $\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_8$ (402.48) [9].

1,1,7,7,13,13-Cyclooctadecanhexacarbonsäure-hexaethylester (19)

1.7 g farbloses Öl (SC, Dest.), Sdp. 107 °C / 0.01 Torr, $n_D^{20} = 1.4473$, $R_f = 0.27$. – $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): $\delta = 1.24$ (t, $J = 7.0$ Hz, 18H, 3'- CH_3), 1.43 (m, 6H, 4-, 10- und 16- CH_2), 1.49 (tt, $J = 6.5$ und 7.0 Hz, 12H, 3-/5-, 9-/11- und 15-/17- CH_2), 1.97 (t, $J = 7.0$ Hz, 12H, 2-/6-, 8-/12- und 14-/18- CH_2), 4.17 (q, $J = 7.0$ Hz, 12H, 2'- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (125.7 MHz, CDCl_3): $\delta = 14.07$ (C-3'), 22.71 (C-3/C-5, C-9/C-11 und C-15/C-17), 25.21 (C-4, C-10 und C-16), 31.31 (C-2/C-6, C-8/C-12 und C-14/C-18), 54.89 (C-1, C-7 und C-13), 60.97 (C-2'), 171.94 (C-1'). – MS (70 eV): m/z (%) = 684 (1) [M^+], 503 (1), 429 (2), 243 (100), 229 (16), 160 (65).

$\text{C}_{36}\text{H}_{60}\text{O}_{12}$ (684.9)

Ber. C 63.14 H 8.83%,

Gef. C 63.20 H 8.77%.

1,1,7,7,13,13,19,19,25,25,31,31,37,37,39-Nonatriacontan-pentadecacarbonsäure (11)

Zu 4 ml trockenem Methanol wurden 300 mg (184 μmol) **10** sowie 600 mg (11.0 mmol) festes KOH gegeben und die Mischung 4 Tage unter Rückfluß und Luftausschluß erhitzt. Der Eindampfrückstand (i. Vak.) wurde in 5 ml Wasser gelöst und mit 5 ml CHCl_3 gewaschen. Die mit konz. HCl auf pH 1 angesäuerte, dann i. Vak. eingeeingte wäßrige Phase wurde 3-mal mit je 5 ml Toluol und zuletzt mit 5 ml CHCl_3 zur Trockne abgedampft. Der weiße Rückstand wurde 3-mal mit je 5 ml trockenem Aceton ausgekocht, der Extrakt i. Vak. eingeeingt und das rohe **11** durch Molekularsieb-Flash-Chromatographie an „TSK Gel Toyopearl HW 403“ (Firma TosoHaas, Stuttgart; 0.6 bar, Methanol) gereinigt. Ausb. 185 mg (83%) eines weißen, bei 162–165 °C schmelzenden Feststoffes. – $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CD_3OD): $\delta = 1.12\text{--}1.44$ (br.

m, 36 H, 3-, 4-, 5-, 8-, 10-, 12-, 14-, 16-, 18-, 20-, 22-, 24-, 26-, 28-, 30-, 33-, 34- und 35- CH_2), 1.73–1.92 (br. m, 24 H, 2-, 6-, 9-, 11-, 15-, 17-, 21-, 23-, 27-, 29-, 32- und 36- CH_2), 2.08–2.37 (br. m, 4 H, 38- und 39- CH_2), 3.38 (t, $J = 7.0$ Hz, 1 H, 1-CH). – $^{13}\text{C-NMR}$ (50.3 MHz, CD_3OD): $\delta = 25.12$ (C-3, C-4, C-10, C-16, C-22, C-28, C-33, C-34 und C-35), 27.45, 31.23 (C-5, C-8, C-12, C-14, C-18, C-20, C-24, C-26 und C-30), 28.20, 30.27 (C-38 und C-39), 29.84, 33.76 (C-2, C-6, C-9, C-11, C-15, C-17, C-21, C-23, C-27, C-29, C-32 und C-36), 52.83 (C-1), 58.52, 58.73 (C-7, C-13, C-19, C-25, C-31 und C-37), 173.19, 175.68 (C-1'). – Ber. $\text{C}_{54}\text{H}_{80}\text{O}_{30}$ (1209.21) [9, 10]. – Biologische Aktivität: Plattendiffusionstest gegen *B. subt.* (syn.): 16 mm HHD.

1,3,9,15,21,27,33,39-Nonatriacontan-octacarbonsäure (rac.-Octacidomycin) (1)

97 mg (80 mmol) **11** wurden bei 10 Torr 1 h lang auf 140 °C erhitzt. Der Rückstand wurde in möglichst wenig Methanol gelöst und **1** mit trockenem Ether ausgefällt. Weißer, bei 148–151 °C schmelzender Feststoff; Ausb. 49 mg (68%). – $^1\text{H-NMR}$ (200 MHz, CD_3OD): $\delta = 1.05\text{--}1.71$ (br. m, 38 H, 5-, 6-, 7-, 10-, 12-, 14-, 16-, 18-, 20-, 22-, 24-, 26-, 28-, 30-, 32-, 35-, 36-, 37- und 38- CH_2), 1.70–1.95 (br. m, 24 H, 4-, 8-, 11-, 13-, 17-, 19-, 23-, 25-, 29-, 31-, 34- und 39- CH_2), 2.20–2.44 (br. m, 10 H, 1- und 2- CH_2 , 3-, 9-, 15-, 21-, 27- und 33-CH). – $^{13}\text{C-NMR}$ (75.5 MHz, CD_3OD): $\delta = 26.00$ (C-38), 28.18 (C-2), 28.37 (11x CH_2), 29.97 (C-37), 30.05 (C-36), 30.40 (5x CH_2), 32.72 (1x CH_2), 33.33 (1x CH_2), 33.56 (10x CH_2), 34.91 (39- CH_2), 46.04, 46.93 (6x CH), 176.86, 177.71, 179.51, 180.38 (8x C-1'). – ESI-MS (neg.): m/z (%) = 900.5 (100); (pos.): 924.1 (90) [$\text{M} + \text{Na}$] $^+$, 967.8 (100) [$\text{M} + 2\text{Na}$] $^+$. – Biol. Aktivität: Plattendiffusionstest gegen *B. subt.* (syn.): 18 mm HHD.

$\text{C}_{47}\text{H}_{80}\text{O}_{16}$ (901.1)

Ber. C 62.64 H 8.94%,

Gef. C 62.00 H 8.23%.

1,1,7,7,13,13-Cyclooctadecan-hexacarbonsäure (20)

137 mg (0.2 mmol) **19** wurden mit 280 mg (5.0 mmol) KOH und 1.5 ml Methanol wie bei **11** beschrieben verseift und ergaben 83 mg (80%) **20** als weißen, bei 170–175 °C schmelzenden Feststoff. – $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CD_3OD): $\delta = 1.38\text{--}1.53$ (br. m, 6 H, 4-, 10- und 16- CH_2), 1.48–1.61 (br. M, 12 H, 3-/5-, 9-/11- und 15-/17- CH_2), 1.88–2.02 (br. m, 12 H, 2-/6-, 8-/12- und 14-/18- CH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (75.5 MHz, CD_3OD): $\delta = 24.24$ (C-3/C-5, C-9/C-11 und C-15/C-17), 26.68 (C-4, C-10 und

C-16), 33.29 (C-2/C-6, C-8/C-12 und C-14/C-18), 56.93 (C-1, C-7 und C-13), 178.54 (C-1'). – MS (DCI/NH₃): m/z (%) = 428 (11) [M – 2 CO₂]⁺, 163 (100). – Ber. C₂₄H₃₆O₁₂ (516.54) [9, 10]. – Plattendiffusionstest gegen *B. subt.* (syn.): 8 mm HHD.

1,7,13-Cyclooctadecan-tricarbonsäure (21)

52 mg (0.1 mmol) **20** wurden wie bei **1** beschrieben decarboxyliert. Ausb. 28 mg (73%) gelbliches Harz. – ¹H-NMR (200 MHz, CD₃OD): δ = 1.30–1.65 (br. M, 18 H, 3-, 4-, 5-, 9-, 10-, 11-, 15-, 16- und 17-CH₂), 1.81–2.10 (br. m, 12 H, 2-/6-, 8-/12- und 14-/18-CH₂), 2.08–2.38 (br. m, 3 H, 1-, 7- und 13-CH). – ¹³C-NMR (50.3 MHz, CD₃OD): δ = 24.01 (C-3/C-5, C-9/C-11 und C-15/C-17), 26.44

(C-4, C-10 und C-16), 32.61 (C-2/C-6, C-8/C-12 und C-14/C-18), 50.28 (C-1, C-7 und C-13), 175.58 (C-1'). – MS (DCI/NH₃): m/z (%) = 402 (5) [M + NH₄⁺], 336 (20) [M – CH₄O₂]⁺, 262 (100). – Ber. C₂₁H₃₆O₆ (384.51) [9, 10]. – Plattendiffusionstest gegen *B. subt.* (syn.): 9 mm HHD.

Dank

Für die Aufnahme der Massenspektren sind wir Herrn Dr. G. Remberg und Frau Dipl.-Ing. G. Udvarnoki zu Dank verpflichtet. Die zahlreichen NMR-Spektren verdanken wir Herrn Dipl.-Chem. R. Machinek und seinem NMR-Team. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemischen Industrie danken wir für finanzielle Unterstützung.

- [1] K. H. Kerber, H. Lackner, Liebigs Ann. Chem. **1989**, 713–717 (Octacidomycine I); K. H. Kerber, Dissertation, Universität Göttingen (1987).
- [2] K. H. Kerber, H. Lackner, Liebigs Ann. Chem. **1989**, 718–726 (Octacidomycine II); Hexacarbonsäure: F. Sonne, H. Lackner, unveröffentlicht.
- [3] A. Krause, Dissertation, Universität Göttingen (1997).
- [4] A. Krause, H. Lackner, Z. Naturforsch. **50b**, 1550–1556 (1995) (Octacidomycine III). – Die Bezeichnungen C₅-, C₇- und C₈-Typ markieren die Anzahl der zwischen den benachbarten Carboxyl- bzw. Alkoxycarbonylgruppen liegenden C-Atome.
- [5] R. G. Pearson, J. Am. Chem. Soc. **71**, 2212–2214 (1949).
- [6] W. Rupiliew, W. Stein, A. Benning, J. Mußler, H. Tummes, U. Kraatz, S. Linke, Methodicum Chemicum (Hrsg.: F. Korte), Bd. 5, S. 577, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart (1975).
- [7] So läßt sich z.B. kristallstrukturanalytisch zeigen, daß die Bromalkylreste im Schlüsselbaustein **6** (C₇-Typ) bei maximalem Br–Br-Abstand vom gestreckten Mittelteil der Kette her nach oben bzw. unten ragen, während sie beim konformativ steiferen C₅-Typ-Baustein auf *einer* Seite benachbart sind [3]. Die Kristalle wurden durch langsames Eindunsten von Lösungen der Substanzen in *n*-Pentan bei 20 °C und 300 Torr erhalten. – Wir danken Frau Dr. M. Schäfer und Herrn Professor G. M. Sheldrick für die Röntgenstrukturanalysen.
- [8] Die Zuordnung der NMR-Signale basiert auf APT- und H,H-/C,H-Korrelationsspektren sowie auf Vergleichsdaten von zahlreichen Analogsubstanzen; * : Zuordnung der Peaks vertauschbar. Die Signale der langkettigen Verbindungen lassen sich am besten gruppenweise zuordnen (quantitative ¹³C-, T₁-Messungen *etc.*), wie es in Lit. [1,2,4] gezeigt wurde.
- [9] Bei schwer zu reinigenden Ölen wurde z.T. auf C,H-Analysen verzichtet, ebenso bei einigen von der Verseifung her nicht ganz KCl-frei erhältlichen Oligocarbonsäuren.
- [10] Die massenspektroskopische Charakterisierung der im Vergleich zu den C₅-weniger stabilen C₇-Typ-Verbindungen, besonders der freien Carbonsäuren, macht aufgrund starker Fragmentierungen zuweilen große Schwierigkeiten (wenig intensiver oder gar kein Molekülionenpeak). Bei $m/e < ca.$ 400 eignet sich das EI-, darüber das FAB- oder besser das DCI-Verfahren. Immerhin erhält man vom Penta-decaester **10** ($m/e = 1628$) noch ein Molekülion. In Einzelfällen wurde die Elektrospray(ESI)-Methode erfolgreich eingesetzt.