RÉACTIONS RÉTRODIÉNIQUES—XI†

SYNTHÈSE DE COMPOSÉS POLYINSATURÉS RÉACTIFS PAR DOUBLE RÉACTION DE RÉTRO-DIELS-ALDER

M. C. LASNE et J. L. RIPOLL*

ERA 391, Département de Chimie, Université de Caen, 14032 Caen, France

et

J. M. DENIS

Laboratoire de Chimie Organique Physique (ERA 827), USTL,
 59650 Villeneuve d'Ascq, France

(Received in France 21 March 1980)

Abstract—Double retro-Diels-Alder cleavage by flash thermolysis gave the new, unstable polyunsaturated ketones and hydrocarbons 1-5 for which NMR, IR and UV spectra at low temperature are reported. The Diels-Alder adducts of compounds 1-3 with various dienes, the 1,6-additions of several nucleophilic agents with 4, and the isomerisation of 5 in p-ethynylstyrene support the proposed structures.

Bien que la réaction de rétro-Diels-Alder constitue une méthode de choix pour la synthèse de composés polyinsaturés réactifs,¹ ses applications restent généralement limitées à la création d'une seule des insaturations présentes dans la molécule. Dans le but d'éviter des intermédiaires insaturés souvent peu stables, nous avons entrepris d'utiliser une double réaction de rétro-Diels-Alder, déjà signalée² mais restée, à une exception récente près,³ sans application pratique. Par rapport aux autres méthodes de création simultanée de deux doubles liaisons (pyrolyse de sulfones⁴ ou ouverture de cyclobutènes,⁵ par exemple), qui fixent la position relative de ces insaturations, la double réaction de rétro-Diels-Alder, s'effectuant sur des molécules comportant deux adduits indépendants l'un par rapport à l'autre, permet un plus libre choix de la position de ces doubles liaisons. Nous avons ainsi synthétisé différents composés cyclobutaniques et cyclohexadiéniques réactifs non encore décrits (diméthylèneglycylbutanedione-1,3 1, diéthylidèneglycylbutanedione-1,3 2, triméthylèneglycylbutanone 3, méthylène-4 cyclohexadiénone 4 et divinylidène-1,4 cyclohexadiène 5) ou déjà préparés par d'autres voies.

Composés cyclobutaniques

Alors que les diméthylèneglycylbutanediones-1,3 et les di- ou triméthylèneglycylbutanones sont bien connues lorsqu'elles sont substituées sur les doubles liaisons exocycliques (voir entre autres⁷⁻¹⁰), la littérature ne mentionne pas à notre connaissance l'existence de leurs homologues non substitués; on peut toutefois attendre pour ceux-ci une grande réactivité, compte tenu de celle déjà observée pour la méthylène-2 cyclobutanone.^{11,12}

La cyclobutanedione dispiranique 6 (Schéma 1), intermédiaire clef des synthèses de cette série, a été obtenue par la méthode classique¹³ de dimérisation du cétène norbornénique correspondant 7, puis convertie par mono-ou diréaction de Wittig en les composés 8 et 9 [bien que cette réaction s'effectue difficilement sur les cyclobutanediones-1,3¹⁴ et que les rendements obtenus ici soient peu élevés, l'instabilité constatée en milieu acide ou basique pour la dione 6 (voir Partie Expérimentale) n'a pas permis d'utiliser une meilleure méthode de passage à 8 et 9].

La cyclobutanedione dispiranique diméthylée 10 a été préparée de façon semblable à 6 en partant du chlorure de crotonyle.

Schéma 1.

Les doubles adduits de Diels-Alder 6, 8, 9 et 10 éliminent par thermolyse éclair (680°, 5.10⁻⁵ Torr) deux molécules de cyclopentadiène, formé quantitativement dans tous les cas, et conduisent uniquement aux composés attendus 1, 3, 11 et 2 respectivement. Le [4] radicalène 11 a été identifié par comparaison de ses spectres avec ceux décrits.¹⁵ Les structures attendues pour 1, 2 et 3 sont en accord avec l'ensemble de leurs caractéristiques spectrales (Tableau 1); en particulier, les valeurs observées pour les vibrations $\nu_{C=O}$ correspondent à celles attendues

par comparaison avec des diméthylène-cyclobutanones substituées⁷ pour 1 et 2, ou avec la cyclobutanone¹⁶ et les méthylène-2¹¹ et méthylène-3¹⁷ cyclobutanones pour 3.

La réactivité des composés 1-3 vis-à-vis des diènes-1,3 confirme également leur structure: la dione 1 ne se polymérise que lentement à température ambiante sous vide ou azote mais réagit dès environ -100° sur le cyclopentadiène ou -50° sur le cyclohexadiène-1,3 ou le diméthyl-2,3 butadiène-1,3 pour conduire aux doubles adduits attendus 6, 12 ou 13 respectivement

Tableau 1. Caractéristiques spectrales des composés 1-5

Composé	RMN ^1H (δ_{ppm} , TMS)	IR (ν_{max} , cm^{-1}) ^a	UV (λ_{max} , nm) ^b
1	6,13 (s) ^c	3090, 1715, 1630	299 (87), 310 (100), 525 (7) ^f
2	6,86 (q, J = 7,7 Hz, 2 H) 2,26 (d, J = 7,7 Hz, 6 H) ^c	3020, 1700, 1633 ^c	292 (100), 304 (34), 500 (1) ^f
3	5,89 (~s, 2 H) 5,63 (pic unique, 4 H) ^d	3090, 1762, 1670, 1620	362 (50), 373 (80), 382 (84), 398 (100), 422 (29)
4	7,34 (d, J = 10 Hz, 2 H) 6,45 (d, J = 10 Hz, 2 H) 6,15 (s, 2H) ^d	1640, 1625, 1560, 1425, 1335, 940	281
5	6,25 (~s, 4 H) 5,31 (~s, 4 H) ^d	1920 ^e	

^aFilm solide sur NaCl, -196. ^bFilm solide sur silice Suprasil, -196, intensités relatives entre parenthèses; en raison de la présence de cyclopentadiène, seules sont mentionnées les absorptions au dessus de 280 nm. ^cSolution CDCl_3 , -60. ^dSolution CD_2Cl_2 , -95. ^eSpectres enregistrés à 0 dans CDCl_3 (IR) ou CH_2Cl_2 (UV). ^fL'absorption à 357 nm rapportée⁶ pour **1** en solution dans CH_2Cl_2 n'apparaissant pas ici, semble attribuable à un produit d'évolution de ce composé. ^gDans les spectres IR et UV du mélange obtenu par thermolyse de **20** (voir texte) seule la bande IR à 1920cm^{-1} peut être attribuée avec certitude à **5**.

(de façon analogue à **6**, **12** redonne le cyclohexadiène et la dione **1** par thermolyse éclair à 680° , **13** ne conduisant par contre dans ces conditions qu'à des produits non identifiés).

La diéthylidénecyclobutanedione-1,3 **2** ne présente pas, en raison de la substitution des méthylènes, le remarquable caractère diénophile de **1**. Elle ne réagit pas à basse température (-100° à -50°) sur les diènes précédents et conduit, par retour à la température ambiante en présence de cyclopentadiène, à un mélange de stéréoisomères de **10**.

La triméthylénecyclobutanone **3** redonne également en présence de cyclopentadiène son précurseur **8**, mais ne réagit par contre pas avec les autres diènes ci-dessus, moins réactifs, ni avec les diénophiles (tétracyanoéthylène ou acétylédicarboxylate de méthyle).

Composés cyclohexadiéniques

Après avoir obtenu¹⁸ par une double réaction de rétro-Diels-Alder l'hydroxycyclohexadiénone **14**, cétone tautomère de l'hydroquinone, nous avons entrepris de synthétiser par cette méthode quelques autres cyclohexadiènes réactifs: la méthylénecyclohexadiénone **4** et le divinylidénecyclohexadiène **5**, ainsi que le diméthylénecyclohexadiène **15**, déjà isolé par thermolyse du [2.2] paracyclophane^{19,20} (Schéma 2).

Les méthylène-4 cyclohexadiénones ("p-quinone methides"), dont **4** est le premier terme, forment une classe de composés entrant en jeu dans de nombreux produits naturels ou processus biologiques^{21,22} et, en particulier dans la biosynthèse de la lignine.²³ Si la méthylénecyclohexadiénone **4** a fait l'objet d'études théoriques^{24,26} et a été montrée comme intervenant au cours de la déprotection d'un peptide,²⁷ seul son spectre ultraviolet en solution diluée a pu être décrit.²⁸ Quelques autres composés de cette série, peu stables en

raison d'une substitution réduite, ont été caractérisés en solution diluée.²⁹

Le diadduit p-benzoquinone-cyclopentadiène **16**,³⁰ obtenu sous forme d'un seul stéréoisomère,³¹ conduit par réaction de Wittig aux composés **17** et **18**, précurseurs de **4** et **15** respectivement. La double addition par transfert de phase du dibromocarbène sur **18** donne par ailleurs le dérivé tétrabromé **19** qui, traité par le méthyllithium, permet d'isoler le diallène **20**, précurseur de **5**.

Les doubles adduits **17** et **18** donnent uniquement par thermolyse éclair les cyclohexadiènes **4** et **15**, ce dernier ayant été caractérisé par comparaison de ses spectres avec ceux décrits.¹⁹ Les propriétés spectrales de la méthylénecyclohexadiénone **4** (Tableau 1) confirment sa structure: en particulier, l'absorption UV de **4** est en accord avec celle décrite,²⁸ le $\nu_{\text{C}=\text{O}}$ est très proche de celui prédit par le calcul (1645cm^{-1})³² et les déplacements chimiques et couplages observés en RMN correspondent à ceux attendus par comparaison avec les cyclohexadiène-2,5ones³³ et les méthylénecyclohexadiénones substituées.³⁴

Par piégeage sur des matrices de méthylamine, diméthylamine, méthanol, méthyllithium ou bromure d'éthylmagnésium, éventuellement suivi d'hydrolyse, le composé **4** donne lieu à l'addition 1,6 caractéristique des méthylène-4 cyclohexadiénones³⁵ pour conduire avec de bons rendements aux phénols p-substitués **22-26** de structure apparentée à celles de produits naturels.

Le diallène **5**, qui ne semble pas à notre connaissance avoir été signalé dans la littérature mais peut être attendu comme très instable par comparaison avec des vinylallènes³⁶ et diallènes³⁷ connus, a été obtenu par thermolyse éclair du précurseur **20**. Contrairement au cas des composés **1**, **4**, **11** et **15**, isolés, en dehors du

Schéma 2.

cyclopentadiène, à l'état pur et dont la polymérisation (à l'exception de **11** qui conduit à un dimère stable¹⁵) est pratiquement la seule réaction observée par élévation de température (cette polymérisation a été étudiée dans le cas de **15**³⁸) le spectre IR de **5** montre que celui-ci est accompagné dès -196° du p-éthynylstyrène isomère **21** (proportions **5-21** déterminées par RMN à -95° : 1/3-2/3). **5** s'isomérisé totalement par réchauffement à température ambiante en cet isomère qui est obtenu, à côté de goudrons formés au cours de la thermolyse, avec un rendement de 20% par rapport au cyclopentadiène (une

isomérisation semblable d'un vinylallène intermédiaire a été observée³⁹ lors de l'ouverture thermique du benzométhylencyclobutane).

PARTIE EXPERIMENTALE

Tous les composés nouveaux stables rapportés ci-dessous ont donné des analyses élémentaires (C et H $\pm 0,2\%$, autres éléments $\pm 0,4\%$) ou des spectres de masse en accord avec leur formule moléculaire. Les déplacements chimiques, en RMN, sont donnés en δ par rapport au tétraméthylsilane, référence interne; sauf indications contraires les spectres ont été enregistrés dans le deutérochloroforme. Le symbole Δ ,

utilisé dans les schémas, signifie: thermolyse éclair (ici 680 °C, 5.10^{-5} torr).

Les chlorures d'acide utilisés ont été préparés par réaction le Diels-Alder entre le diène et le chlorure d'acryloyle ou de crotonyle. Les chlorures de l'acide norbornéne-carboxylique et de l'acide bicyclo[2.2.2]octène-5-carboxylique sont identiques à ceux décrits.^{40,41} Le chlorure de l'acide méthyl-3 norbornène-5-carboxylique-2 a été obtenu en mélange d'isomères [Rdt: 80%; Eb₁₂: 78-80 °C. IR (CCl₄): $\nu_{C=O}$ 1800, ν_{C-C} 1630 cm⁻¹] et celui de l'acide diméthyl-3,4 cyclohexène-1-carboxylique avec un rendement de 70% [Eb_{0,02}: 54-55 °C; $\nu_{C=O}$ (CCl₄) 1785 cm⁻¹].

Tous les composés spirocyclobutaniques ont été obtenus en mélange d'isomères; la stéréochimie des composés **17**, **18**, **19** et **20** (un seul stéréoisomère) découle de celle du diadduit cyclopentadiène-p-benzoquinone **16**.³¹

Diméthano-1,4; 9,12 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 dione-7,14 6

On opère selon la méthode générale.¹³ Dans un ballon de litre muni d'un agitateur mécanique, d'une ampoule à brome et d'un réfrigérant à reflux, on introduit sous azote 122 g (0,78 mole) de chlorure de l'acide norbornéne-carboxylique, 320 ml d'éther et 320 ml de benzène anhydres. On ajoute goutte à goutte à 0-175 ml (1,26 mole) de triéthylamine. Lorsque l'addition est terminée, le mélange est chauffé à 60 °C pendant 12 h. Après refroidissement et filtration, la solution est lavée deux fois à l'acide chlorhydrique à 10%, puis à l'eau. Après séchage sur sulfate de sodium et évaporation des solvants, on recueille une huile qui cristallise dans l'éther de pétrole. **6** est purifié par sublimation à 70 °C sous 0,1 torr. Rdt: 75-80%; F: 93-96 °C. RMN: 6,3 (m sym., 4 H); 3,55, 3,25, 3,05 (4 H); 2,35-1,15 (8 H). $\nu_{C=O}$ (KBr) 1725 cm⁻¹.

Comportement en milieu basique de la dione 6

(a) Par chauffage de 6 14 h à reflux dans le toluène sec, en présence d'un équivalent de t-butylate de potassium, on obtient après acidification et lavage la dinorbornénylcétone **27**.⁴² RMN (CCl₄): 6,03 (m, 4 H); 3,33-2,57 (5 H); 2,2-1,0 (9 H). $\nu_{C=O}$ (CCl₄) 1690 cm⁻¹.

(b) Par traitement de 6 une heure à température ambiante avec 0,5 équivalent de méthylate de sodium dans le méthanol, on isole le cétostère **28**. RMN (CCl₄): 5,97 (m, 4 H); 3,53 (s, 3 H); 3,23 (m, 1 H); 3,0-2,3 (4 H); 2,1-1,1 (8 H). IR (CCl₄): $\nu_{C=O}$ 1725 et 1695 cm⁻¹, $\nu_{C=C}$ 1600 cm⁻¹. En milieu acide, la dione **6** conduit à un mélange de deux produits non identifiés ne présentant pas la structure β -lactone attendue.⁴³

Diméthano-1,4; 9,12 diméthyl-5,13 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 dione-7,14 10

Par action dans les conditions ci-dessus de la triéthylamine sur le chlorure de l'acide méthyl-2 norbornéne-carboxylique, puis agitation 12 h à température ambiante (on observe en effet dès 60 °C la formation d'un mélange complexe résultant de la réaction d'élimination d'une molécule de cyclopentadiène) on obtient la dione **10**. Rdt: 22%; F: 65-75 °C. RMN: 6,28 (m sym., 4 H); 3,33 (m, 2 H); 2,49 (m, 2 H); 2,25-1,80 (4 H); 1,57, 1,28 (2 H); 1,33 (d, J = 7 Hz, 6 H). $\nu_{C=O}$ (KBr): 1710 cm⁻¹.

Diméthano-1,4; 9,12 méthylène-14 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 dione-7 8

On chauffe une heure à reflux 3,57 g (10 mmole) de bromure de triphénylméthylphosphonium et 1,12 g (10 mmole) de t-butylate de potassium dans 40 ml d'éther isopropylique. Au mélange refroidi à 0 °C, on ajoute 2,40 g (10 mmole) de dione **6** solide. Après 15 minutes d'agitation à température ambiante puis filtration, on précipite l'oxyde de triphénylphosphine par addition de pentane et refroidissement à -20 °C, filtre et évapore le solvant; on obtient ainsi après chromatographie sur gel de silice (éluant: pentane + 2% éther) dans l'ordre de rétention croissante: le diméthylène-cyclobutane **9** (voir ci-dessous) la méthylène-cyclobutanone **8** [Rdt: 3%; F: 46-47 °C. RMN: 6,20 (m sym., 4 H); 4,58 (~s, 2 H); 3,07, 2,85 (4 H); 2,3-1,0 (8 H). IR (CCl₄):

$\nu_{C=O}$ 1760, $\nu_{C=C}$: 1650 cm⁻¹], la dione **6** et l'oxyde de triphénylphosphine.

Diméthano-1,4; 9,12 diméthylène-7,14 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 9

En opérant selon la méthode précédente avec 2,5 équiv. de bromure de triphénylméthylphosphonium et de t-butylate de potassium, on obtient le composé **9**. Rdt: 5%; F: 52-56 °C. RMN (CCl₄): 6,15 (m, 4 H); 4,84-4,40 (4 H); 2,87 (m, 4 H); 2,1-0,9 (8 H). ν_{C-H} , (CDCl₃) 1675 cm⁻¹.

Diéthano-1,4; 9,12 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 dione-7,14 12 et tétraméthyl-2,3,10,11 dispiro [5.1.5.1] tétradécadiène-2,10 dione-7,14 13

Les composés **12** et **13** ont été préparés à partir des chlorures d'acide correspondants selon la méthode décrite pour la dione **6**. **12**: Rdt: 40%; F: 160-165 °C. RMN (CCl₄): 6,27 (m, 4 H); 3,27-2,40 (4 H); 2,1-0,9 (12 H). IR (KBr): $\nu_{C=O}$ 1725; $\nu_{C=C}$ 1610 cm⁻¹. **13**: Rdt: 85%; F: 60-65 °C. RMN: 2,26-1,80 (12 H); 1,58 (~s, 12 H). $\nu_{C=O}$ (KBr) 1720 cm⁻¹.

Diméthano-1,4; 5,8 méthylène-10 octahydro-1,4,4a,5,8,8a,9a,10a 9H, 10H-anthracénone-9 17

On opère par réaction de Wittig sur le diadduit cyclopentadiène-ocenzoquinone **16**³⁰ selon le mode opératoire ci-dessus; après addition de chlorure de méthylène, filtration, lavage à l'eau, séchage et évaporation des solvants, on obtient un résidu qui est purifié par chromatographie sur gel de silice (éluant: éther de pétrole + 10% éther). On isole, dans l'ordre de rétention croissante: le diméthylène-cyclohexane **18** (voir ci-dessous), la méthylène-cyclohexanone **17** [Rdt: 45%; F: 105-109 °C. RMN: 6,10 (m, 4 H); 4,91 (~s, 2 H); 3,2-2,5 (8 H); 1,41 (m, 4 H). IR (KBr): $\nu_{C=O}$ 1685; $\nu_{C=C}$ 1628 cm⁻¹] et l'oxyde de triphénylphosphine.

Diméthano-1,4; 5,8 diméthylène-9,10 octahydro-1,4,4a,5,8,8a,9a,10a 9H, 10H-anthracène 18

On prépare **18** selon le mode opératoire décrit pour le composé **9** et le purifie de l'oxyde de triphénylphosphine par chromatographie sur gel de silice (éluant: éther de pétrole). Rdt: 90%; F: 68-70 °C. RMN (CCl₄): 5,97 (m, 4 H); 4,68 (s, 4 H); 2,88, 2,73 (8 H); 1,40 (m, 4 H). $\nu_{C=C}$ (CCl₄) 1625 cm⁻¹.

Dibromo-2,2 cyclopropane-1-spiro-9'-(diméthano-1',4': 5', 8' octahydro-1', 4', 4'a, 5', 8', 8'a, 9'a, 10'a 9'H, 10'H-anthracène)-10'-spiro-1"-dibromo-2",2"-cyclopropane 19

La réaction par transfert de phase pendant 9 h du dibromocarbène sur le diène **18**, selon le mode opératoire décrit⁴⁴, conduit au dérivé tétrabromé **19**. Rdt: 36%; F: 160-162 °C (d). RMN: 6,43 (m, 2 H); 6,03 (m, 2 H); 3,43 (m, 4 H); 2,75 (m, 2 H); 2,02 (m, 2 H); 1,18 (4 H); 1,81 et 1,04 (AB, J = 8,5 Hz, 4 H). IR (KBr): bandes principales à 1350, 1200, 1018, 755, 675 et 610 cm⁻¹.

Diméthano-1,4; 5,8 divinylène-9,10 octahydro-1,4,4a,5,8,8a,9a,10a 9H, 10H-anthracène 20

En opérant selon Ref. 45 on obtient après traitement par le méthyllithium, hydrolyse, lavage à l'eau glacée jusqu'à neutralité, séchage et évaporation du solvant, le diallène **20** qui est recristallisé dans le pentane. Rdt: 50%; F: 97-98 °C. RMN: 6,10 (m, 4 H); 4,63 (~s, 4 H); 2,83 (m, 8 H); 1,06 (~s, 4 H). $\nu_{C=C}$ (KBr) 1948 cm⁻¹.

Thermolyse éclair des composés 6, 10, 8, 17, 20, 9 et 18. Diméthylène-cyclobutanedione-1,3 1; diéthylidène-cyclobutanedione-1,3 2; triméthylène-cyclobutanone 3; méthylène-4 cyclohexadiénone 4; divinylidène-1,4-cyclohexadiène 5; hydrocarbures 11 et 15.

Les thermolyses ont été effectuées dans les conditions précédemment décrites⁴⁶ à 680 °C sous 5.10^{-5} Torr. Les précurseurs, tous solides et thermiquement peu stables, sont immédiatement vaporisés par introduction dans le tube de thermolyse à l'aide d'une spatule coulissante en verre (quantité thermolysée: 50 à 200 mg).

Les échantillons destinés à la RMN ont été obtenus en piégeant sur matrice de CDCl_3 ou CD_2Cl_2 (0,3 ml) les produits de thermolyse d'environ 50 mg de précurseurs précédents et les spectres immédiatement enregistrés à -60° ou -95° sur un spectromètre Varian A 60 D (Tableau 1). Les spectres IR et UV ont été obtenus par piégeage du produit de thermolyse sur une lame de NaCl ou silice Suprasil maintenue sous vide à -196° dans un cryostat Air Liquide monté à l'extrémité du four de thermolyse, puis enregistrement direct du spectre sur spectromètre PE 157 G (IR) ou JY 201 (UV) (Tableau 1).

La comparaison en RMN des aires du cyclopentadiène formé et d'une quantité connue de benzène montre que la double réaction de rétro-Diels-Alder s'effectue quantitativement dans tous les cas à 680° (température inférieure, on récupère une partie du précurseur non thermolysé; les composés résultant de l'élimination d'une seule molécule de cyclopentadiène n'ont jamais été mis en évidence). Les rendements en **1**, **2** et **4** sont évalués à environ 65% par la quantité d'adduit de Diels-Alder ou de produit d'addition 1,6 correspondant (les réactions **1** $\rightarrow$ **12** ou **13**, **2** $\rightarrow$ **10** et **4** $\rightarrow$ **22-26** étant pratiquement quantitatives). Les faibles rendements en **3** (20%) et **5** (7%), déterminés en RMN par rapport au cyclopentadiène formé, sont attribuables à une polymérisation (et isomérisation en **21** de **5**) déjà importante à la température utilisée (-95°). Les composés déjà décrits ont été obtenus avec des rendements de 65% (**11**) et 20% (**15**) par rapport au cyclopentadiène formé.

Les adduits **12** et **13** ont été préparés en isolant la diméthylène-cyclobutanedione-1,3 **1** du cyclopentadiène par piégeage à -50° (ce dernier n'étant pas condensé à cette température sous le vide utilisé) puis en introduisant à -196° le cyclohexadiène-1,3 ou le diméthyl-2,3 butadiène-1,3. Après remise à pression atmosphérique sous azote et réchauffement à température ambiante, les composés **12** et **13** sont obtenus purs par évaporation de l'excès de diène.

Les produits d'addition-1,6 de la méthylène-4 cyclohexadiénone **4** ont été obtenus en piégeant celle-ci à -196° sur des matrices de méthylamine, diméthylamine ou méthanol. L'évaporation de l'amine ou de l'alcool après réchauffement permet d'isoler respectivement le p-N-méthylaminométhylphénol **22** [RMN: 7,12 et 6,68 (AB, J = 8,5 Hz, 4H), 3,36 (s, 2H); 2,92 (2H échangeables); 2,38 (s, 3H). IR (CDCl_3): 3590, 3340, 1608, 1505 cm^{-1}], le p-N,N-diméthylaminométhylphénol **23** [RMN: 7,08 et 6,64 (AB, J = 9 Hz, 4H); 4,07 (1H échangeable) 3,35 (s, 2H); 2,30 (s, 6H). IR (CDCl_3): 3600, 1608, 1508, 1235, 1180, 1055, 1030 cm^{-1}] et le p-méthoxyméthylphénol **24**⁴⁷ [RMN: 7,18 et 6,73 (AB, J = 9 Hz, 4H); 5,27 (1H échangeable); 4,37 (s, 2H); 3,27 (s, 3H). IR (CDCl_3): 3580, 1595, 1500, 1245, 1155, 1065 cm^{-1}]. En ajoutant au produit de thermolyse de **17**, maintenu sous azote à -196° , une solution de méthyllithium dans l'éther ou de bromure d'éthylmagnésium dans le tétrahydrofurane, on obtient, après retour à la température ambiante, hydrolyse et purification usuelle, les p-éthyl et p-propylphénols **25** et **26**, identifiés par comparaison avec des échantillons commerciaux.

Le p-éthynylstyrène **21**, obtenu par isomérisation du drallène **5**, a été identifié par comparaison de ses spectres IR et de RMN avec ceux précédemment décrits.^{48,49}

Remerciements—Nous remercions le Professeur A. Thuillier pour ses nombreux conseils et suggestions et le Professeur A. Lablache-Combier pour les encouragements et le soutien qu'il a témoigné au cours de ce travail.

REFERENCES

- J. L. Ripoll, A. Rouessac et F. Rouessac, *Tetrahedron* **34**, 19 (1978).
- A. K. Cheng et J. B. Stothers, *Can. J. Chem.* **55**, 4184 (1977).
- J. Jullien, J. M. Pechine, F. Perez et J. J. Piade, *Tetrahedron Letters* 611 (1980).
- F. Vögtle et L. Rossa, *Angew. Chem. Int. Ed.* **18**, 515 (1979).
- S. R. Wilson, L. R. Phillips et K. J. Natalie, *J. Am. Chem. Soc.* **101**, 3340 (1979) et réf. citées.
- Communication préliminaire: J. L. Ripoll et M. C. Lasne, *Tetrahedron Letters* 5201 (1978).
- R. F. C. Brown, F. W. Eastwood et K. J. Harrington, *Aust. J. Chem.* **27**, 2373 (1974) et réf. citées.
- J. M. Conia et J. P. Sandré, *Bull. Soc. Chim. Fr.* **744** (1963).
- R. O. Uhler, H. Shechter et G. V. D. Tiers, *J. Am. Chem. Soc.* **84**, 3397 (1962).
- F. Toda, *Chem. Lett.* 621 (1972).
- M. Mülhstädt et H. Meinhold, *J. Prakt. Chem.* **37**, 162 (1968).
- Ph. Amice et J. M. Conia, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 1015 (1974).
- J. L. E. Erickson, F. E. Collins et B. L. Owen, *J. Org. Chem.* **31**, 480 (1966).
- E. A. LaLancette, *J. Org. Chem.* **29**, 2957 (1964).
- G. W. Griffin et L. I. Peterson, *J. Am. Chem. Soc.* **85**, 2268 (1963).
- L. J. Bellamy, *The Infra-Red spectra of Complex Molecules* (2nd Ed.), p. 149. Wiley, New York (1964).
- P. Dowd et K. Sachdev, *J. Am. Chem. Soc.* **89**, 715 (1967).
- M. C. Lasne, J. L. Ripoll et J. M. Denis, *Tetrahedron Letters* 463 (1980).
- D. J. Williams, J. M. Pearson et M. Levy, *J. Am. Chem. Soc.* **92**, 1436 (1970).
- G. Kaupp, E. Teufel et H. Hopf, *Angew. Chem. Int. Ed.* **18**, 215 (1979).
- A. B. Turner, *Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe*, Vol. 24, p. 288. Springer, Wien (1966).
- P. Grünanger, *Houben-Weyl Methoden der organischen Chemie*, Vol. 7/3b, p. 397 et refs. citées. G. Thieme Verlag, Stuttgart (1979).
- G. Leary, I. J. Miller, W. Thomas et A. D. Woolhouse, *J. Chem. Soc. Perkin II* 1737 (1977) et réf. citées.
- M. Remko et J. Polcin, *Monatsh. Chem.* **108**, 1313 (1977).
- B. Koutek, M. Pisova, M. Soucek et O. Exner, *Coll. Czech. Chem. Comm.* **41**, 1676 (1976).
- L. Musil, M. Pisova, J. Pospisek et M. Soucek, *Ibid.* **41**, 2238 (1976).
- D. S. Kemp et D. C. Roberts, *Tetrahedron Letters* 4629 (1975).
- J. Pospisek, M. Pisova et M. Soucek, *Coll. Czech. Chem. Comm.* **40**, 142 (1975).
- L. J. Filar et S. Winstein, *Tetrahedron Letters* 9 (1960).
- W. Albrecht, *Ann. Chem.* **348**, 31 (1906).
- R. Brown, J. M. Bruce, D. W. Hudson et O. S. Mills, *J. Chem. Soc. Perkin II* 132 (1974).
- B. Koutek, L. Musil, L. Pavlickova, S. Vasickova et M. Soucek, *Coll. Czech. Chem. Comm.* **44**, 2970 (1979).
- L. K. Dyal et S. Winstein, *J. Am. Chem. Soc.* **94**, 2196 (1972).
- A. J. Waring, *Advances in Alicyclic Chemistry*, p. 129. Hart & Karabatsos, Academic Press, New York (1966).
- Réf. 22, p. 505 et Réf. citées.
- J. P. Dulcere, M. L. Roumestant et J. Goré, *Tetrahedron Letters* 4465 (1972).
- P. Blicke et H. Hopf, *Ibid.* 449 (1978).
- L. A. Errede, R. S. Gregorian et J. M. Hoyt, *J. Am. Chem. Soc.* **82**, 5218 (1960).
- R. F. C. Brown, F. W. Eastwood, K. J. Harrington et G. L. McMullen, *Aust. J. Chem.* **27**, 2393 (1974).
- W. E. Parham, W. T. Hunter et R. Hanson, *J. Am. Chem. Soc.* **73**, 5068 (1951).
- C. A. Grob, H. Kny et A. Gagneux, *Helv. Chim. Acta* **40**, 130 (1957).
- C. W. Bird, R. C. Cookson, J. Hudec et R. O. Williams, *J. Chem. Soc.* 410 (1963).
- R. H. Hasek, R. D. Clark, E. U. Elam et J. C. Martin, *J. Org. Chem.* **27**, 60 (1962).
- J. L. Ripoll, *Tetrahedron* **33**, 389 (1977).
- L. Skattebøl, *Acta Chem. Scand.* **17**, 1683 (1963).
- J. L. Ripoll, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 2567 (1974).
- H. Hayashi et S. Oka, *Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ.* **52**, 514 (1974).
- G. K. Hamer, I. R. Peat et W. F. Reynolds, *Can. J. Chem.* **51**, 897 (1973).
- D. Braun et H. G. Keppler, *Monatsh. Chem.* **94**, 1251 (1963).