Tab. 4: Äthanolysenprodukte von 1

Nr.	Formel	Ausb. %	Schmp.°	IR (KBr) cm^{-1}		Summenformel (Mol.-Masse)
				(C=N)	(C=N)	
8.1	2Aa	85 ^{a)}	259–260	1690	1620	$\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_2$ (259,3)
8.3	2Ab	90	209–211	1690	1620	$\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{ClN}_3\text{O}_2$ (293,8)
8.4	2Ba	95	233–235	1710	1620	$\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}_2$ (219,2)

a) nach 8.2 in 90 % Ausbeute

dann aus 50 Proz. Äthanol umkristallisiert. Ausbeute 75 % d. Th., Schmp. 175–177°. Eisen(III)-chlorid: blaue Farbreaktion. IR (KBr): 1660 cm^{-1} (C=N). $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{OS}$ (275,4).

11. 1-Hydroxy-4-imino-5,5-dimethyl-3-phenyl-2-imidazolidinthion (12Ba)

Aus je 30 mmol 3B und Phenylisothiocyanat in wasserfreiem Benzol bei 20°. Der Niederschlag wurde aus Benzol umkristallisiert. Ausbeute 45 % d. Th., Schmp. 128–130°. Eisen(III)-chlorid: blaue Farbreaktion. IR (KBr): 1650 cm^{-1} (C=N). $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{OS}$ (235,3).

Anschrift: Dr. U. Krüger, Prof. Dr. G. Zinner, Beethovenstraße 55, 3300 Braunschweig. [Ph 817]

Arch. Pharm. (Weinheim) 311, 47–51 (1978)

Bernard Unterhalt, Edmar Seebach und Dieter Thamer

Substituierte 1,2,4,6-Thiatriazacyclohexan-1,1-dioxide

Aus dem Fachbereich Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität Marburg/Lahn (Eingegangen am 21. Februar 1977)

1,3-Dimethylsulfuryldiamid (3) reagiert mit Formaldehyd und primären Aminen zu Thiatriazacyclohexan-1,1-dioxiden 5. Mit 1,2-Diaminoäthan ist eine zweifache Kondensation zu 6 möglich.

Substituted 1,2,4,6-Thiatriazacyclohexane 1,1-dioxides

1,3-Dimethylsulfuryldiamide (3) reacts with formaldehyde and primary amines to yield thiatriazacyclohexane 1,1-dioxides 5. With 1,2-diaminoethane 6 is formed by double condensation.

Bei unseren Arbeiten über synthetische Süßstoffe stellten wir neben Cycloalkylsulfaminsäuren und deren Salzen u. a. auch symmetrische Sulfuryldiamide **1** dar¹⁾. Diese den Harnstoffen analogen Verbindungen lassen sich mit (substituierten) Malonsäuredichloriden erwartungsgemäß zu **2** cyclisieren²⁾, Substanzen, die z. Teil anti-tyretisch und angetisch wirksam sind³⁾.

1 z. B. R = Cycloalkyl, R' = H, Alkyl **2**

Eine weitere Cyclisierung sollte möglich sein, wenn man **1** mit Formaldehyd und primären Aminen nach *Mannich* kondensiert. Bisher wurde u. W. lediglich die Umsetzung zwischen dem Grundkörper Sulfamid (**1**: R = H), Formaldehyd und Ammoniak bzw. primären Aminen genau beschrieben²⁾⁴⁾⁵⁾.

Wir brachten 1,3-Dimethylsulfuryldiamid (**3**), das u. a. aus Methylamin und Sulfurylchlorid bei tiefen Temperaturen zu gewinnen ist⁶⁾⁷⁾⁸⁾, mit den Aminen **4** und Formaldehyd in wäßrig-äthanol. Lösung zur Reaktion und konnten die 1,2,4,6-Thiatriaza-cyclohexan-1,1-dioxide **5** durchweg als farblose Kristalle von definierten Schmelzpunkten isolieren. **5b-d** bilden im Feinvakuum destillierbare Flüssigkeiten.

4/5	R''	4/5	R''
a	CH ₃	g	C ₆ H ₅ CH ₂
b	C ₂ H ₅	h	C ₆ H ₅
c	n-C ₃ H ₇	i	H ₃ CO-C ₆ H ₄
d	i-C ₃ H ₇	k	H ₃ C-C ₆ H ₄
e	i-C ₄ H ₉	l	Cl-C ₆ H ₄
f	C ₆ H ₁₁		

1 B. Unterhalt und L. Böschmeyer, Z. Lebensm. Unters. Forsch. 145, 93 (1971).

2 A. M. Paquin, Angew. Chem. 60, 316 (1948).

3 H. Teufel, U. S. 2.956.997, s. C. A. 55, 8446f (1961).

4 H. Petersen, Synthesis 1973, 253.

5 B. S. Thyagarajan und J. B. Kang, J. Heterocycl. Chem. 11, 681 (1974).

6 A. P. N. Franchimont, Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 3, 417 (1884).

7 R. Ohme und H. Preuschhof, Justus Liebigs Ann. Chem. 713, 82 (1968).

8 M. Bermann und J. R. v. Wazer, Synthesis 1972, 576.

Mit Ammoniak und Hydrazin sowie mit 1,1-Dimethylhydrazin mißlang diese Reaktion, mit 1,2-Diaminoäthan erhielten wir durch zweifache Kondensation die Verbindung 6.

6

Die dargestellten Substanzen 5 bzw. 6 zeigen im IR-Spektrum insbesondere die symmetrische und asymmetrische SO_2 -Streckschwingung bei 1150 cm^{-1} und 1330 cm^{-1} , im $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum treten die erwarteten Signale auf, wobei der aromatische Rest in der 4-Position bei 5h–5l die Methylenprotonen deutlich entschirmt und die Methylprotonen etwas zu höherer Feldstärke verschiebt (s. Exp. Teil).

Dem Fonds der Chemie danken wir für seine großzügige Unterstützung.

Experimenteller Teil

Geräte: NMR-Spektrometer A 60 A und T 60 Varian (TMS als int. Stand., $\delta = 0$ ppm, 40°), IR-Spektralphotometer 257 Perkin-Elmer, Linström-App. (Schmp. unkorrt.), CHN-Autoanalyser Hewlett-Packard bzw. CH-Analysator n. Salzer, S-Best. n. Schöniger.

Darstellung von 1,3-Dimethylsulfonyldiamid (3)

In einem 1l-Dreihalskolben mit KPG-Rührer, Tropftrichter und Rückflußkühler werden unter Feuchtigkeitsausschluß 325 g trockenes Methylamin in 500 ml trockenem Diäthyläther gelöst. Man kühlt auf etwa -70° ab und läßt innerhalb 2 Std. 350 g frisch dest. Sulfonylchlorid in etwa 100 ml trockenem Diäthyläther hinzutropfen. Nach dem Entfernen der Kühlung wird noch etwa 2 Std. bei Raumtemp. weitergerührt. 3 befindet sich neben Methylammoniumchlorid im abgetrennten Kristallisat, das 3 mal je 2 Std. mit 200 ml siedendem Dichlormethan extrahiert wird. Nach Verdampfen des Lösungsmittels kristallisiert man aus Methanol/Äther um und erhält Kristallnadeln vom Schmp. $77-78^\circ$. Ausb.: 140 g (44 % d. Th.).

IR (KBr): 3280 cm^{-1} ($>\text{NH}$), $1150\text{ cm}^{-1}/1315\text{ cm}^{-1}$ ($-\text{SO}_2-$)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 2,73 (s, 2 x CH_3), 4,66 (breites s, 2 H).

1,2,4,6-Thiatriazacyclohexan-1,1-dioxide 5

Allg. Vorschrift: 0,03 Mol 3 (3,7 g) und 0,03 Mol Amin (u. a. 2,4 g 40proz. Methylamin-Lsg.) werden in etwa 50 ml 50 proz. Äthanol gelöst – in vielen Fällen läßt sich die Reaktion allein in Gegenwart v. 0,2 Mol Wasser (5c, 5f, 5g, 5h) durchführen, bei 5i–5l reicht etwas Äthanol als Lösungsmittel –, bei $5-10^\circ$ unter ständigem Rühren tropfenweise mit 0,06 Mol 35 proz. Formaldehyd-Lsg. versetzt und danach 2 Std. bei Raumtemp. gerührt. Man schüttelt mit Diäthyläther aus, trocknet über Calciumchlorid, engt ein und kristallisiert aus Äthanol/Äther um bzw. destilliert i. Hochvak.

2,4,6-Trimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5a)

Ausb.: 2,0 g (37 % d. Th.), Schmp. 41–43°, farblose Kristallnadeln.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,57 (s, 3H), 2,81 (s, 6H), 4,05 (s, 4H).

C₅H₁₃N₃O₂S (179,2) Ber.: C 33,51 H 7,31 N 23,44 S 17,89; Gef.: C 33,51 H 7,40 N 23,71 S 17,93.

4-Äthyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5b)

Ausb.: 2,3 g (40 % d. Th.), Sdp._{0,15} = 64–66°, n_D²⁰ = 1,4812.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 1,07 (tr, J = 7 Hz, 3H), 2,78 (s, 6H), 2,87 (qu, J = 7 Hz, 2H), 4,03 (s, 4H).

C₆H₁₅N₃O₂S (193,3) Ber.: C 37,29 H 7,82 N 21,74 S 16,59; Gef.: C 37,20 H 7,87 N 21,70 S 16,32.

4-n-Propyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5c)

Ausb.: 5,5 g (88 % d. Th.), Sdp._{0,2} = 115–117°, n_D²⁰ = 1,4796.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0,92 (tr, J = 6 Hz, 3H), 1,2–1,9 (m, 2H), 2,73 (tr, J = 5 Hz, 2H), 2,85 (s, 6H), 4,14 (s, 4H).

C₇H₁₇N₃O₂S (207,3) Ber.: C 40,56 H 8,27 N 20,27 S 15,47; Gef.: C 40,68 H 8,09 N 20,37 S 15,46.

4-i-Propyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5d)

Ausb.: 3,8 g (61 % d. Th.), Sdp._{0,2} = 114–116°, n_D²⁰ = 1,4802.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 1,10 (d, J = 6 Hz, 6H), 2,83 (s, 6H), 3,05 (sept, J = 6 Hz, 1H), 4,10 (s, 4H).

C₇H₁₇N₃O₂S (207,3) Ber.: C 40,56 H 8,27 N 20,27 S 15,47; Gef.: C 40,05 H 8,21 N 21,04 S 15,49.

4-i-Butyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5e)

Ausb.: 4,0 g (60 % d. Th.), Schmp. 41–43°, farblose Kristallnadeln.

C₈H₁₉N₃O₂S (221,3) Ber.: C 43,42 H 8,65 N 18,99 S 14,49; Gef.: C 43,32 H 8,70 N 19,01 S 14,62.

4-Cyclohexyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5f)

Ausb.: 2,5 g (34 % d. Th.), Schmp. 43–44°, farbloses Pulver aus Äthanol/Petroläther.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 1,0–2,0 (m, 11H), 2,83 (s, 6H), 4,17 (s, 4H).

C₁₀H₂₁N₃O₂S (247,4) Ber.: C 48,57 H 8,56 N 16,99 S 12,94; Gef.: C 48,51 H 8,14 N 17,24 S 13,26.

4-Benzyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5g)

Ausb.: 3,1 g (40 % d. Th.), Schmp. 104–105°, farblose Kristalle.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,87 (s, 6H), 4,04 (s, 2H), 4,13 (s, 4H), 7,37 (s, 5H).

C₁₁H₁₇N₃O₂S (255,3) Ber.: C 51,74 H 6,71 N 16,46 S 12,56; Gef.: C 51,66 H 6,36 N 16,79 S 12,56.

4-Phenyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5h)

Ausb.: 3,8 g (52 % d. Th.), Schmp. 124–125°.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,67 (s, 6H), 4,75 (s, 4H), 7,12 (m, 5H).

C₁₀H₁₅N₃O₂S (241,3) Ber.: C 49,77 H 6,27 N 17,41 S 13,29; Gef.: C 49,81 H 6,29 N 17,37 S 13,47.

4-p-Methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5i)

Ausb.: 3,9 g (48 % d. Th.), Schmp. 125–126°.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,73 (s, 6H), 3,80 (s, 3H), 4,70 (s, 4H), 6,83 u. 7,06 (2 x d, J = 9Hz, 2 x 2H).

C₁₁H₁₇N₃O₃S (271,3) Ber.: C 48,69 H 6,32 N 15,49 S 11,82; Gef.: C 48,56 H 6,05 N 15,09 S 11,96.

4-p-Methyl-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5k)

Ausb.: 2,7 g (35 % d. Th.), Schmp. 133–134°.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,30 (s, 3H), 2,73 (s, 6H), 4,72 (s, 4H), 6,9–7,3 (m, 4H).

C₁₁H₁₇N₃O₂S (255,3) Ber.: C 51,74 H 6,71 N 16,46 S 12,56; Gef.: C 50,91 H 6,71 N 15,96 S 12,47.

4-p-Chlor-2,6-dimethyl-1,2,4,6-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid (5l)

Ausb.: 3,7 g (45 % d. Th.), Schmp. 127–128°.

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2,73 (s, 6H), 4,73 (s, 4H), 6,9–7,4 (m, 4H).

C₁₀H₁₄ClN₃O₂S (275,8) Ber.: C 43,56 H 5,12 N 15,24 S 11,63, Cl 12,86; Gef.: C 43,65 H 5,27 N 15,14 S 12,12 Cl 12,94.

Äthylendis-(4-thiatriazacyclohexan-1,1-dioxid) (6)

3,7 g 3 werden in 3,6 ml Wasser und 0,9 g 1,2-Diaminoäthan gelöst und bei 5 bis 10° unter Rühren mit 12 g 35 proz. Formaldehyd-Lsg. versetzt. Gegen Ende der Formaldehydzugabe wird die Mischung trüb, und das entstandene Öl erstarrt. Man rührt 1 Std. bei Raumtemp. weiter, trennt das Kristallinat ab, wäscht mit wenig kaltem Äthanol und Diäthyläther nach und kristallisiert aus Aceton/Äthanol um. Ausb.: 0,8 g (15 % d. Th.), Schmp. 167–169° (unscharf, gelbliches Pulver).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ (ppm) = 2,76 (s, 12H), 3,00 (s, 4H), 4,20 (s, 8H).

C₁₀H₂₄N₆O₄S₂ (356,5) Ber.: C 33,69 H 6,79 N 23,58 S 17,99; Gef.: C 33,68 H 7,12 N 23,58 S 17,90.