Radikalreaktionen an N-Heterocyclen. XI [1]

Reaktionen von 3-Methyl-pyrazolin-5-onen mit Phenoxy-Radikalen

Manfred Schulz und Michael Meske [2]

Merseburg, Fachbereich Chemie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Eingegangen am 22. Juli 1992 bzw. 3. Februar 1993

Herrn Prof. Dr. Ernst Schmitz zum 65. Geburtstag gewidmet

Free Radical Reactions of N-Heterocyclic Compounds. XI.
Reaction of 3-Methyl-pyrazolin-5-ones with Phenoxy Radicals

Abstract. Pyrazolin-5-ones (**3a–i**) were oxidized with 2,4,6-trisubstituted phenoxy radicals (**2a–d**) to the corresponding radicals (**4a–i**), which dimerised or combined with phenoxy radical (**2a**) depending on the R¹- and R⁴-substituents in (**3**). In the case of 3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-one (**3f**) the primary radical combination products were not found, but the corresponding quinone

methide (**17**) and the o-phenol derivative (**18**) were isolated. Products and yields have been investigated as a function of mol ratio substrate: oxidant and solvent. The radical combination products (**7–10**) could be tert-butylated in the presence of aluminium chloride or in the presence of trifluoroacetic acid, forming heterocyclic substituted phenols (**21**) and (**22**).

Einleitung

Phenoxy-Radikale sind wesentliche Zwischenstufen in der Antioxidans-Chemie der Phenole und spielen ebenfalls bei der Synthese von zahlreichen Naturstoffen im Laboratorium und in der Natur, z.B. des Lignins, einiger Alkaloide und Antibiotika, die produktentscheidende Rolle [3–7]. Weniger untersucht wurde bisher der Einsatz von Phenoxylen (**2**), die leicht aus den Phenolen (**1**) zugänglich sind, für die Oxidation von organischen CH- und NH-Verbindungen.

Wir berichten hier über die Oxidationen der Pyrazolin-5-one (**3a–i**) mit 2,4,6-trisubstituierten Phenoxy-Radikalen (**2a–d**) [3,4].

Ergebnisse und Diskussion

Die in 1-Position phenylsubstituierten Pyrazolin-5-one (**3a–e**) reagierten in Benzol unter milden Reaktionsbedin-

gungen mit den Phenoxyen (**2a–c**) ausschließlich zu den 4,4-Bis-(3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-onen) (**5a–e**) (Molverhältnis Heterocyclus: (**2a**) wie 1:1). In keinem Fall entstanden C-N- bzw. C-O-verknüpfte Dimere der als Intermediate zu postulierenden Pyrazolinonyl-Radikale (**4a–e**) oder Kreuzkombinationsprodukte vom Typ (**6**).

3,4,5	R ¹	R ⁴	3,4,5	R ¹	R ⁴
a	Ph	Me	f	Ph	H
b	Ph	Et	g	H	Ph
c	Ph	nPr	h	H	Me
d	Ph	iPr	i	H	H
e	Ph	Ph			

Schema 1

Dagegen reagierten die in 1-Position H-substituierten Pyrazolin-5-one (**3g-i**) mit (**2a**) zu den cyclohexadienon-substituierten Pyrazolin-5-onen (**7-12**) sowie zum Phenol-Derivat (**13**) und zum Chinonmethid (**14**).

Die Reaktion des in 4-Position phenylsubstituierten Pyrazolin-5-ons (**3g**) zu Verbindung (**7**) erforderte 2 Moläquivalente (**2a**). Das in 4-Position methylsubstituierte Pyrazolin-5-on (**3h**) reagierte mit (**2a**) unter analogen Reaktionsbedingungen zu einem Gemisch der Verbindungen (**8**) und (**9**)¹⁾, unabhängig von der eingesetzten Phenoxylmenge²⁾. Ein analoges Verhalten zeigte Verbindung (**3i**), die mit (**2a**) zu den Addukten (**10-14**) reagierte.

Die Produkte (**7-14**) erklären sich über die Bildung der Radikale (**4g-i**), die mit (**2a**) kombinieren. Die primären Radikalabfangprodukte (**6**) können wiederum oxidiert und mit (**2a**) abgefangen werden³⁾. Außerdem können sich Addukte, z.B. (**15**)⁴⁾, durch Abspaltung oder Umlagerung einer tert-Butylgruppe stabilisieren.

Die chemischen Verschiebungen im ¹³C-NMR-Spektrum der Dimeren (**5a-e**) sind charakteristisch für Pyrazolin-5-one in der CH-Form. Mit dem Fehlen von Signalen bei 80–115 ppm und 138–162 ppm [12] konnten die C-N- und C-O-verknüpften Dimeren ausgeschlossen werden (Tabelle 1). Ebenso beweisen die ¹³C-NMR-Spektren von (**12-14**), daß der Heterocyclus in der CH-Form vorliegt (Tabelle 2). Da im ¹H-NMR-Spektrum von (**13**) im Bereich der Methylgruppen drei Singulets im Verhältnis 3:6:1 auftreten, wird die Existenz einer weiteren tert-Butylgruppe neben zwei äquivalenten tert-Butylgruppen und der Methylgruppe des Pyrazolinonringes belegt. Im Aromatenbereich werden zwei Protonen nachgewiesen. Das Fehlen von Signalen bei 200 und 185 ppm im ¹³C-NMR-Spektrum beweist, daß es sich nicht um ein Chinol-Addukt, sondern um ein Pyrazolin-5-on mit einem Phenolrest und einer zusätzlichen tert-Butylgruppe handelt. Die Strukturisomeren von (**13**) wurden durch ein ¹³C-Off-Resonanzexperiment ausgeschlossen.

Die δ -Werte im ¹³C-NMR-Spektrum von (**7-10**) sind charakteristisch für den Pyrazolinonrest in der NH-Form.

¹⁾ Verbindung (**8**) lagert sich oberhalb von 25°C in (**9**) um, wie UV- und ¹H-NMR-spektroskopische Messungen zeigten. Für (**8**) wurde eine höhere Spannungsenergie (123,8 kJ/mol) als für (**9**) (97,4 kJ/mol) berechnet [8,9]. Diese Energiedifferenz sollte für die Isomerisierung verantwortlich sein.

²⁾ Der quantitative Umsatz von (**3h**) erforderte 4 Moläquivalente (**2a**). Wurde die Reaktion unter gleichen Bedingungen nur mit 2 Moläquivalenten (**2a**) durchgeführt, wurden neben 50% des Ausgangsstoffes (**3h**) die Verbindungen (**8**) und (**9**) in Ausbeuten von 7% und 28% erhalten.

³⁾ Daß im Fall von (**3g**) nur das Mono-Kombinationsprodukt (**7**) isoliert wurde, kann nur auf der Instabilität des entsprechenden Bis-Kombinationsproduktes beruhen.

⁴⁾ Spindichteberechnungen zeigen, daß Phenoxyle, z.B. (**2a**), bevorzugt in der 4-Position kombinieren (vgl. [10,11]).

Ebenso belegen HMO-Berechnungen für das Radikal (**4i**) die höchsten Spindichten in 4-Position. Dadurch sollte das Phenoxyl (**2a**) bevorzugt mit (**4i**) in 4-Position kombinieren [2].

Tabelle 1 ^{13}C -chemische Verschiebungen der Bis-pyrazolin-5-one (**5a–e**) (22 MHz, CDCl_3)

Position	5a		5b		5c		5d	5e
	$\text{R}^4 = \overset{7}{\text{C}}\text{H}_3$ meso	racem	$\text{R}^4 = \overset{7}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{8}{\text{C}}\text{H}_3$ meso	racem	$\text{R}^4 = \overset{7}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{8}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{9}{\text{C}}\text{H}_3$ meso	racem	$\text{R}^4 = \overset{7}{\text{C}}\text{H} - (\overset{8}{\text{C}}\text{H}_3)_2$	$\text{R}^4 = \text{C}_6\text{H}_4$
3	161,7	159,6	160,2	158,1	160,5	158,4	160,2	160,6
4	54,3	55,5	60,4	61,8	60,0	61,2	62,3	66,8
5	172,9	172,9	172,3	172,3	172,4	172,1	171,4	171,4
6	14,5	15,8	14,7	16,3	14,8 ^{a)}	16,4 ^{a)}	16,4	15,5
s	137,5	137,5	137,3	137,3	137,3	137,4	137,3	137,8
o	118,9	119,1	118,9	119,2	118,9	119,2	119,1	118,9
m	129,0	128,8	129,0	128,8	128,9	128,8	128,9	128,8
p	125,5	125,2	125,5	124,9	125,5	125,2	125,5	125,2
7	14,5	15,2	20,2	21,1	28,9	30,0	29,6	136,6
8			7,8	8,0	17,0 ^{a)}	17,1 ^{a)}	20,3/ 19,0	128,2
9					14,1 ^{a)}	14,1 ^{a)}		129,1
10								127,5

^{a)}APT-Spektrum

Entscheidend für die p-chinoliden Substituenten in (**7–12**) sind die Signale bei $\delta=185,2\text{--}189,9$ ppm für die CO-Gruppe. Dagegen deutet der δ -Wert von 200,4 ppm bei (**8**) auf eine o-chinolide CO-Gruppe hin [13,14]. Die chemischen Verschiebungen für die in 1-Position gebundenen Kohlenstoffatome der Cyclohexadienreste bei 82,8–84,8 ppm sind vergleichbar mit den ermittelten Werten für 1-chinolsubstituierte 2-Arylphthalazindione [1], die zwischen 82,75 und 82,81 ppm liegen. Die Signale von 66,6–68,4 ppm der chinoliden Verknüpfungskohlenstoffatome in 2-Position des Heterocyclen entsprechen den δ -Werten von 68,7–68,8 ppm der chinolsubstituierten 2,2-Diacyl-1-arylhydrazine [15].

Die δ -Werte der Kohlenstoffe 3–5 des Pyrazolinonrestes von (**11**) entsprechen denen des 3-Hydroxy-5-methyl-1-phenylpyrazols [16] und belegen, daß Verbindung (**11**) als Hydroxypyrazol vorliegt [17]. Die OH-Bande bei 3380 cm^{-1} im IR-Spektrum spricht ebenfalls für diese Struktur.

Das 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-on (**3f**) reagierte mit 2 Moläquivalenten (**2a**) zum Phenol-Derivat (**18**), wenn bei Raumtemperatur die benzolische Phenoxyllösung zur Suspension von (**3f**) in Benzol gegeben wurde. Wurde aber die Phenoxyllösung vorgelegt und dazu eine Suspension des Pyrazolin-5-ons (**3f**) in Benzol zugegeben, entstand das Chinonmethid (**17**). Für die Bildung von (**17**) waren 4 Moläquivalente (**2a**) nötig. Wir vermuten, daß primär das Pyrazolinonyl-Phenoxyl-Kombinationsprodukt (**16a**) entsteht, das durch einen Pheno-

xylüberschuß unter Abspaltung von Isobuten zum Chinonmethid (**17**) weiteroxidiert wird. Liegt kein Überschuß an (**2a**) vor, erfolgt Umlagerung von (**16a**) zum o-Chinoladdukt (**16b**), aus dem spontan eine tert-Butylgruppe eliminiert wird (Isobuten-Nachweis, GC).

Schema 2

Tabelle 2 Ausgewählte ^{13}C -NMR-Daten (22 MHz, CDCl_3 , ppm) der Kombinationsprodukte **7–14**, **17**, **18**, **21** und **22**

Nr.	Pyrazolinonrest			R ¹				R ²				R ³		R ⁴		
	C-3	C-4	C-5													
7^{a,b)}	139,6	112,0	158,1	84,1,	141,3,	148,1,	186,5					12,8	134,1,	128,1,	129,3,	126,3
7^{a,c)}	159,4	73,8	174,2	84,0,	141,1,	147,4,	186,5					15,8	131,7,	126,6,	129,7,	125,9
8^{a)}	138,9	101,4	157,4	88,5,	132,0,	143,3,	135,1	67,2,	141,2,	146,0,	185,5	12,9	6,8			
				146,1,	200,4											
9^{a)}	138,5	102,5	157,6	82,6,	140,6,	147,6,	186,3	67,4,	141,7,	146,3,	185,3	12,8	7,0			
10^{a)}	140,1	106,5	157,1	84,8,	142,3,	146,5,	185,5	68,4,	142,3,	146,2,	185,2	16,2	48,3,	141,6,	147,1,	189,9
11^{a)}	137,4	105,5	166,1					66,6,	141,6,	146,6,	185,9	19,5	48,4,	140,8,	147,3,	186,4
12^{a)}	147,7	127,5	165,0	83,9,	140,8,	146,5,	185,7					19,4	142,0,	127,8,	154,7,	186,5
13^{a,d)}	161,7	65,0	178,3									20,9	124,3,	125,5,	135,1,	152,9
	(s)	(s)	(s)										(s)	(d)	(s)	(s)
14^{a)}	147,6	125,5	168,0									19,4	142,2,	127,8,	154,8,	186,3
17^{a)}	146,9	124,9	166,2	135,2,	119,4,	128,7,	125,4					20,5	142,2,	127,8,	153,9,	186,0
18^{a,e)}	145,7	105,5	161,0	136,8,	120,1,	129,0,	125,8					12,2	119,4,	151,8,	135,8,	121,4
													140,2,	124,1		
21a	159,8	111,0	174,2	131,1,	119,3,	115,8,	151,5					14,2	133,6,	126,9,	129,6,	128,4
21b	144,7	102,5	159,2	131,4,	146,9,	117,7,	124,9	139,1,	126,7,	116,1,	156,1	10,9	6,9			
				118,7,	120,6											
21c	149,1	101,5	158,8	131,1,	118,3,	115,3,	152,9	137,4,	126,1,	115,6,	156,5	10,7	6,7			
21d^{e)}	149,0	108,3	157,7	130,7,	118,8,	115,5,	153,1	136,6,	126,4,	115,6,	156,9	11,9	121,8,	129,6,	115,3,	156,0
21e^{e)}	151,6	105,5	158,5					135,3,	125,7,	115,4,	156,2	12,1	123,2,	129,3,	115,1,	155,4
22a^{a)}	140,0	102,1	157,9	122,6,	143,3,	136,9,	119,4	129,4,	122,6,	136,9,	154,0	10,9	6,9			
				142,0,	113,1											
22b^{a)}	142,9	100,5	157,7					126,2,	122,0,	137,7,	154,9	10,7	5,9			
22c^{a)}	142,9	106,3	156,8					126,1,	122,1,	137,7,	154,9	12,1	119,8,	125,7,	136,3,	153,4
22d^{a)}	142,9	107,4	156,0									11,3	119,2,	125,7,	136,3,	153,4

a) tert.-Butylgruppen: 25,2–30,4 ppm für CH_3 -Gruppen und 34,6–43,1 ppm für quarternäre C-Atome. –

b) NH-Tautomer. –

c) CH-Tautomer. –

d) $\text{R}^4 = \text{tBu}$: 37,2 ppm (s); 26,5 ppm (q). –

e) $[\text{D}_6]$ DMSO.

Wurden im Vergleich dazu die Phenoxye (**2a–d**) so langsam zu einer Suspension von (**3f**) gegeben, daß stets ein Überschuß an Pyrazolin-5-on vorlag (momentane Entfärbung der Radikale an der Eintropfstelle des Reaktionsansatzes), bildete sich das trimere Pyrazolin-5-on (**20**) [18] (Molverhältnis 1,5 Mol (**2a**)/Mol (**3f**)) (vgl. auch [19]).

Die sich intermediär bildenden Pyrazolinonyl-Radikale (**4f**) kombinieren vermutlich zum Bispyrazolin-5-on (**5f**), das zum 4-(3-Methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on-4-yliden)-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on (Pyrazolblau) (**19**) [20] weiteroxidiert wird. Durch Michael-Addition reagiert (**19**) mit dem Ausgangspyrazolin-5-on (**3f**). Tatsächlich haben wir das auf unabhängigem Wege dar-

gestellte (**5f**) mit (**2a**) fast quantitativ zu (**19**) oxidieren und anschließend mit (**3f**) zu (**20**) umsetzen können.

Schema 3

Die Radikalkombinationsprodukte (**7–10**) konnten in Gegenwart von AlCl_3 und die Verbindungen (**8–10**) in Trifluoressigsäure in die phenolsubstituierten Pyrazolin-5-one (**21a–e**) und (**22a–d**) überführt werden [2]. Diese Verbindungen sind durch direkte Arylierungen nicht zugänglich [21–23].

21a–e, 22a–d

	R ¹	R ²	R ⁴
21a		H	Ph
21b			Me
21c			Me
21d			
21e	H		
22a			Me
22b	H		Me
22c	H		
22d	H	H	

Bei den Oxidationen der Pyrazolin-5-one (**3a–i**) mit den Phenoxylen (**2a–d**) müssen Pyrazolinonyl-Radikale (**4a–i**) entstehen, die entweder dimerisieren oder mit überschüssigen Phenoxy-Radikalen kombinieren. Die Pyrazolinonyl-Radikale haben wir auf anderem Wege generiert und durch ESR-Spektroskopie charakterisiert [24].

Beschreibung der Versuche

Schmelzpunkte: Mikroheiztisch Boëtius, korrigiert. – NMR: Bruker HX-90R; interner Standard: HMDS = Hexamethyldisiloxan. – IR: Specord 71/IR, Fa. Carl Zeiss Jena. – UV: Specord M40, Fa. Carl Zeiss Jena. – MS: Varian CH-6. –

GC: Giede-Gaschromatograph GSCHF 18,3. Die Synthesen der Pyrazolin-5-one (**3a–i**), (**5f**) und der Phenoxye (**2a–d**) erfolgten nach bekannten Literaturvorschriften [25–37]. Alle Substanzen waren DC- und elementaranalytisch rein, die Schmelzpunkte entsprachen den Literaturdaten.

4,4-Bis-(4-alkyl-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-one) (**5a–d**) und 4,4-Bis-(3-methyl-1,4-diphenyl-pyrazolin-5-on) (**5e**)

Allgemeine Vorschrift: 5 mmol der Pyrazolin-5-one (**3a–e**) in 100 ml Benzol wurden unter Rühren (Argon, 20°C) mit 5 mmol der Phenoxye (**2a–c**), die in 35–50 ml Benzol gelöst bzw. suspendiert wurden, tropfenweise so versetzt, daß sich die Reaktionslösung ständig entfärbte. Nach Beendigung der Reaktion (DC-Kontrolle, 1–4 h) wurde das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abdestilliert.

A) Aufarbeitung der Umsetzungen von (3a–e) mit (2a): Der erhaltene Rückstand wurde mit wenig n-Hexan versetzt. Der ausgefallene weiße Feststoff wurde abgesaugt, mit kaltem n-Hexan gewaschen und aus Ethanol umkristallisiert (Ausbeuten und analytische Daten von (**5a–e**) sind in den Tabellen 1 und 3 zusammengefaßt). Das Phenol (**1a**) wurde aus der n-Hexan-Lösung nach Abdestillieren des Lösungsmittels und Umkristallisieren des Rückstandes aus Ethanol fast quantitativ gewonnen. Fp. 130°C (Lit [38] 130–131°C), Misch.-Fp. 130°C.

B) Aufarbeitung der Umsetzung von (3a) mit (2b,c): Der mit 50 ml Methanol versetzte Rückstand wurde mit einer Lösung von 6,0 g NaOH in 50 ml Wasser unter Eiskühlung vermischt und die Mischung geschüttelt. Bei Einsatz von (**2c**) wurde die Mischung 24 h bei 20°C stengelassen. Das ausgefallene (**5a**) wurde abgesaugt und aus Ethanol umkristallisiert. Die Ausb. betrug sowohl beim Einsatz von (**2b**) als auch von (**2c**) 0,85 g (**5a**) (91%). Fp. 164 °C (Lit [39] 165°C), Misch.-Fp. 164°C.

Nach dem Abtrennen von (**5a**) wurden aus dem Filtrat nach Neutralisieren mit 10%iger Salzsäure, Absaugen und Umkristallisieren des ausgefallenen Feststoffes 1,04 g (90%) 2,6-Di-tert-butyl-4-cyano-phenol (**1b**), Fp. 144°C (Ethanol) (Lit [35] 145°C), Misch.-Fp 144°C bzw. 1,29 g (80%) 2,4,6-Triphe-nylphenol (**1c**), Fp. 149°C (Eisessig) (Lit [36] 149°C), Misch.-Fp. 149°C, isoliert.

Allgemeine Arbeitsvorschrift der Umsetzungen von (3f–i) mit (2a).

Zu je 5 mmol einer Lösung bzw. zu einer Suspension der Pyrazolin-5-one wurde unter Rühren (20°C, Argon) (**2a**) in Benzol zugetropft (Angabe des Lösungsmittels, der Reaktionsdauer, der Phenoxy-Menge in Benzol in Tab. 4). Nach Beendigung der Reaktion (DC-Kontrolle) wurde die Reaktionslösung filtriert und anschließend das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum bei max. 30°C Badtemperatur abdestilliert. Der erhaltene Rückstand wurde in 20–25 ml n-Hexan aufgenommen und bei -15°C aufbewahrt.

Variante A: Nach etwa 24 h wurden die ausgefallenen Kristalle abgesaugt und diese mit wenig kaltem n-Hexan gewaschen. Die vereinigten Filtrate wurden im Wasserstrahlvakuum (Badtemperatur max. 30°C) auf 10–15 ml Lösung eingengt und der Rückstand 1 bis 7 Tage bei -15°C aufbewahrt. Die erneut ausgefallenen Kristalle wurden abgesaugt, mit wenig kaltem n-Hexan gewaschen und auf Ton abgepreßt bzw. bei 0,10 Torr ge-

Tabelle 3 Ausbeuten und analytische Daten der isolierten Bis-pyrazolin-5-one (**5a–e**)

Nr.	Ausb. (%)	Fp. (Lit-Fp.) [°C]	Summenformel (Molmasse)	IR (KBr) [cm ⁻¹]	MS (M ⁺) [m/z]
5a	91	162 (165 ^{[39]a}) (140 ^{[39]b})	C ₂₂ H ₂₂ N ₄ O ₂ (374,44)	3000 (CH) 2900 (CH) 1710 (CO)	374
5b	94	160 (161 ^{[39]c})	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₂ (402,49)	3000 (CH) 2960 (CH) 1705 (CO)	402
5c	84	167–168	C ₂₆ H ₃₀ N ₄ O ₂ (430,54)	3000 (CH) 2890 (CH) 1690 (CO)	430
5d	84	115–116	C ₂₆ H ₃₀ N ₄ O ₂ (430,54)	3000 (CH) 2920 (CH) 1705 (CO)	430
5e	100	207–208 ^{a)} (145 ^{[11]c)})	C ₃₂ H ₂₈ N ₄ O ₄ (500,58)	3000 (CH) 2910 (CH) 1715 (CO)	500

a) meso-Form. –

b) racem-Form. –

c) racem-Form; wie ¹³C-NMR-Daten belegen.

trocknet. Dieses Aufarbeitungsverfahren wurde so lange wiederholt, bis keine Kristalle mehr ausfielen. Anschließend wurde das n-Hexan bis zur Trockene im Wasserstrahlvakuum abdestilliert, der Rückstand in Cyclohexan aufgenommen und säulenchromatographisch mit unterschiedlichen n-Hexan-Essigsäureethylester-Gemischen (Al₂O₃ neutral, Chemiewerk

Greiz-Dörlau, 55 x 140 mm) getrennt. Die Eluate der Fraktionen wurden im Wasserstrahlvakuum bei ca. 30°C eingeeengt. *Variante B:* Fiel auch nach Tagen kein Niederschlag aus, wurde das n-Hexan im Wasserstrahlvakuum bei max. 30°C abdestilliert und der Rückstand säulenchromatographisch getrennt (Bedingungen wie unter A angegeben).

Tabelle 4 Reaktionsbedingungen und Ausbeuten der Umsetzungen der Pyrazolin-5-one (**3f–i**) mit dem 2,4,6-Tri-tert-butyl-phenoxy (**2a**)

Substrat	Lösungsmittel [ml]	Phenoxy 2a [mmol] ([ml])	Reaktionsdauer [h]	Arbeitsvorschrift	Produkt	Ausbeute [g] [%]	Fp. [°C]
3f	Benzol 50	10 ^{a,b)} (40)	0,5–1	A ^{d)}	18	1,30 69	247
3g	Benzol 100	10 ^{c)} (50)	2–3	A ^{d)}	7	1,50 70	187
3h	Benzol 100	20 ^{c)} (100)	7–8	B	8 9	0,55 1,83 18 60	142 142
3i	Benzol 100	27 ^{c)} (130)	3–4,5	A	10 11 12 13	1,83 1,00 0,31 0,06 42 32 12 4	158 75 93 178
3i	Benzol 100	20 ^{a)} (100)	6–7	A	10 11 12 13 14	0,30 0,80 0,29 0,35 0,06 7 26 10 20 4	157 75 92 178 225

a) **2a** wurde so zugetropft, daß die Radikalfarbe im Reaktionsgemisch sofort verschwand. –b) Lösung von **2a** wurde 1–2 h mit dem Molsieb Wolfen Zeosorb A4, Laborchemie Apolda, getrocknet. –c) **2a** wurde so zugetropft, daß die Reaktionslösung durch die Radikalfarbe blau gefärbt war. –

d) der Rückstand wurde nur aus 85%igem Ethanol umkristallisiert

4-(2,6-Di-tert-butyl-cyclohexa-2,5-dien-1-on-4-yliden)-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on (**17**)

Zu einer gerührten Lösung von 20 mmol des Phenoxyls (**2a**) in 80 ml Benzol (Argon, 25°C) wurde innerhalb von 4–5 h eine Suspension von 5 mmol (0,87 g) (**3f**) in 40 ml Benzol zugegeben, wobei die Reaktionslösung ständig blau gefärbt war. Nach beendeter Zugabe wurde das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum bei max. 35°C abdestilliert und der Rückstand säulenchromatographisch getrennt. Neben 3,85 g (74%) (**1a**), Fp. 130°C (Lit [38] 130–131°C), Misch.-Fp. 130°C wurden 1,5 g (80%) (**17**) isoliert.

4,4-Bis-(3-methyl-phenyl-pyrazolin-5-on-4-yl)-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on (**20**)

Variante a): Zu einer gerührten Suspension von 5 mmol (0,87 g) (**3f**) in 100 ml Benzol (Argon, 25°C) wurden innerhalb von 2–2,5 h 7 mmol des entsprechenden Phenoxyls (**2a–d**) in 100 ml Benzol zugegeben, wobei sich die Reaktionslösung ständig entfärbte. Der ausgefallene Niederschlag wurde abgesaugt und mit wenig Benzol und n-Hexan gewaschen. Das Filtrat wurde im Wasserstrahlvakuum bei 40°C auf 10–20 ml Lösung eingeeengt und mit 20–40 ml n-Hexan versetzt. Die ausgeschiedenen Kristalle wurden abgesaugt, mit wenig Benzol und n-Hexan gewaschen, auf Ton getrocknet und mit den schon erhaltenen Kristallen vereinigt. Ausb. an (**20**) 70% (**2a**), 81% (**2b**), 60% (**2c**), 68% (**2d**), Fp.(Zers.) 200–202°C (Lit [18] 200–202°C). – IR (KBr): $\nu = 3340, 3000, 2860, 1700$. – MS: $m/z = 518 (M^+)$. – $^1\text{H-NMR}$ (90 MHz, $[\text{D}_6]\text{DMSO}$): $\delta = 2,1 (s,9\text{H}), 7,1-7,9 (m,15\text{H})$. – $^{13}\text{C-NMR}$ (22 MHz, $[\text{D}_6]\text{DMSO}$): $\delta = 172,9 (C-5'), 161,4 (C-5), 148,2 (C-3, C-3'), 138,4 (s-C), 138,3 (s'-C), 128,9 (m-C), 128,7 (m'-C), 124,8 (p-C), 124,3 (p'-C), 120,2 (o'-C), 118,1 (o-C), 98,8 (C-4), 54,3 (C-4'), 16,0 (C-6'), 13,9 (C-6)$.

Durch Abdestillieren des Lösungsmittels aus den vereinigten Filtraten im Wasserstrahlvakuum und Umkristallisieren des Rückstandes wurden die Phenole (**1a–d**) in Ausbeuten von 88–95% isoliert.

Variante b): 0,43 mmol (0,15 g) (**19**) in 65 ml Benzol wurden mit 0,43 mmol (0,08 g) (**3f**) versetzt (Argon, 25°C) und anaerob bis zum Entfärben des Reaktionsgemisches gerührt. Der Ansatz wurde im Wasserstrahlvakuum auf ca. 10–15 ml eingeeengt, mit 30–40 ml n-Hexan versetzt und der gebildete weiße Niederschlag abgesaugt. Ausb. 0,23 g (**20**) (92%), Fp. (Zers.) 200–202°C (Lit [18] 200–202°C), Misch.-Fp. 201°C.

4-(3-Methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on-4-yliden)-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5-on (**19**)

Innerhalb von 90 Minuten wurden zu einer Suspension von 3 mmol (1,04 g) (**5f**) in 60 ml Benzol unter Rühren (Argon, 24°C) 6 mmol (**2a**) in 40 ml Benzol zugegeben. Nach weiteren 3 h Rühren wurde das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abdestilliert. Der in 200 ml CHCl_3 aufgenommene Rückstand wurde filtriert (um unumgesetztes (**5f**) zu entfernen) und anschließend das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abdestilliert. Der Rückstand wurde mit 70 ml Diethylether versetzt und das gebildete (**19**) in Form schwarz-blauer Kristalle abgesaugt und mit Diethylether phenolfrei gewaschen. Ausb. 1 g (97%), Fp. 235°C, (Lit [20] 235°C). – IR (KBr): $\nu = 3000, 2870, 1690, 1585, 1500$. – $^1\text{H-NMR}$ (90 MHz, CDCl_3): $\delta = 2,56 (s,6\text{H}), 7,0-$

7,9 (m,10H). – $^{13}\text{C-NMR}$ (22 MHz, CDCl_3): $\delta = 162,0 (C-5), 148,6 (C-3), 141,8 (C-4), 137,2 (s-C), 129,0 (m-C), 125,8 (p-C), 119,0 (o-C), 19,6 (C-6)$. Es wurden durch Abdestillieren des Diethylethers und Umkristallisieren des Rückstandes aus 85%igem wäßrigen Ethanol 1,5 g (95%) (**1a**) gewonnen, Fp. 130°C (Lit [38] 130–131°C, Misch.-Fp. 130°C

Ent-tert-butylierung der Pyrazolinonyl-Phenoxy-Kombinationsprodukte (**7–10**) mit AlCl_3 in CH_2Cl_2

0,5 mmol der Radikalkombinationsprodukte in 12 ml trockenem CH_2Cl_2 wurden mit der angegebenen Menge AlCl_3 (Tab. 5) bei Raumtemperatur unter Rühren versetzt. Nach 24 h Rühren wurde der Reaktionsansatz mit Eis von außen gekühlt und anschließend mit 12 ml Eiswasser versetzt. Die Mischung wurde noch 30 Minuten gerührt und dann aufgearbeitet. *Variante A*: Die organische Phase wurde abgetrennt, die wäßrige Phase zwei- bis viermal mit 15–20 ml CH_2Cl_2 extrahiert. Aus den vereinigten organischen Phasen wurde im Wasserstrahlvakuum das CH_2Cl_2 abdestilliert und der Rückstand mit n-Hexan ausgekocht. Die erhaltenen Kristalle wurden abgesaugt und mit n-Hexan gewaschen.

Variante B: Die ausgefallenen Kristalle wurden abgesaugt und mit CH_2Cl_2 gewaschen.

Tabelle 5 Ent-tert-butylierung der Pyrazolinonyl-Phenoxy-Kombinationsprodukte (**7–10**) mit AlCl_3 in CH_2Cl_2 ; Reaktionsbedingungen und analytische Daten^{a)}

Edukt	Produkt	Menge AlCl_3 [mmol]	Variante	Ausbeute [%]	Fp. [°C]
7	21a	2,5	A	100	225–228
8	21b	5,0	A	85	137
9	21c	5,0	B	93	205–207
10	21d	7,5	B	40 ^{b)}	
	21e			24 ^{b)}	

^{a)} weitere analytische Daten vgl. Tabellen 2, 7. –

^{b)} Zusammensetzung des Gemisches wurde mittels HPLC bestimmt

Tabelle 6 Umsetzung der Pyrazolinonyl-Phenoxy-Kombinationsprodukte (**8–10**) mit Trifluoressigsäure bei -15°C ^{a)}

Edukt	Produkt	Ausbeute [%]	Fp [°C]	MS M^+
8	22a	100	180 (n-Hexan)	520
9	22b	96	174 (n-Hexan)	316
10	22c	49 ^{b)}		506
	22d	49 ^{b)}		302

^{a)} Analysendaten in den Tabellen 2, 7. –

^{b)} Gemisch, Produktverteilung

¹H-NMR-spektroskopisch bestimmt

Tabelle 7 Analytische Daten^{a)} der Pyrazolin-5-one (**7–10**), (**13**), (**14**), (**17**), (**18**), (**21**) und (**22**)

Nr.	IR (KBr, cm ⁻¹)				¹ H-NMR (CDCl ₃ , 90 MHz)
7	3160, 1670,	3020, 1645,	2910, 1610,	1730, 1500	0,9–2,0 (m,30H), 5,0 (s,1H), 6,6 (s,2H), 7,25–7,45 (m,5H), 8,2 (s,1H)
8	3000, 1635	2905,	1675,	1660,	1,01 (s,9H), 1,06 (s,9H), 1,16 (s,9H), 1,18 (s,9H), 1,21 (s,18H), 1,87 (s,6H), 6,5 (s,1H), 6,6 (s,1H), 6,7 (s,1H),6,8 (s,1H)
9	3010, 1600	2920,	1665,	1645,	1,06 (s,18H), 1,21 (s,36H), 1,87 (s,3H), 1,92 (s,3H), 6,61 (s,2H), 6,72 (s,2H)
10	2967,	2874,	1661,	1639	1,03 (s,9H), 1,06 (s,9H), 1,12 (s,9H), 1,21 (s,18H), 1,24 (s,18H), 1,28 (s,18H), 2,11 (s,3H), 6,52 (s,2H), 6,74 (s,2H),7,40 (s,2H)
13	3470, 1690,	3130, 1600,	3010, 1500	2900,	1,11 (s,9H), 1,42 (s,18H), 2,35 (s,3H), 5,15 (s,1H), 7,35–7,60 (m,2H), 8,9 (s,1H)
14	3180, 1660,	3083, 1610,	2972,	2875,	1,3 (s,18H), 2,5 (s,3H), 7,3 (s,1H), 8,7 (s,1H), 8,9 (s,1H)
17	3000,	2895,	1755,	1695	1,4 (s,18H), 2,5 (s,3H), 7,0–8,0 (m,7H)
18^{b)}	3330,	3000,	2880,	1720	1,32 (s,9H), 1,43 (s,9H), 2,40 (s,3H), 7,0–7,9 (m,7H)
21a	3300,	3000,	2890,	1690,	2,1 (s,3H), 3,8 (s,1H), 7,1–7,5 (m,9H)
21b	3300, 1590,	3000, 1510,	2900, 1490	1680,	1,9 (s,3H), 2,11 (s,3H), 5,28 (s,1H), 6,7–7,3 (m,9H)
21c	3300, 1600,	3000, 1500	2900,	1680,	1,81 (s,3H), 2,31 (s,3H), 5,73 (s,1H), 6,7–7,3 (m,9H)
22a	3410, 1600,	3000, 1500	2900,	1760,	1,2 (s,9H), 1,4 (s,27H), 1,9 (s,3H), 2,2 (s,3H), 5,2 (s,1H), 7,0–7,1 (m,4H)
22b	3520, 2910,	3400, 1700	3200,	3000,	1,4 (s,18H), 1,8 (s,1H), 2,0 (s,3H), 2,2 (s,3H), 5,5 (s,1H), 7,1 (s,2H)
22c	3540, 1655	3020,	2910,	1760,	1,43 (s,54H), 2,26 (s,3H), 5,1 (s,3H), 7,1–7,3 (m,6H)

^{a)} elementaranalytische Daten entsprechen den angegebenen Strukturen. –

^{b)} [D₆] DMSO

Umsetzung der Pyrazolinonyl-Phenoxy-Kombinationsprodukte (**8–10**) in Trifluoressigsäure

1 mmol des Adduktes wurden in 1–2 ml Trifluoressigsäure bei Raumtemperatur gelöst bzw. suspendiert und bei -15°C 1–2 Tage aufbewahrt. Anschließend wurde das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum bei 30–35°C abdestilliert und der Rückstand mit ca. 3–4 ml n-Hexan versetzt. Bei -15°C kristallisierte das Produkt aus. Die Kristalle wurden abgesaugt und mit n-Hexan gewaschen. Die n-Hexan-Lösungen wurden vereinigt, auf die Hälfte des ursprünglichen Filtratvolumens eingeeengt und bei -15°C aufbewahrt. Die gebildeten Kristalle wurden abgesaugt und mit den obigen vereinigt.

Literatur

- [1] X. Mitt.: R. Kluge, L. Omelka, M. Reinhard, M. Schulz, Chem. Ber. **125** (1992) 2075
 [2] M. Meske, Dissertation, Technische Hochschule Merseburg, 1991

- [3] E. R. Altwicker, Chem. Rev. **67** (1967) 475
 [4] K. Dimroth, Top. Curr. Chem. **129** (1985) 99
 [5] H. Musso, Angew. Chem. **75** (1963) 965
 [6] W. I. Taylor, A. R. Battersby (Eds.), Oxidative Coupling of Phenols, Dekker, New York 1967
 [7] G. Bringmann, R. Walter, R. Weirich, Angew. Chem. **102** (1990) 1006
 [8] Die Struktur wurde mit dem Programm „3D-BUILD“ erzeugt, J. Sadowski, Diplomarbeit, Technische Hochschule Merseburg, 1990
 [9] M. J. C. Crabbe, J. R. Appleyard, Desktop, Molecular Modeller, Oxford University, 1988
 [10] P. M. Deya, M. Dopico, A. G. Raso, J. Morey, J. M. Saa, Tetrahedron **43** (1987) 3523
 [11] K. Dimroth, A. Berndt, F. Bär, R. Volland, A. Schweig, Angew. Chem. **79** (1967) 69
 [12] D. Zeigan, E. Kleinpeter, H. Wilde, G. Mann, J. Prakt. Chem. **323** (1981) 188
 [13] A. Rieker, S. Berger, Org. Magn. Reson. **4** (1972) 857
 [14] A. Rieker, Methoden Org. Chem. (Houben-Weyl) 4th ed., Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1979, **VII/3b**, 765

- [15] M. Schulz, R. Kluge, S. Willscher, *Liebigs Ann. Chem.* **1987**, 671
- [16] R. Faure, E.-J. Vincent, A. Rousseau, J. Elguero, *Heterocycles* **26** (1987) 333
- [17] H. Dorn, *J. Prakt. Chem.* **315** (1973) 382
- [18] G. Westöö, *Acta Chim. Scand.* **7** (1953) 355
- [19] C. Cardani, A. Mantegani, B. Cavallerie, I. L. Sianesi, *Gazz. Chim. Ital.* **90** (1960) 1746
- [20] L. Knorr, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **17** (1884) 2032
- [21] J. Elguero, G. Guiraud, R. Jacquier, G. Tarrago, *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1966**, 775
- [22] J. Elguero, G. Guiraud, R. Jacquier, G. Tarrago, *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1968**, 5019
- [23] H. G. Garg, *J. Indian. Chem. Soc.* **38** (1961) 343
- [24] L. Omelka, M. Meske, M. Schulz, *J. Prakt. Chem.* **335** (1993) 435
- [25] L. Knorr, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **16** (1883) 2597
- [26] L. Knorr, *Liebigs Ann. Chem.* **238** (1887) 137
- [27] L. Knorr, A. Blank, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **17** (1884) 2049
- [28] H. Shirai, T. Yashiro, *Bull. Nagoya City Univ. Pharm. School* **3** (1955) 30 (*Chem. Abstr.* **50** (1956) 16754)
- [29] K. v. Auwers, F. Dersch, *Liebigs Ann. Chem.* **462** (1928) 104
- [30] S. Veibel, K. Eggensen, S. C. Linholt, *Acta Chem. Scand.* **8** (1954) 768
- [31] L. Wolff, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **37** (1904) 2827
- [32] L. Knorr, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **29** (1896) 249
- [33] T. Curtius, R. Jay, *J. Prakt. Chem.* **39** (1889) 27
- [34] W. T. Dixon, D. Murphy, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2* **1975**, 850
- [35] E. Müller, A. Rieker, K. Ley, R. Mayer, K. Scheffler, *Chem. Ber.* **92** (1959) 2278
- [36] K. Dimroth, A. Berndt, H. Perst, C. Reichardt, *Org. Syntheses* **49** (1969) 116
- [37] C. R. H. I. de Jonge, H. J. Hageman, W. G. B. Huysmans, W. J. Mijs, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2* **1973**, 1276
- [38] G. H. Stillson, D. W. Sawyer, C. K. Hunt, *J. Am. Chem. Soc.* **67** (1945) 303
- [39] A. Authaler, H. A. Hoffmann, R. Hüttel, *Chem. Ber.* **98** (1965) 1795

Korrespondenzanschrift

Prof. Dr. Manfred Schulz
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich
Chemie, Institut für Organische Chemie
Geusaer Straße
D-06217 Merseburg