1,4-Dicarbonyl-, 1,4,7-Tricarbonyl-Verbindungen und Cyclopentenone aus Etacrynsäure^{*)}

Klaus Görlitzer^{*} und Michael Bömeke¹⁾

Institut für Pharmazeutische Chemie der Technischen Universität Braunschweig, Beethovenstraße 55, 3300 Braunschweig

Eingegangen am 8. November 1990

Die *Michael*-Addition von Nitroalkanen an Etacrynsäure **1** liefert die γ -Nitroketone **2**, **3** und **10**. Aus diesen werden durch KMnO_4 -Oxidation in Gegenwart von MgSO_4 die 1,4-Dicarbonylverbindungen **6** und **9** sowie das 1,4,7-Triketon **11** dargestellt. **2** reagiert mit KMnO_4 /Borax zur γ -Ketocarbonsäure **5**. **5** ist auch durch Addition von HCN an **1** und saure Hydrolyse des gebildeten Nitrils **4** zugänglich. Bei der alkalischen Verseifung von **4** wird dagegen das Phenol **8** gebildet. **2** wird durch alkalisches H_2O_2 zur Benzoesäure **7** abgebaut. Durch intramolekulare Aldol-Kondensation von **9** und **11** werden die Cyclopentenone **12** und **13** erhalten. **12** und **13** weisen eine unterschiedliche Lage der cyclischen Doppelbindung auf.

1,4-Dicarbonyl, 1,4,7-Tricarbonyl Compounds and Cyclopentenones from Etacrynic Acid

The γ -nitroketones **2**, **3**, and **10** are prepared by *Michael* addition of nitroalkanes to etacrynic acid **1**. The 1,4-dicarbonyl compounds **6** and **9** as well as the 1,4,7-triketone **11** are obtained from these substances by oxidation with KMnO_4 in the presence of MgSO_4 . **2** reacts with $\text{KMnO}_4/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ to yield the γ -keto carboxylic acid **5**. **5** is also accessible by addition of HCN to **1** and acidic hydrolysis of the pertinent nitrile **4**. On the other hand alkaline saponification of **4** yields the phenole **8**. **2** is oxidized to the benzoic acid **7** by alkaline H_2O_2 . The cyclopentenones **12** and **13** are prepared from **9** and **11** by intramolecular aldole condensation. **12** and **13** show different locations of the cyclic double bond.

1966 wurde Etacrynsäure **1** als stark wirksames Schleifen-Diureticum in die Therapie eingeführt. Als ursächlich für die Wirkung von Etacrynsäure wurde zunächst die Acryloyl-Gruppe angesehen, da diese leicht mit funktionell wichtigen Sulfhydryl-Gruppen reagieren kann²⁾. Später wurde erkannt, daß Aryloxyessigsäuren ohne Enon-Funktion wie die Dihydroetacrynsäure ebenfalls diuretisch wirksam sind³⁾. Auch ein Metabolit der Etacrynsäure, das Glutathion-Addukt⁴⁾, ist diuretisch aktiv. Seitdem wird der therapeutische Effekt von Etacrynsäure der Phenoxyessigsäure-Struktur zugeschrieben und das α,β -ungesättigte Keton für unerwünschte Nebenwirkungen verantwortlich gemacht⁵⁾. Der Verzicht auf die Enon-Funktion innerhalb dieser Diuretica-Klasse bringt dagegen als Gewinn einen uricosurischen Effekt. Zur präparativen "Entschärfung" der Enon-Struktur^{4,5)} wurde die Doppelbindung entweder in einen Heteroaromaten wie bei der Tienilsäure⁶⁾ eingebunden oder durch intramolekulare Cyclisierung wie bei der Indacrinsäure⁷⁾ verbraucht. Tienilsäure, ein Diureticum mit ausgeprägter uricosurischer Aktivität, mußte wegen Hepatotoxizität aus dem Handel zurückgezogen werden. Uns erschien es deshalb sinnvoll, die gesamte Enon-Funktion durch Heterocyclen zu ersetzen. Über Pyridin-Verbindungen aus Etacrynsäure, bei denen dieses Prinzip verwirklicht werden konnte, wurde bereits berichtet⁸⁾.

Als Vorstufe zu Furanen, Thiophenen und Pyrrolen sind 1,4-Dicarbonylverbindungen geeignet, die aus Etacrynsäure durch *Stetter*-Reaktion⁹⁾ zugänglich sein sollten. Alle Versuche, aus **1** mit aliphatischen und aromatischen Aldehyden durch Cyanid-Ionen- oder Thiazolium-Salz-Katalyse unter Umpolung zum Acyl-Anion 1,4-Dicarbonyl-Verbindungen zu erhalten, schlugen jedoch fehl.

Als alternativen Weg haben wir die *Michael*-Addition von Nitroalkanen an das Enon und die Umwandlung der γ -Nitrocarbonylverbindungen in die 1,4-Dicarbonylverbindungen durch *Nef*-Reaktion¹⁰⁾ eingeschlagen. Diese Reaktionsfolge mit dem abschließenden Austausch einer funktionellen Gruppe wird aufgrund einer retrosynthetischen Analyse als generelles Aufbauprinzip für 1,4-Diketone angesehen¹¹⁾.

Schema 1

Nitromethan bzw. Nitroethan reagierten im Überschuß mit dem konjugierten Keton von **1** in einer *Michael*-Addition zu den γ -Nitroketonen **2** und **3**. Die Darstellung von **2** gelang bei Raumtemp. und kurzer Reaktionszeit in Methanol unter Zusatz von Natriummethanolat. Für die Synthese von **3** mußten der Anteil der CH-aciden Komponente, Reaktionstemp. und -zeit drastisch erhöht werden. Von der Trennung des erhaltenen Diastereomeren-Gemisches **3** wurde abgesehen, da beide Diastereomere zum gleichen 1,4-Diketon führen.

Der Versuch, das Nitronat von **2** durch saure Hydrolyse (klassische *Nef*-Reaktion¹⁰⁾), in die 1,4-Dicarbonylverbindung **6** zu überführen, ergab nach der HPLC-Analyse neben **2** ein komplexes Produktgemisch, dessen Aufarbeitung nicht lohnte. Bei einer Variante der *Nef*-Reaktion erfolgt ein oxi-

^{*)} Herrn Prof. Dr. Dr. E. Mutschler mit den besten Wünschen zum 60. Geburtstag gewidmet.

Schema 2

dativer Abbau der Nitro-Gruppe unter Verwendung von H_2O_2 im basischen Milieu¹²⁾. Die Umsetzung von 2 mit H_2O_2 und K_2CO_3 führte zu einem Gemisch der γ -Ketocarbonsäure 5 und des Benzoesäurederivats 7; in stark alkalischer Lösung entstand 7 allein. 7 ist bereits auf einem anderen Weg synthetisiert worden und zeigte diuretische und uricosurische Aktivität¹³⁾. 5 ließ sich aus 2 am besten durch KMnO_4 -Oxidation im schwach basischen Medium bei Raumtemp. darstellen. 5 konnte auch durch saure Hydrolyse des Nitrils 4 gewonnen werden, das durch Cyanid-Addition an 1 leicht zugänglich war. Bei der alkalischen Verseifung des Nitrils 4 wurde überraschenderweise das Phenol 8 isoliert. Vermutlich erfolgt ein nucleophiler Angriff von Hydroxid-Ionen am aromatischen C-1 und Abspaltung von Glycolat. Zur Synthese von Aldehyden aus primären Nitroalkanen haben Shechter und Williams¹⁴⁾ basierend auf den Arbeiten von Nametkin¹⁵⁾ eine Modifikation der Nef-Reaktion entwickelt, die auf der Oxidation von Nitronaten mit äquivalenten Mengen von KMnO_4 in Gegenwart von MgSO_4 bei großer Verdünnung und niedriger Temp. beruht. Aus sekundären Nitroalkanen lassen sich unter diesen Reaktionsbedingungen, aber schon bei Raumtemp. die entsprechenden Ketone herstellen. Der Mechanismus der

Permanganat-Oxidation von Nitroalkanen in neutralem Milieu zu Carbonylverbindungen ist geklärt¹⁶⁾.

Durch Permanganat-Oxidation der γ -Nitrocarbonylverbindungen 2 und 3 nach der Methode von Shechter und Williams¹⁴⁾ wurden der γ -Ketoaldehyd 6 und das 1,4-Diketon 9 in guter Ausbeute erhalten.

Bei der Umsetzung äquimolarer Mengen 1 und Nitromethan konnte durch extreme Verlängerung der Reaktionszeiten das Bis-Addukt 10 isoliert und durch KMnO_4 -Oxidation nach Shechter und Williams¹⁴⁾ in das 1,4,7-Triketon 11 überführt werden. Für das Rohprodukt von 11 wurden im $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum Resonanzsignale für zwei Diastereomere im Verhältnis 1:1 beobachtet. Nach Umkristallisation aus Toluol wurde selektiv ein Diastereomer erhalten, während das andere auch mittels präp. HPLC nicht rein isolierbar war. Bei dem Nitroprodukt 10 traten weder im $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum noch bei der HPLC-Analyse getrennte Peaks für Diastereomere auf. Im $^{13}\text{C-NMR}$ -Spektrum wurden dagegen drei Signale um $\delta = 85$ für das C-Atom der CH-NO_2 -Gruppe registriert, während andere Resonanzsignale höchstens verdoppelt erschienen. - Bei Einsatz von Nitroethan konnte kein (2:1)-Addukt erhalten werden.

Aus dem 1,4-Diketon **9** und dem 1,4,7-Triketon **11** konnten durch basekatalysierte intramolekulare Aldol-Kondensation nach *Hunsdiecker*¹⁷⁾ die Cyclopentenone **12** und **13** dargestellt werden. **12** und **13** weisen eine unterschiedliche Lage der Doppelbindung im Fünfring auf. Den Beweis für die Struktur **12** liefert ein NOE-Differenzspektrum: Bei Sättigung des ¹H-Signals des olefinischen Protons 3'-H bei $\delta = 6.2$ werden die benachbarten Protonen der Ethyl-Gruppe signifikant verstärkt.

Unter den Reaktionsbedingungen der basekatalysierten Aldol-Kondensation bildet **11** infolge von Konfigurationsänderungen durch Enolisierung wieder ein Diastereomergemisch. Durch HPLC-Analyse zu Beginn der Umsetzung kann nachgewiesen werden, daß die Isomerisierung vor dem Ringschluß erfolgt. Das Rohprodukt **13** besteht aufgrund der Signalverdoppelung im ¹H-NMR-Spektrum aus einem Gemisch zweier Diastereomere. In der HPLC-Analyse erscheint **13** als ein breiter Peak, so daß die präp. HPLC nur eine mangelhafte Trennung der beiden Diastereomere erlaubt. Ein Diastereomer läßt sich dabei jedoch rein isolieren und analytisch charakterisieren. Das ¹H-NMR-Spektrum beweist die Struktur **13**, da kein olefinisches Proton registriert wird und die Methylenprotonen an C-4' des Fünfrings durch das benachbarte Chiralitätszentrum C-5' chemisch inäquivalent sind.

Die Cyclopentenone **12** und **13** stellen inverse Enone im Vergleich zur Etacrynsäure dar.

Experimenteller Teil

Allgemeine Angaben: Schmp.: Linström-Gerät, unkorrt.-Elementaranalysen: C-H-N-O-Elemental Analyzer 1106, Carlo Erba.- IR: PYE-Unicam SP 3-200.- ¹H-NMR: Bruker AM 400 (NMR-Laboratorium der Chemischen Institute der TU Braunschweig).- Massenspektren: Finnigan-MAT 8430 (Institut für Organische Chemie der TU Braunschweig); Elektronenstoß-Ionisation (EI)-MS: Ionisierungsenergie 70 eV; Chemische Ionisation (CI)-MS: Reaktand-Gas NH₃.- HPLC: LiChroGraph L-6200, LiChroGraph DAD L-3000, LiChroGraph D-6000.- Analytische HPLC: Säule: LiChroCart 125-4, LiChrospher 60 RP-select B (5 μ m); Eluent: MeCN/Phosphatpuffer pH 2.3 (1+1), 6.66 g KH₂PO₄ und 4.8 g 85proz. H₃PO₄ in H₂O zu 1000 ml Pufferlösung gelöst; Fluß: 1.000 ml/min, isokratisch; Injektionsvolumen: 20 μ l; Detektion (UV): 250 nm; Nettoretentionszeit (t_R) in min.- Präparative HPLC: Säule: LiChroCart 250-10 LiChrospher 100 RP-8 (10 μ m); Eluent: MeCN/Phosphatpuffer pH 2.3 (1+1); Fluß: 6.000 ml/min; Injektionsvolumen: 200 μ l (~ 20 mg Substanz); Detektionswellenlänge (UV): 250 nm.

[2,3-Dichlor-4-(2-ethyl-4-nitrobutyryl)phenoxy]essigsäure(2)

0.30 g (1 mmol) **1** werden mit einer Lösung von 0.05 g (2 mmol) Na^o in 5 ml MeOH versetzt und zu einer Lösung von 0.24 g (4 mmol) MeNO₂ sowie 0.12 g (5 mmol) Na^o in 5 ml MeOH getropft. Es wird 5 min bei Raumtemp. gerührt. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels i. Vak. nimmt man den Rückstand in H₂O auf und setzt 12proz. AcOH zu. Der Niederschlag wird abgesaugt und mit H₂O gewaschen. Farbloses Pulver, Schmp. ab 90°C (Zers., AcOH/H₂O). Ausb. 0.30 g (83%).- IR (KBr): $\tilde{\nu} = 2750-2550$ (OH), 1735 (C=O, Säure), 1695 (C=O), 1585 (C=C), 1550, 1350 (NO₂) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.92 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 1.53 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.73 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.24 (mc, 1H, CH-CH₂-CH₂), 2.47 (mc, 1H, CH-CH₂-CH₂),

3.36 (mc, 1H, CH), 4.40-4.58 (m, 2H, CH₂-NO₂) 4.82 (s, 2H, OCH₂), 6.82 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.33 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 175°C): m/z (%) = 363 (1) (M⁺), 247 (100).- HPLC: $t_R = 3.04$ min.- C₁₄H₁₃Cl₂NO₆ (364.2) Ber. C 46.2 H 4.15 N 3.9 Gef. C 46.1 H 4.15 N 3.7.

[2,3-Dichlor-4-(2-ethyl-4-nitrovaleryl)phenoxy]essigsäure(3)

0.30 g (1 mmol) **1** werden mit einer Lösung von 0.05 g (2 mmol) Na^o in 5 ml MeOH versetzt, zu 10 ml EtNO₂ getropft und 4 h unter Rückfluß erhitzt. Anschließend wird i. Vak. abdestilliert, der Rückstand in H₂O aufgenommen und mit 10proz. H₂SO₄ angesäuert. Nach Extraktion mit CH₂Cl₂ wird die org. Phase mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farblose Kristalle, Schmp. 115°C (CH₂Cl₂/n-Hexan). Ausb. 0.27 g (71%).- IR (KBr): $\tilde{\nu} = 2750-2500$ (OH), 1775 (C=O, Säure), 1670 (C=O), 1585 (C=C), 1550, 1350 (NO₂) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.87 (t, ³J = 7 Hz, 3H, CH₂-CH₃), 1.42-1.82 (4 mc-sept, ³J = 7 Hz, 2H, CH₂-CH₃), 1.56 und 1.59 (2d, J = 7 Hz, 3H, CH-CH₃), 1.90 und 2.52 (2 mc-sept, ²J = 15 Hz, 1H, CH-CH₂-CH), 2.06 und 2.26 (2 mc-sept, ²J = 15 Hz, 1H, CH-CH₂-CH), 3.17 und 3.25 (2 mc, 1H, CH-CO), 4.64 und 4.71 (2 mc, 1H, CH-NO₂), 4.83 (s, 2H, OCH₂), 6.81 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.33 und 7.36 (2d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 120°C): m/z (%) = 377 (3) (M⁺), 247 (100).- HPLC: $t_R = 3.88$ und 4.47 min.- C₁₅H₁₇Cl₂NO₆ (378.2) Ber. C 47.6 H 4.53 N 3.7 Gef. C 47.6 H 4.54 N 3.5.

[2,3-Dichlor-4-(2-cyanmethylbutyryl)phenoxy]essigsäure(4)

0.30 g (1 mmol) **1** werden in 5 ml EtOH gelöst und zu einer Lösung von 0.20 g (4 mmol) NaCN in 10 ml H₂O getropft. Man rührt 12 h bei Raumtemp.. Nach Zusatz von H₂O wird mit 10proz. H₂SO₄ angesäuert und mit CH₂Cl₂ ausgeschüttelt. Man wäscht die org. Phase mit H₂O, trocknet über Na₂SO₄ und destilliert das Lösungsmittel i. Vak. ab. Farblose Kristalle, Schmp. 89°C (CH₂Cl₂/Cyclohexan). Ausb. 0.25 g (76%).- IR (KBr): $\tilde{\nu} = 2700-2550$ (OH), 2250 (C≡N), 1740 (C=O, Säure), 1700 (C=O), 1585 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.92 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 1.67 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.87 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.65 (dd, J = 17, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CN), 2.77 (dd, J = 17, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CN), 3.67 (quint, J = 7 Hz, 1H, CH), 4.84 (s, 2H, OCH₂), 6.83 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.37 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 100°C): m/z (%) = 329 (2) (M⁺), 247 (100).- HPLC: $t_R = 1.80$ min.- C₁₄H₁₃Cl₂NO₄ (330.2) Ber. C 50.9 H 3.97 N 4.2 Gef. C 51.0 H 4.08 N 4.3.

3-(4-Carboxymethoxy-2,3-dichlorbenzoyl)valeriansäure(5)

A: 0.36 g (1 mmol) **2** werden in 5 ml MeOH gelöst und mit einer Lösung von 0.05 g (2 mmol) Na^o in 5 ml MeOH versetzt. Es wird 5 min bei Raumtemp. gerührt. Das Lösungsmittel wird i. Vak. abdestilliert und der Rückstand in 10 ml 5proz. Borax-Lösung aufgenommen. Nach Zugabe von 0.32 g (2 mmol) KMnO₄ in 10 ml 5proz. Borax-Lösung wird 30 min bei Raumtemp. gerührt. Man säuert mit 10proz. H₂SO₄ an und setzt bis zur Entfärbung Na₂S₂O₅ zu. Nach Extraktion mit Et₂O wird die org. Phase mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert.- B: 0.33 g (1 mmol) **4** werden mit 20 ml 6 N-HCl versetzt und 1 h unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird mit Et₂O extrahiert und nach Darstellung A weiter aufgearbeitet. Farblose Kristalle, Schmp. 158°C (CH₂Cl₂). Ausb. 0.26 g (74%) nach A; 0.17 g (50%) nach B.- IR (KBr): $\tilde{\nu} = 2800-2550$ (OH), 1760 (C=O, Säure), 1715 (C=O, Säure), 1700 (C=O), 1590 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 0.82 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 1.41 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.59 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.45 (dd, J = 17, J = 4 Hz, 1H, CH₂-COOH), 2.68 (dd, J = 17, J = 10 Hz, 1H, CH₂-COOH), 3.57 (mc, 1H, CH), 4.96 (s, 2H, OCH₂), 7.19 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H), 7.76 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H).- MS (EI; 170°C): m/z (%) = 348 (3) (M⁺), 247 (100).- HPLC: $t_R = 1.01$ min.- C₁₄H₁₄Cl₂O₆ (349.2) Ber. C 48.2 H 4.05 Gef. C 48.1 H 4.01.

[2,3-Dichlor-4-(2-ethyl-4-oxobutyl)phenoxy]essigsäure(6)

0.36 g (1 mmol) **2** werden in 100 ml 0.1 N-NaOH gelöst und mit 20 ml 20proz. MgSO₄-Lösung versetzt. Nach Zugabe von 300 ml Eiswasser wird eine Lösung von 0.11 g (0.7 mmol) KMnO₄ in 20 ml H₂O zugetropft. Es wird 5 min bei 0°C gerührt. Man säuert mit 20 ml 10proz. Oxalsäure-Lösung an und extrahiert nach 1 h mit CH₂Cl₂. Die org. Phase wird mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farblose Kristalle, Schmp. 105°C (CH₂Cl₂/n-Hexan). Ausb. 0.28 g (85%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2550 (OH), 1750 (C=O, Säure), 1720 (C=O, Aldehyd), 1700 (C=O), 1585 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.90 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 1.50 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.71 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.63 (dd, J = 19, J = 4 Hz, 1H, CH₂-CHO), 3.16 (dd, J = 19, J = 9 Hz, 1H, CH₂-CHO), 3.68 (mc, 1H, CH), 4.82 (s, 2H, OCH₂), 6.83 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.62 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H), 9.82 (s, 1H, CHO).- MS (EI; 75°C): m/z (%) = 314 (38) (M⁺ + H), 247 (100). MS (CI; 130°C): m/z (%) = 333 (68) (M⁺ - H₂O), 315 (100).- HPLC: t_R = 1.67 min.- C₁₄H₁₄Cl₂O₅ (333.2) Ber. C 50.5 H 4.24 Gef. C 50.5 H 4.21.

4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorbenzoesäure(7)

0.36 g (1 mmol) **2** werden in 10 ml N-NaOH gelöst und mit 10 ml 30proz. H₂O₂ 6 h bei Raumtemp. gerührt. Nach Ansäuern mit 10proz. H₂SO₄ und Zusatz von Na₂SO₃ zur Entfernung von überschüssigem H₂O₂ wird mit Et₂O ausgeschüttelt. Die org. Phase wird mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farbloses Pulver, Schmp. ab 250°C (Zers., CH₂Cl₂), (Lit.¹³): > 250°C). Ausb. 0.12 g (45%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2500 (OH), 1715 (C=O, br), 1590 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 4.96 (s, 2H, OCH₂), 7.14 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.78 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 170°C): m/z (%) = 264 (100) (M⁺).- HPLC: t_R = 0.45 min.- C₉H₆Cl₂O₅ (265.05) Ber. C 40.8 H 2.28 Gef. C 40.7 H 2.47.

3-(2,3-Dichlor-4-hydroxybenzoyl)valeriansäure(8)

0.33 g (1 mmol) **4** werden in 25 ml 25proz. NaOH gelöst und 12 h unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen säuert man mit 30proz. H₂SO₄ an und schüttelt mit CH₂Cl₂ aus. Die org. Phase wird mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farblose Kristalle, Schmp. 95°C (CH₂Cl₂/n-Hexan). Ausb. 0.10 g (34%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3250 (OH, br), 2750-2550 (OH, Säure), 1700 (C=O, Säure), 1665 (C=O), 1585 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 0.80 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 1.40 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.58 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.42 (dd, J = 17, J = 4 Hz, 1H, CH₂-COOH), 2.66 (dd, J = 17, J = 10 Hz, 1H, CH₂-COOH), 3.55 (mc, 1H, CH), 7.06 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H), 7.65 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 11.38 (s, br, 1H, Ar-OH, a).- MS (EI; 60°C): m/z (%) = 290 (3) (M⁺), 189 (100).- HPLC: t_R = 1.02 min.- C₁₂H₁₂Cl₂O₄ (291.1) Ber. C 49.5 H 4.15 Gef. C 49.2 H 4.17.

[2,3-Dichlor-4-(2-ethyl-4-oxovaleryl)phenoxy]essigsäure(9)

0.38 g (1 mmol) **3** werden in 100 ml 0.1 N-NaOH gelöst und mit 20 ml 20proz. MgSO₄-Lösung versetzt. Nach Zugabe von 0.32 g (2 mmol) KMnO₄ in 10 ml H₂O wird 1 h bei Raumtemp. gerührt. Man säuert mit 10proz. H₂SO₄ an und setzt bis zur Entfärbung Na₂S₂O₅ zu. Nach Ausschütteln mit CH₂Cl₂ wird die org. Phase mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Hellgelber Filz, Schmp. ab 40°C (Zers., CH₂Cl₂/n-Hexan). Ausb. 0.28 g (80%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2500 (OH), 1750 (C=O, Säure), 1700 (C=O, br), 1585 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.88 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₂-CH₃), 1.45 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 1.67 (mc-sept, J = 7 Hz, 1H, CH₂-CH₃), 2.22 (s, 3H, CH₃-CO), 2.56 (dd, J = 18, J = 4 Hz, 1H, CH₂-CO), 3.15 (dd, J = 18, J = 10 Hz, 1H, CH₂-CO), 3.61 (mc, 1H, CH), 4.81 (s, 2H, OCH₂), 6.83 (d, J = 9 Hz, 1H, 6-H), 7.69 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 90°C): m/z (%) = 346 (3) (M⁺), 247 (100).- HPLC: t_R = 2.02 min.- C₁₅H₁₆Cl₂O₅ (347.2) Ber. C 51.9 H 4.65 Gef. C 51.9 H 4.67.

2,2'-[(2,6-Diethyl-4-nitro-1,7-dioxo-1,7-heptandiyl)bis[(2,3-dichlor-4,1-phenylenoxy)]]diessigsäure(10)

0.61 g (2 mmol) **1** werden in 10 ml MeOH gelöst und zu einer Lösung von 0.12 g (2 mmol) MeNO₂ sowie 0.07 g (3 mmol) Na⁰ in 10 ml MeOH getropft. Es wird 14 d bei Raumtemp. gerührt. Der Niederschlag wird abgesaugt, mit 10proz. H₂SO₄ versetzt und mit H₂O gewaschen. Farbloses Pulver, Schmp. ab 130°C (Zers., AcOH/H₂O). Ausb. 0.41 g (61%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2450 (OH), 1735 (C=O, Säure), 1700 (C=O), 1580 (C=C), 1550, 1360 (NO₂) cm⁻¹.- ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 0.76 (t, J = 7 Hz, 6H, CH₃), 1.47 (mc-sept, J = 7 Hz, 2H, CH₂-CH₃), 1.60 (mc-sept, J = 7 Hz, 2H, CH₂-CH₃), 1.91 (mc, 2H, CH-CH₂-CH), 2.32 (mc, 2H, CH-CH₂-CH), 3.25 (mc, 2H, CH-CO), 4.77 (mc, 1H, CH-NO₂), 4.84 (s, 4H, OCH₂), 7.09 (d, J = 9 Hz, 2H, 6-H), 7.56 (d, J = 9 Hz, 2H, 5-H).- ¹³C-NMR ([D₆]DMSO) (100.6 MHz) + DEPT: δ (ppm) = 10.40 und 10.51 (CH₃), 23.63 und 24.37 (CH₂-CH₃), 33.18 und 33.46 (CH-CH₂-CH), 46.86 und 47.04 (CH-CO), 67.16 (OCH₂), 84.50, 84.95 und 85.40 (CH-NO₂), 111.54 (C-6), 121.68 und 121.72 (qu. C, arom.), 127.88 und 128.06 (C-5), 129.94 (qu. C, arom.), 130.79 und 131.08 (qu. C, arom.), 157.18 (C-4), 169.46 (COOH), 201.62 und 202.00 (CO, Keton).- MS (EI; 210°C): m/z (%) = 616 (2) (M⁺ - HNO - H₂O), 247 (100). MS (CI; 300°C): m/z (%) = 648 (2) (M⁺ + H - H₂O), 327 (100).- HPLC: t_R = 6.62 min.- C₂₇H₂₇Cl₄NO₁₀ (667.3) Ber. C 48.6 H 4.08 N 2.1 Gef. C 48.5 H 4.07 N 2.1.

2,2'-[(2,6-Diethyl-1,4,7-trioxo-1,7-heptandiyl)bis[(2,3-dichlor-4,1-phenylenoxy)]]diessigsäure(11)

0.67 g (1 mmol) **10** werden unter Erwärmen in 100 ml 0.1 N-NaOH gelöst und mit 20 ml 20proz. MgSO₄-Lösung versetzt. Nach Zugabe von 0.32 g (2 mmol) KMnO₄ in 20 ml H₂O wird 3 h bei Raumtemp. gerührt. Man säuert mit 40 ml 10proz. Oxalsäure-Lösung an und extrahiert nach 1 h mit CH₂Cl₂. Die org. Phase wird mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farblose Kristalle, Schmp. ab 170°C (Zers., Toluol). Ausb. 0.20 g (31%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2500 (OH), 1735 (C=O, Säure), 1715, 1680 (C=O), 1585 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 0.80 (t, J = 7 Hz, 6H, CH₂-CH₃), 1.38 (mc-sept, J = 7 Hz, 2H, CH₂-CH₃), 1.56 (mc-sept, J = 7 Hz, 2H, CH₂-CH₃), 2.70 (dd, J = 18, J = 4 Hz, 2H, CH₂-CO), 3.00 (dd, J = 18, J = 9 Hz, 2H, CH₂-CO), 3.57 (mc, 2H, CH), 4.95 (s, 4H, OCH₂), 7.16 (d, J = 9 Hz, 2H, 6-H), 7.74 (d, J = 9 Hz, 2H, 5-H).- MS (EI; 200°C): m/z (%) = 616 (40) (M⁺ - H₂O), 327 (100).- HPLC: t_R = 5.89 (6.99) min.- C₂₇H₂₆Cl₄O₉ (636.3) Ber. C 51.0 H 4.12 Gef. C 51.0 H 4.16.

[2,3-Dichlor-4-(2-ethyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl)phenoxy]essigsäure(12)

0.35 g (1 mmol) **9** werden in 20 ml 0.5 N-NaOH gelöst und 15 min unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird mit 10proz. H₂SO₄ angesäuert und mit CH₂Cl₂ ausgeschüttelt. Die org. Phase wird mit H₂O gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Farblose Kristalle, Schmp. 170°C (Aceton/n-Hexan). Ausb. 0.17 g (52%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2500 (OH), 1750 (C=O, Säure), 1660 (C=O), 1610, 1595 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 1.13 (t, J = 7 Hz, 3H, CH₃), 2.15-2.35 (m, 3H, CH₂-CH₃, 5'-b-H), 3.02 (dd, J = 18, J = 7 Hz, 1H, 5'-a-H), 4.65 (mc, 1H, 1'-H), 4.75 (s, 2H, OCH₂), 6.20 (s, 1H, 3'-H), 6.78 (s, 2H, 5-H, 6-H).- MS (EI; 125°C): m/z (%) = 328 (100) (M⁺).- HPLC: t_R = 1.82 min.- C₁₅H₁₄Cl₂O₄ (329.2) Ber. C 54.7 H 4.29 Gef. C 54.7 H 4.26.

[4-[2-[1-(4-Carboxymethoxy-2,3-dichlorphenyl)-5-ethyl-3-oxo-1-cyclopenten-2-yl]butyryl]-2,3-dichlorphenoxy]essigsäure(13)

Darstellung analog **12** aus **11**; der Rückstand wird durch präp. HPLC gereinigt. Farbloses Pulver, Schmp. ab 85°C (Zers., Ether/n-Hexan). Ausb. 0.19 g (31%).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2800-2500 (OH), 1730 (C=O, Säure), 1700, 1665 (C=O), 1580 (C=C) cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 0.81 (mc,

6H, CH₃), 1.26 (mc, 1H, 5'-CH₂H-CH₃), 1.45 (mc, 1H, 5'-CH₂H-CH₃), 1.88 (mc, 2H, CH₂-CH₃), 2.27 (dd, J = 18, J = 2 Hz, 1H, 4'-b-H), 2.75 (dd, J = 18, J = 6 Hz, 1H, 4'-a-H), 3.32 (mc, 1H, 5'-H), 3.75 (t, J = 7 Hz, 1H, CH-CO), 4.81 und 4.84 (2s, 4H, OCH₂), 6.72-6.78 (m, 3H, 5''-H, 6''-H, 6-H), 7.06 (d, J = 9 Hz, 1H, 5-H).- MS (EI; 400°C): m/z (%) = 616 (2) (M⁺), 247 (100).- HPLC: t_r = 3.8-4.2 min.- C₂₇H₂₄Cl₄O₈ (618.3) Ber. C 52.5 H 3.91 Gef. C 52.3 H 4.33.

Literatur

- 1 Aus der Dissertation *M. Bömeke*, TU Braunschweig 1990.
- 2 E.M. Schultz, E.J. Cragoe Jr., J.B. Bicking, W.A. Bolhofer und J.M. Sprague, *J. Med. Pharm. Chem.* **5**, 660 (1962); D.E. Duggan und R.M. Noll, *Arch. Biochem. Biophys.* **109**, 388 (1965).
- 3 E.J. Cragoe Jr., E.M. Schultz, J.D. Schneeberg, G.E. Stokker, O.W. Woltersdorf Jr., G.M. Fanelli Jr. und L.S. Watson, *J. Med. Chem.* **18**, 225 (1975).
- 4 E.F. Cragoe Jr., *Diuretic Agents*, ACS Symposium Series 83, S. 56 und 190 ff. et loc. cit., Am. Chem. Soc., Washington D.C. 1978.
- 5 G. Satzinger, *Dtsch. Apoth. Ztg.* **119**, 1773 (1979).
- 6 G. Thuillier, J. Laforest, B. Cariou, P. Bessin, J. Bonnet und J. Thuillier, *Eur. J. Med. Chem.* **9**, 625 (1974).
- 7 S.J. deSolms, O.W. Woltersdorf Jr., E.J. Cragoe Jr., L.S. Watson und G.M. Fanelli Jr., *J. Med. Chem.* **21**, 437 (1978).
- 8 K. Görlitzer und W. Düwel, *Arch. Pharm. (Weinheim)* **319**, 594 (1986).
- 9 H. Stetter, *Angew. Chem.* **88**, 695 (1976).
- 10 J.U. Nef, *Liebigs Ann. Chem.* **280**, 263 (1894).
- 11 E.J. Corey und X.-M. Cheng, *The Logic of Chemical Synthesis*, S. 11, John Wiley & Sons, New York 1989.
- 12 G.A. Olah, M. Arvanaghi, Y.D. Vankar und G.K.S. Prakash, *Synthesis* **1980**, 662.
- 13 a) Smithkline Corp. (Erf.: A.R. Maass), US Pat. 4076839 (28.2.1978); C.A. **89**, 12172h (1978). b) Smithkline Corp. (Erf.: J.S. Laforest), US Pat. 4219663 (26.8.1980); C.A. **94**, 30376k (1981).
- 14 H. Shechter und F.T. Williams Jr., *J. Org. Chem.* **27**, 3699 (1962).
- 15 a) S. Nametkin und E. Posdnjakowa, *J. Russ. Phys. Chem. Ges.* **45**, 1420 (1913); C.A. **8**, 324 (1913). b) S. Nametkin und O. Madaef-Ssitscheff, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **59**, 370 (1926). c) S. Nametkin und A.S. Zabrodina, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **69**, 1789 (1936).
- 16 F. Freeman und A. Yeramyam, *J. Org. Chem.* **35**, 2061 (1970).
- 17 H. Hunsdiecker, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **75**, 455 (1942). [Ph883]