her nicht zugänglich waren ($R^4 = \text{Acyl, Tosyl; } n = 1$). Sowohl die Heterocyclium-Salze **1** und **2** als auch die Hydrazone **3** und **4** können in weiten Grenzen variiert werden (Tabelle).

Azomethylen-Heterocyclen aus Heterocyclium-Salzen und Hydrazone

A. M. RICHTER, C. K. J. TSCHÖTSCH, E. FANGHÄNEL*

Sektion Chemie der Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“, Leuna-Merseburg, Geusaer Str., DDR-4200 Merseburg, Deutsche Demokratische Republik

Azomethylen-Heterocyclen sind als Farbstoffe und Farbstoffzwischenprodukte von allgemeinem Interesse¹. Sie können durch Kupplung heterocyclischer Methylen-Basen mit Diazonium-Salzen gewonnen werden². Dieser Methode sind aber wegen der zum Teil aufwendigen Synthesen der Methylen-Basen Grenzen gesetzt. In der Reaktion der nucleofug substituierten Heterocyclium-Salze **1** und **2** mit den Hydrazone **3** und **4** in Gegenwart einer Base fanden wir einen präparativ einfachen Zugang zu Azomethylen-Heterocyclen **5**, **6** und **7**, wobei auch solche Vertreter erhältlich sind, die bis-

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens beruht auf der Möglichkeit, die oft leicht zugänglichen Heterocyclium-Salze³ **1** und **2** einsetzen zu können. Als Basen haben sich insbesondere bicyclische Amidine, z. B. 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU)^{4,5} bewährt. Die Azomethylen-Heterocyclen **5**, **6** und **7** sind tiefgefärbte, in polaren Lösungsmitteln gut lösliche Verbindungen. Die Lage der längstwelligen Absorptionsmaxima entspricht den Erwartungen^{6,7}. Die nur geringe langwellige Verschiebung des Absorptionsmaximums für eine zusätzliche vinyloge Einheit von 27–46 nm beim Übergang von **5** zu **6** legt einen merocyaninartigen Charakter der Verbindungen nahe. Ihre umfassende spektroskopische Charakterisierung erfolgt an anderer Stelle. Mikroanalyse und massenspektroskopische Untersuchungen stützen die Struktur der hergestellten Azo-Derivate.

Azomethylen-Heterocyclen **5**, **6**, **7**; allgemeine Arbeitsvorschrift:

Eine Lösung von Hydrazone **3**, **4** (3 mmol) in Acetonitril wird mit dem heterocyclischen Salz³ **1**, **2** (3 mmol) versetzt und dazu 1,8-Diazabi-

Tabelle. Azomethylen-Heterocyklen 5 (n=0, Y=S), 6 (n=1, Y=S) und 7 (n=1, Y=Se)

Produkt Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	Ausbeute [%]	F [°C]	Summen- formel ^a	U.V. (CH ₃ CN) λ _{max} [nm] (log ε)
5 a	-(CH ₂) ₄ -				24	155°	C ₂₀ H ₁₈ N ₂ S ₂ (350.5)	493 (4.06)
5 b	-(CH ₂) ₄ -				40	195-196°	C ₂₁ H ₁₈ N ₂ OS ₂ (378.5)	515 (3.87)
5 c	-(CH ₂) ₄ -				33	180°	C ₁₉ H ₁₇ N ₃ S ₂ (351.5)	506 (3.89)
5 d	-(CH ₂) ₄ -				42	195°	C ₂₁ H ₁₇ N ₃ S ₃ (407.6)	566 (4.42)
5 e	-(CH ₂) ₄ -				42	200°	C ₂₀ H ₁₇ N ₃ O ₂ S ₂ (395.5)	559 (4.52)
5 f	-(CH ₂) ₄ -				22	106°	C ₂₁ H ₂₀ N ₂ OS ₂ (380.5)	498 (4.02)
5 j	-(CH ₂) ₄ -				22	112-113°	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ OS ₂ (340.5)	517 (4.12)
5 k	-(CH ₂) ₄ -				48	138°	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ S ₃ (356.5)	513 (4.29)
5 l	-(CH ₂) ₄ -				18	95°	C ₂₂ H ₁₉ N ₃ S ₂ (389.6)	504 (3.66)
5 m	-(CH ₂) ₄ -				44	199°	C ₂₀ H ₁₇ N ₃ O ₂ S ₂ (395.5)	493 (4.36)
5 n	-(CH ₂) ₄ -				41	175°	C ₂₀ H ₁₇ ClN ₂ S ₂ (385.0)	499 (4.34)
5 o	-(CH ₂) ₄ -				20	180°	C ₂₂ H ₂₃ N ₃ S ₂ (393.6)	502 (4.17)
5 p	-(CH ₂) ₄ -		H		45	186°	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₂ S ₂ (319.4)	545 (4.40)
5 q	-(CH ₂) ₄ -		CH ₃		30	216°	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂ S ₂ (333.4)	557 (4.38)
6 a	-(CH ₂) ₄ -				43	231°	C ₂₂ H ₂₀ N ₂ S ₂ (376.6)	520 (3.93)
6 b	-(CH ₂) ₄ -				15	170°	C ₂₃ H ₂₀ N ₂ OS ₂ (404.6)	561 (3.58)
6 c	-(CH ₂) ₄ -				34	219°	C ₂₁ H ₁₉ N ₃ S ₂ (377.5)	538 (4.07)
6 d	-(CH ₂) ₄ -				31	255°	C ₂₃ H ₁₉ N ₃ S ₂ (401.6)	595 (4.46)
6 e	-(CH ₂) ₄ -				19	225°	C ₂₂ H ₁₉ N ₃ O ₂ S ₂ (421.6)	594 (4.06)
6 g	-(CH ₂) ₄ -				37	235-236°	C ₂₂ H ₁₉ ClN ₂ S ₂ (411.0)	535 (4.29)
6 h	-(CH ₂) ₄ -				24	235-236°	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ S ₂ (390.6)	523 (4.26)
6 i	-(CH ₂) ₄ -				40	167°	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₂ S ₃ (454.6)	522
6 r					49	101-102°	C ₂₆ H ₂₀ N ₂ S ₂ (426.6)	531 (3.62)
6 s					16	93-95°	C ₂₆ H ₁₈ N ₂ S ₂ (422.6)	510 (3.66)
6 t		H			12	181°	C ₂₄ H ₁₈ N ₂ S ₂ (398.6)	515 (4.27)
7 t		H			28	168°	C ₂₄ H ₁₈ N ₂ SSe (445.5)	528 (3.93)

^a Die Mikroanalysen zeigten folgende maximale Abweichungen von den berechneten Werten: C, ±0.29; H, ±0.12; N, ±0.20; S, ±0.21.

cyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU; 0.76 g, 5 mmol) gegeben. Die Lösung wird bei 25°C gerührt, bis die Farbstoffbildung beendet ist (Kontrolle durch UV/VIS-Spektroskopie). Ausgefällene Produkte werden abgesaugt, mit wenig Acetonitril gewaschen und getrocknet. Bei leichtlöslichen Vertretern wird die Hauptmenge des Acetonitrils im Vakuum abdestilliert. Schmierig anfallende Farbstoffe werden durch Säulenchromatographie an neutralem Aluminiumoxid mit Chloroform, Ether oder *n*-Hexan/Ether (3/1) gereinigt.

Eingang: 8. März 1983

* Korrespondenz-Adresse.

- ¹ R. Raue, W. Kruckenberg, *German Patent (DOS)* 2 630 233 (1978), Bayer AG; *C. A.* **88**, 137 896 (1978).
- ² E. Enders, in Houben-Weyl, *Methoden der Organischen Chemie*, 4. Aufl., Bd. X/3, herausgegeben von E. Müller, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1965, S. 520; Lit.-Zusammenfassung siehe dort.
- ³ E. Fanghänel, *J. Prakt. Chem.* **317**, 123 (1975).
- ⁴ H. Oediger, H. J. Kabbe, F. Möller, K. Eiter; *Chem. Ber.* **99**, 20 212 (1966).
- ⁵ H. Oediger, F. Möller, *Angew. Chem.* **79**, 53 (1967).
- ⁶ S. Dähne, *Z. Chem.* **5**, 441 (1965).
- ⁷ M. Klessinger, *Chemie Unserer Zeit* **12**, 1 (1978).