Table 2. X-ray powder diffraction data of $3\text{Nd}_2\text{O}_3 \cdot \text{Sb}_2\text{O}_5$. The indexing is based on the cubic cell with dimension $a = 10.82 \text{ \AA}$

$3\text{Nd}_2\text{O}_3 \cdot \text{Sb}_2\text{O}_5$			
$h^2 + k^2 + l^2$	$d_{\text{obs.}}$	$d_{\text{calc.}}$	I/I_0
3	3.124	3.124	100
4	2.704	2.705	28
8	1.913	1.913	34
11	1.631	1.631	25
12	1.561	1.562	6
16	1.352	1.353	3
19	1.240	1.241	5
20	1.210	1.210	7
24	1.105	1.104	5

Table 3. X-ray diffraction data of $2\text{Nd}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{Sb}_2\text{O}_5$. The indexing is based on the cubic cell with dimension $a = 5.495 \text{ \AA}$

$h^2 + k^2 + l^2$	d ($\text{\AA}$)
3	3.178 (s)
4	2.748 (m)
8	1.943 (m)
11	1.657 (m)

Fig. 1. DTA and TGA curves of the system $3\text{Nd}_2\text{O}_3\text{-Sb}_2\text{O}_5$.

Department of Applied Chemistry
Faculty of Engineering
Osaka University
Yamadakami, Suita-shi, Osaka-fu
Japan

GIN-YA ADACHI
TADASHI HIGUCHI
JIRO SHIOKAWA

La réaction des nitrilotriacetates métalliques avec l'homoproline

(First received 11 August 1970; in revised form 25 August 1970)

ON A étudié seulement récemment les complexes simples de l'homoproline (l'acide piperidine carboxylique (2)) avec les métaux de transition [1, 2] et aucun complexe mixte contenant ce ligand n'a été étudié jusqu'à présent.

1. A. Weiss, S. Fallab et H. Erlenmeyer, *Helv. Chim. Acta* **38**, 265 (1955).
2. A. Arbus et C. Tissier, *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris* **264C**, 1049 (1967).

Dans ce travail nous avons étudié les complexes mixtes qui résultent de la réaction des nitrilotriacetates métalliques avec l'homoproline.

L'homoproline est un amino-acide contenant un azote secondaire cyclisé et se comporte comme un ligand bicoordinant. Par conséquence on a eu l'intérêt de comparer le comportement de ce ligand avec le comportement des amino-acides qui paraissent dans des processus biochimiques.

Des complexes mixtes contenant des amino-acides usuels ont été étudié auparavant dans ce laboratoire [3-6] et ailleurs [7-11].

EXPERIMENTALES

On a utilisé des solutions de nitrate métallique étalonnées préalablement par des méthodes complexométriques [12, 13]. L'homoproline (*d, l*) utilisé fut un produit de la firme Nutritional Biochemicals Corporation.

Les titrages ont été effectués dans un becher à parois double relié à un thermostat circulateur de type Corala et la température a été maintenue constante avec une précision de 0,02°C.

Pour mesurer les pH on a utilisé un pH mètre "Radiometer Modèle 26". Le pH mètre a été calibré à l'aide de solutions tampons dont on connaît le pH à chaque température. On a calculé la concentration des protons par la formule $a_+ = C_+ \cdot f$ et pour calculer f on a utilisé l'équation de Davies mentionné dans l'ouvrage de Butler [14]. Tout les expériences furent effectuées à une force ionique de $I = 0,1 \text{ M KNO}_3$.

RÉSULTATS

On a titré à l'aide de soude des mélanges contenant des quantités équimoléculaires de nitrate métallique (Me^{2+}), de nitrilotriacetate disodique (XH^{2-}) et de *d, l* homoproline (*LH*). Sur la Fig. 1 on montre des titrages typiques effectuées à 25°C. Soit " a " le nombre de moles de soude ajouté par mole de métal. De la Fig. 1 on voit clairement qu'il y a deux points d'inflexion situés respectivement à $a = 1$ et à $a = 2$. Jusqu'à $a = 1$ on forme le complexe simple MeX^- par la réaction

Entre $a = 1$ et $a = 2$ il se forme le complexe mixte MeXL^{2-} par la réaction

La constante de formation K_f du complexe mixte a été calculé par la méthode de Schwarzenbach et Martell [15, 16] utilisant les points expérimentaux de la région située entre $a = 1$ et $a = 2$. Comme nous l'avons démontré auparavant [4-6], par cette méthode on obtient les formules de calcul suivantes:

$$(L^-) = \frac{(2-a)C_{\text{Me}} + (\text{OH}^-) - (\text{H}^+)}{(\text{H}^+)/K_1} \quad (3)$$

3. J. Israeli, *Can. J. Chem.* **41**, 2710 (1963).
4. J. Israeli et M. Cecchetti, *Talanta* **15**, 1031 (1968).
5. J. Israeli et M. Cecchetti, *J. inorg. nucl. Chem.* **30**, 2709 (1968).
6. J. Israeli et M. Cecchetti, *Can. J. Chem.* **46**, 3821 (1968).
7. N. E. Jacobs et D. W. Margerum, *Inorg. Chem.* **6**, 2038 (1967).
8. D. Hopgood et R. Angelici, *J. Am. chem. Soc.* **90**, 2508 (1968).
9. D. D. Perrin, J. G. Sayce et V. S. Sharma, *J. Am. chem. Soc.* 1755 (1967).
10. R. P. Martin et R. A. Paris, *Bull. Soc. chim. Fr.* 3170 (1964).
11. G. Degischer et G. H. Nancollas, *Inorg. Chem.* **9**, 1259 (1970).
12. H. Flaschka, *EDTA Titrations*. Pergamon Press, Oxford (1959).
13. F. J. Welcher, *The Analytical Use of EDTA*. Van Nostrand, New York (1958).
14. J. N. Butler, *Ionic Equilibrium* p. 437. Addison Wesley (1964).
15. G. Schwarzenbach, A. Willi et O. R. Bach, *Helv Chim. Acta* **30**, 1303 (1947).
16. S. Chaberek et A. E. Martell, *J. Am. chem. Soc.* **74**, 5053 (1952).

Fig. 1. Titration à l'aide de soude d'un mélange équimoléculaire de nitrate de métal 0,02 M en présence du nitrilotriacétate disodique 0,02 M et de homoproline 0,02 M à une force ionique $I = 0,1$ M KNO_3 et à une température de 25°C . Le nombre de moles de soude ajouté par mole de métal est noté par "a". 1 - Me = Cu; → 2 - Me = Ni; → 3 - Me = Zn; → 4 - Me = Co; 5 - Me = Cd.

$$K_f(L^-) + 1 = \frac{C_{\text{Me}}}{(L^-)\{1 + (H^+)/K_1\}} = y \quad (4)$$

Dans ces formules C_{Me} est la concentration totale du métal et K_1 est la constante de dissociation de LH. Sur la Fig. 2 on montre un graphique typique pour le calcul de K_f . On a obtenu la même valeur de K_f lorsque les concentrations initiales $C_{\text{Me}} = C_X = C_L$ varient entre 0,02 M et 0,004 M.

Dans le Tableau 1 on donne les valeurs de $\text{p}K_1$ à différentes températures. Avec l'aide de ces valeurs de $\text{p}K_1$ on a calculé $\log K_f$ à différentes températures et les résultats sont donnés dans le Tableau 2.

Pour calculer l'enthalpie de la réaction de formation des complexes mixtes (ΔH°) on a fait un graphique de $\ln K_f$ envers $1/T$ et on a multiplié par R la pente de la ligne résultante. À chaque température on a calculé la valeur de ΔS° en utilisant les formules:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (5)$$

et

$$\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K_f \quad (6)$$

Fig. 2. Calcul de la constante de formation du complexe mixte de cuivre pour des concentrations initiales $C_{Me} = C_x = C_L = 0,02$ M et $t = 25^\circ\text{C}$.

Tableau 1. Les valeurs de pK_1 à différentes températures a $I = 0,1$ M KNO_3

t	15°C	25°C	50°C	70°C
pK_1	$10,74 \pm 0,01$	$10,52 \pm 0,01$	$9,89 \pm 0,01$	$9,47 \pm 0,01$

Les valeurs moyennes de ΔS° , comme ΔH° sont également donnés dans le Tableau 2.

DISCUSSION

Les résultats du Tableau 2 nous montre clairement que les constantes de formation des complexes mixtes suivent, à chaque température, la série de Irving-Williams[17] et on peut les arranger d'après l'ordre suivant.

Il est intéressant de noter que la réaction de formation des complexes mixtes est une réaction exothermique et que l'exothermicité de cette réaction suit le même ordre que les constantes de stabilité.

On remarque également qu'on a obtenu un ΔS° négatif seulement pour cuivre (II) tandis que pour les autres métaux on obtient des petites valeurs de ΔS° qui d'ailleurs sont positives. On explique les valeurs positives de ΔS° obtenues dans le cas du Ni, Co, Zn, Cd, en supposant que le métal reste hexacoordonné et admettant que la formation du complexe mixte est accompagné par la libération de deux molécules d'eau liés au métal et le remplacement de ceux ci par le ligand bicoordinant.

Pour expliquer la diminution d'entropie qui accompagne la formation du complexe mixte de

Tableau 2. Les constantes de formation de complexes mixtes $MeXL^{2-}$ et les enthalpies et entropies de la réaction de formation de ces complexes $a. I = 0,1 M KNO_3$

Metal	$\log K_f$				$-\Delta H^\circ$ kcal/mole	ΔS° u.e./mole
	15°C	25°C	50°C	70°C		
Cu(II)	$5,56 \pm 0,01$	$5,33 \pm 0,01$	$4,72 \pm 0,01$	$4,38 \pm 0,01$	$10,1 \pm 0,6$	$-9,6 \pm 0,1$
Ni(II)	$4,16 \pm 0,02$	$4,12 \pm 0,02$	$3,75 \pm 0,02$	$3,64 \pm 0,02$	$4,8 \pm 0,4$	$+2,6 \pm 0,2$
Zn(II)	$3,32 \pm 0,05$	$3,19 \pm 0,05$	$2,96 \pm 0,05$	$2,82 \pm 0,05$	$4,3 \pm 0,2$	$+0,2 \pm 0,1$
Co(II)	$3,09 \pm 0,02$	$3,03 \pm 0,02$	$2,84 \pm 0,02$	$2,69 \pm 0,02$	$3,5 \pm 0,4$	$+2,3 \pm 0,1$
Cd(II)	$2,48 \pm 0,05$	$2,44 \pm 0,05$	$2,31 \pm 0,05$	$2,26 \pm 0,05$	$2,3 \pm 0,2$	$+3,5 \pm 0,1$

cuivre (II) nous supposons que dû à l'effet Jahn-Teller deux groupement carboxylés axiales provenant de nitrilotriacetate s'éloignent du metal et sont ensuite solvatés. L'effet Jahn-Teller se manifeste également par la fait que la réaction de formation du complexe mixte de cuivre est beaucoup plus exothermique que la réaction de formation du complexe mixte de nickel. D'après Yatsimirskii [18] si une réaction pour cuivre est plus exothermique que la réaction correspondante du nickel, c'est une preuve que dans le cuivre il y a une stabilisation par l'effet Jahn-Teller.

Nancollas (11) a observé récemment que $\Delta S^\circ = -14$ u.e. pour la réaction de formation du complexe mixte cuivre-ethylenediaminediacetate-ethylenediamine a partir de cuivre-ethylenediaminediacetate et ethylenediamine. Il a suggeré également que la réaction de formation de ce complexe mixte est accompagné par la liberation de deux groupements carboxylés et leur solvation simultanée.

Si K_f (homoproline) et K_f (glycine) sont respectivement les constantes de formation des complexes mixtes resultant de la réaction des nitrilotriacetates metalliques avec l'homoproline ou avec la glycine, on peut écrire pour eux la relation lineaire suivante:

$$\log K_f(\text{homoproline}) = 1,28 \log K_f(\text{glycine}) + 1,10 \quad (7)$$

Les constants de formation des complexes mixtes contenant glycine ont été redeterminees dans ce laboratoire [19].

Remerciements—L'un de nous (J.I.) remercie le Conseil National de Recherches du Canada pour une subvention de recherches grace à laquelle il a pu octroyer une bourse de recherche a J.R.C.

Département de Chimie
Université de Moncton
Moncton, New Brunswick
Canada

J. ISRAELI
J. R. CAYOUILLE

18. K. B. Yatsimirskii, *Z. neorg. Khim.* **1**, 2451 (1956).

19. J. Israeli et J. R. Cayouille, *Can. J. Chem.* Sous presse.