Arch. Pharm. (Weinheim) 320, 749–755 (1987)

Stickstoffhaltige Derivate der Tetronsäure

Karl-Bernd Walter und Hans-Hartwig Otto*

Pharmazeutisches Institut, LS Pharmazeutische Chemie, Universität Freiburg, Hermann-Herder-Str. 9, D-7800 Freiburg

Eingegangen am 20. November 1986

Aus Tetronsäure (TA) werden die Hydrazide 1–4 und 10 und daraus zahlreiche Folgeprodukte (9, 11–17) dargestellt und charakterisiert.

Nitrogen-Containing Derivatives of Tetric Acid

The hydrazides 1–4 and 10 are obtained from tetric acid, and transformed into the derivatives 9 and 11–17.

Tetronsäure (TA), das γ -Lacton der 4-Hydroxyacetessigsäure, kann als das cyclische Analogon des Acetessigesters (AEE) aufgefaßt werden. TA wurde 1896 durch *Wolff* und *Schwabe* aus Ethyl 2,4-dibromacetoacetat erstmals dargestellt¹⁾.

Heute wird TA aus Ethyl 4-chloracetoacetat technisch dargestellt²⁾. Sie ist eine starke Säure (pKs = 3.76³⁾), die sowohl in Wasser als auch in org. Lösungsmitteln löslich und deren α -Position elektrophilen Substitutionen gut zugänglich ist^{4, 5)}. Neben 5-Alkyl- und 5-Aryl-Derivaten⁶⁾ sind mehrere Umsetzungen unter Einbeziehung der C-4-Carbonylgruppe beschrieben^{4, 7, 8)}. 4-Amino-2(5H)-furanone, Tetronsäureamide, wurden von *Hiyama* u. Mit.⁹⁾ durch Ringschluß entspr. Vorstufen erhalten.

Hier wird über Reaktionen mit Hydrazinen – und Folgereaktionen – berichtet, die zeigen, daß TA im Gegensatz zu AEE mit diesen Reagentien in der Regel nur an C-4 und nicht mit der Estergruppe d. h. unter Öffnung des Lactonringes reagiert, was mit der auch bei anderen Reaktionen überraschenden Stabilität gegenüber alkalischen Reagentien in Einklang steht¹⁰⁾.

Setzt man TA in siedendem EtOH mit Phenylhydrazin¹⁾ bzw. 4-Nitrophenylhydrazin um, so erhält man in guten Ausbeuten die 2'-Aryl-Hydrazide 3 und 4. Mit Hydrazinhydrat ist auch das ebenfalls kristalline, nicht substituierte 1 zugänglich. Hingegen erhielten wir mit Methylhydrazin unter ähnlichen Bedingungen in Übereinstimmung mit *Gelin*¹¹⁾ ausschließlich das 1'-Methylhydrazid 7, dessen Struktur durch das mit 4-Dimethylaminobenzaldehyd erhältliche Kondensationsprodukt 9 bestätigt wird. Aus 1 erhält man analog 2. Umsetzungen mit arom. Aldehyden^{5, 8)} in Gegenwart von PTS geben aus 3 die Aryliden-phenylhydrazono-Derivate 5 und aus 4 die entspr. Nitro-Derivate 6. Die Darstellung von 5 bzw. 6 aus den Arylidenderivaten¹²⁾ 8 gelang nicht.

Bei der Darstellung von **1** tritt das Bistetronsäurehydrazid **10** bis zu 30 % als Nebenprodukt auf, das gezielt in guter Ausbeute entweder aus **1** und **TA** oder aus **2** **TA** und Hydrazinhydrat erhältlich ist, und aus dem mit 4-Dimethylaminobenzaldehyd je nach molarem Verhältnis die intensiv farbigen Verbindungen **11** und/oder **12** erhalten werden.

Wolfbeis und *Junek*¹³⁾ beschreiben die Reaktion von **TA** mit Anilin und o-Ameisensäureester zu **13**. Das Analoge **14** konnten wir aus **TA** und Methoxy-bis(dimethylamino)methan erhalten, während *Gelin*¹⁴⁾ etwa gleichzeitig die Darstellung aus **TA** und Dimethylformamid-diethylacetal beschreibt. Das Butylthio-Derivat **17** entsteht als E/Z Gemisch (45:55) sowohl aus **14** als auch aus dem durch Reaktion von **TA** mit o-Ameisensäureester erhältlichen **16**. Von den weiteren Reaktionsmöglichkeiten von **14** erscheint uns besonders die mit Guanidincarbonat in 60–70 proz. Ausbeute verlaufende

Synthese des u. W. noch nicht beschriebenen 2-Aminofuro[3,4-d]pyrimidin-5-ons (**15**) interessant. Die Struktur dieser als Hydrat kristallisierenden Verbindung ist durch Analyse und spektrale Daten gesichert.

Wir danken dem Fonds der Chemischen Industrie, Frankfurt, für die Unterstützung unserer Arbeiten und der LONZA AG, Basel, für freundlicherweise zur Verfügung gestellte Tetronsäure.

Experimenteller Teil

Schmp.: (unkorr.): Kofler-Heiztischmikroskop, Reichert AG, Wien. – *IR-Spektren* (KBr): Perkin-Elmer IR 1310, Beckman IR 4240. – *NMR-Spektren*: Varian T60, Bruker WP80 und WM250; δ -Werte aus 60 MHz Spektren, falls nicht anders angegeben; TMS inn. Standard; Meßtemp. etwa 37°; Lösungsmittel CDCl_3 , falls nicht anders angegeben. – *UV/VIS-Spektren*: Beckmann 25. – *Elementaranalysen*: Pharmazeutisches Institut der Universität Freiburg.

4-Hydrazido-2(5H)-furanon (**1**)

Zu einer auf 60° erwärmten Lösung von 0.3 g (6 mmol) Hydrazinhydrat in 5 ml EtOH werden während 90 min 0.5 g (5 mmol) TA in 25 ml EtOH getropft. Dabei wird die Temp. schrittweise auf ca. 30° reduziert. Nach etwa 2.5 h ist die Lösung vollständig zugetropft, man rührt noch 1 h weiter. Nach 12 h im Kühlschrank wird der Niederschlag abgetrennt und das Lösungsmittel i. Vak. entfernt. Der Rückstand

wird zusammen mit dem Niederschlag aus EtOH umkristallisiert. Ausb. 0.32 g (56 %), farblose Kristalle, Schmp. 148–150°. – IR: 3330, 3240 (NH), 1710 (C=O), 1650 cm^{-1} (C=C). – $^1\text{H-NMR}$ ($[\text{D}_6]$ -DMSO): δ (ppm) = 4.58 (s, 1H, CH), 4.66 (s, 2H, OCH_2), 8.48 (s, 3H, NH). – $\text{C}_9\text{H}_9\text{N}_2\text{O}_2$ (174.1) Ber. C 42.1 H 5.29 N 24.5 Gef. C 42.3 H 5.35 N 24.3.

4-[2-(4-Nitrobenzyliden)hydrazido]-2(5H)-furanon (2)

0.11 g (1 mmol) **1** werden in 20 ml EtOH und 0.5 ml ethanol. HCl gelöst und mit 0.17 g (1.1 mmol) 4-Nitrobenzaldehyd versetzt. Es wird 2 h bei Raumtemp. gerührt, dann wird der Niederschlag abgetrennt. Ausb. 0.15 g (60 %), gelbe Kristalle, Schmp. 242–244° (EtOH/Nitromethan). – IR: 3240 (NH), 1715 (C=O), 1510, 1340 cm^{-1} (NO_2). – $^1\text{H-NMR}$ ($[\text{D}_6]$ -Aceton): δ (ppm) = 5.02 (s, 2H, OCH_2), 5.07 (s, 1H, CH), 7.8–8.5 (m, 5H, arom. + olef.), 11.92 (s, 1H, NH). – $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_4$ (247.2) Ber. C 53.4 H 3.66 N 17.0 Gef. 53.7 H 3.85 N 16.8.

4-(4-Nitrophenylhydrazido)-2(5H)-furanon (4)

Zu 0.76 g (5 mmol) 4-Nitrophenylhydrazin in 20 ml schwach siedendem EtOH werden 0.5 g (5 mmol) **TA** in 15 ml Wasser getropft. Es wird 2 h unter Rückfluß erwärmt, nach dem Abkühlen 12 h im Kühlschrank belassen und der gebildete Niederschlag abgetrennt. Ausb. 0.96 g (82 %), orange Kristalle, Schmp. 219–220° (EtOH). – IR: 3260 (NH), 1685 (C=O), 1500, 1345 cm^{-1} (NO_2). – $^1\text{H-NMR}$ ($[\text{D}_6]$ -Aceton/ $[\text{D}_6]$ -DMSO 1:1): δ (ppm) = 4.62 (s, 1H, CH), 4.80 (s, 2H, OCH_2), 6.7–8.2 (m, 4H, arom.), 9.18 (s, 1H, NH), 9.47 (s, 1H, NH). – $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_4$ (235.2) Ber. C 51.1 H 3.85 N 17.9 Gef. C 51.3 H 3.99 N 17.7.

3-(4-Dimethylaminobenzyliden)-4-phenylhydrazonotetrahydro-2-furanon (5a)

0.57 g (3 mmol) **3** werden mit 0.51 g (3.5 mmol) 4-Dimethylaminobenzaldehyd und einer Spatelspitze PTS in 40 ml EtOH 5 h bei 60° gerührt. Der gebildete Niederschlag wird abfiltriert, das Filtrat weitere 5 h bei gleicher Temp. gerührt. Die vereinigten Niederschläge werden umkristallisiert. Ausb. 0.58 g (60 %), dunkelrote Kristalle, Schmp. 230–231° (CHCl₃/Petrolether). – IR: 3280 (NH), 1725 cm⁻¹ (C=O). – ¹H-NMR ([D₆]-Aceton/[D₆]-DMSO 1:1): δ (ppm) = 3.13 (s, 6H, N(CH₃)₂), 5.00 (s, 2H, OCH₂), 6.6–8.6 (m, 10 H, arom. + olef.), 9.13 (s, 1H, NH). – C₁₉H₁₉N₃O₂ (321.4) Ber. C 71.0 H 5.95 N 13.1 Gef. C 70.9 H 5.85 N 13.3.

3-(2,4-Dimethoxybenzyliden)-4-phenylhydrazonotetrahydro-2-furanon (5b)

Wie **5a** aus 0.19 g (1 mmol) **3** und 0.16 g (2 mmol) 2,4-Dimethoxybenzaldehyd. Ausb. 0.12 g (35 %), orangerote Kristalle, Schmp. 185–186° (EtOH). – IR: 3310 (NH), 1735 cm⁻¹ (C=O). – ¹H-NMR ([D₆]-Aceton/CDCl₃ 1:1): δ (ppm) = 3.96 (s, 6H, OCH₃), 5.02 (s, 2H, OCH₂), 8.83 (s, 1H, NH), 6.5–9.5 (m, 9H, arom. + olef.). – C₁₉H₁₈N₂O₄ (338.3) Ber. C 67.4 H 5.36 N 8.3 Gef. C 67.7 H 5.56 N 8.0.

3-(4-Chlorbenzyliden)-4-phenylhydrazonotetrahydro-2-furanon (5c)

Wie **5a** aus 0.29 g (1.5 mmol) **3** und 0.28 g (2 mmol) 4-Chlorbenzaldehyd bei 40°. Nach Abkühlen wird das Lösungsmittel i. Vak. entfernt und der Rückstand aus Benzol umkristallisiert. Ausb. 0.1 g (19 %), rote Kristalle, Schmp. 189–191°. – IR: 3280 (NH), 1730 cm⁻¹ (C=O). – ¹H-NMR: δ (ppm) = 4.80 (s, 2H, OCH₂), 6.6–7.5 (m, 10 H, arom. + olef.), 8.33 (s, 1H, NH). – C₁₇H₁₃ClN₂O₂ (312.7) Ber. C 65.3 H 4.18 Cl 11.3 N 9.0 Gef. C 65.1 H 4.27 Cl 11.2 N 9.0.

3-(4-Nitrobenzyliden)-4-phenylhydrazonotetrahydro-2-furanon (5d)

Wie **5a** aus 0.57 g **3** und 0.53 g (3.5 mmol) 4-Nitrobenzaldehyd in 50 ml EtOH, 15 h unter Rückfluß erhitzen. Ausb. 0.05 g (5 %), dunkelrote Kristalle, Schmp. 212–213° (CHCl₃/Petrolether). – IR: 3310 (NH), 1740 (C=O), 1540, 1340 cm⁻¹ (NO₂). – C₁₇H₁₃N₃O₄ (323.3) Ber. C 63.2 H 4.05 N 13.0 Gef. C 62.9 H 4.18 N 12.8.

3-(4-Dimethylaminobenzyliden)-4-(4-nitrophenylhydrazono)tetrahydro-2-furanon (6a)

0.4 g (1.7 mmol) **4**, 0.3 g (2 mmol) 4-Dimethylaminobenzaldehyd und eine Spatelspitze PTS werden in 50 ml EtOH 15 h unter Rückfluß erhitzt. Nach 12 h im Kühlschrank wird der Niederschlag abgetrennt. Ausb. 0.38 g (61 %), dunkelrote Kristalle, Schmp. 267–268° (EtOH/THF 5:1). – IR: 3400, 3250 (NH), 1720 (C=O), 1520, 1320 cm⁻¹ (NO₂). – ¹H-NMR. ([D₆]-Aceton/[D₆]-DMSO 1:1): δ (ppm) = 3.14 (s, 6H, N(CH₃)₂), 5.16 (s, 2H, OCH₂), 6.8–8.8 (m, 9H, arom. + olef.), 10.46 (s, 1H, NH). – C₁₉H₁₈N₄O₄ (366.4) Ber. C 62.3 H 4.95 N 15.3 Gef. C 62.1 H 4.93 N 15.0.

3-(4-Chlorbenzyliden)-4-(4-nitrophenylhydrazono)tetrahydro-2-furanon (6b)

Wie **6a** aus 0.7 g (3 mmol) **4** und 0.56 g (4 mmol) 4-Chlorbenzaldehyd, 20 h Rückfluß. Der nach Abkühlen ausgefallene Niederschlag wird abgetrennt, das Filtrat i. Vak. eingeengt, die vereinigten Niederschläge werden zunächst aus EtOH, dann aus Nitromethan umkristallisiert. Ausb. 0.27 g (25 %), dunkelrote Kristalle, Schmp. 233–235°. – IR: 3310 (NH), 1745 (C=O), 1505, 1320 cm⁻¹ (NO₂). – ¹H-NMR ([D₆]-DMSO): δ (ppm) = 5.15 (s, 2H, OCH₂), 7.2–8.7 (m, 9H, arom. + olef.), 10.65 (s, 1H, NH). – C₁₇H₁₂ClN₃O₄ (357.8) Ber. C 57.1 H 3.38 Cl 9.9 N 11.7 Gef. C 57.2 H 3.58 Cl 9.7 N 11.8.

4-(1-Methylhydrazido)-2(5H)-furanon (7)

Zu einer 40° warmen Lösung von 0.16 g (3.5 mmol) Methylhydrazin in 5 ml EtOH werden 0.3 g (3 mmol) **TA** in 20 ml EtOH langsam getropft. Nach 1 h Rühren bei Raumtemp. und Entfernen des Lösungsmittels i. Vak. wird der Rückstand durch wenig EtOH/Ether zur Kristallisation gebracht und aus Dioxan/Petrolether umkristallisiert. Ausb. 0.18 g (47 %), farblose Kristalle, Schmp. 134–138° (Lit.¹¹) 147°. – IR: 3300, 3200 (NH), 1720 (C=O), 1650 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR ([D₆]-Aceton): δ (ppm) = 3.15 (s, 3H, NCH₃), 4.48 (s, 1H, CH), 4.67 (s, 2H, NH₂), 4.78 (s, 2H, OCH₂). – C₅H₈N₂O₂ (128.1) Ber. C 46.9 H 6.29 N 21.9 Gef. C 47.1 H 6.35 N 21.7.

4-[2-(4-Dimethylaminobenzyliden)-1-methylhydrazido]-2(5)-furanon (9)

Wie **2** aus 0.13 g (1 mmol) **7** und 0.16 g (1.1 mmol) 4-Dimethylaminobenzaldehyd bei ca. 40° in 1 h. Der Niederschlag wird mit NaHCO₃-Lsg., Wasser und EtOH gewaschen. Ausb. 0.18 g (69 %), hellrosa Kristalle, Schmp. 235–237°. – IR: 1725 (C=O), 1635 (C=N), 1605 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR: δ (ppm) = 3.02 (s, 6H, N(CH₃)₂), 3.30 (s, 3H, NCH₃), 4.86 (s, 1H, CH), 5.10 (s, 2H, OCH₂), 6.5–7.7 (m, 5H, arom. + olef.). – C₁₄H₁₇N₃O₂ (259.3) Ber. C 64.8 H 6.60 N 16.2 Gef. C 64.6 H 6.52 N 16.4.

1,2-Bis(5-oxo-2H-3-furyl)hydrazin (10)

0.5 g (10 mmol) Hydrazinhydrat in 10 ml EtOH werden zu einer auf 50° erwärmten Lösung von 2 g (20 mmol) **TA** in 20 ml EtOH getropft und bei 50° 2 h gerührt. Dabei bildet sich ein Niederschlag; zur vollständigen Ausfällung wird über Nacht im Kühlschrank belassen. Dann filtriert man das Reaktionsprodukt ab und bringt das Filtrat i. Vak. zur Trockene. Der Rückstand besteht im wesentlichen aus nicht umgesetzter **TA**, die erneut mit Hydrazinhydrat umgesetzt wird. Ausb. 1.63 g (83 %), farblose Kristalle, Schmp. 236–237°. – IR: 3430–3050 (NH), 1715 (C=O), 1615 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR ([D₆]-DMSO): δ (ppm) = 4.78 (s, 4H, OCH₂), 4.79 (s, 2H, CH), 9.58 (s, 2H, NH). – C₈H₈N₂O₄ (196.2) Ber. C 49.0 H 4.10 N 14.3 Gef. C 49.2 H 4.29 N 14.1.

4-[2-(4-Dimethylaminobenzyliden)-5-oxotetrahydro-3-furyliden]hydrazido]-2(5H)-furanon (11)

Zu einer siedenden Lösung von 0.19 g (1 mmol) **10** und einer Spatelspitze PTS in 3 ml DMF werden 0.15 g (1 mmol) 4-Dimethylaminobenzaldehyd in 10 ml EtOH getropft. Nach Abkühlen auf Raumtemp. wird der Niederschlag abgetrennt. Ausb. 0.21 g (64 %), rote Kristalle, Schmp. 257–258° (DMSO). – IR: 1725, 1690 cm⁻¹ (C=O). – UV (DMF): λ_{max} = 276, 499 nm. – ¹H-NMR ([D₆]-DMSO): δ (ppm) = 3.25 (s, 6H, N(CH₃)₂), 4.6 (bs, 2H, OCH₂ [C-2']), 5.36 (s, 2H, OCH₂ [C-5]), 6.00 (s, 1H, CH), 6.8–8.8 (m, 5H, arom. + olef.). – C₁₇H₁₇N₃O₄ (327.3) Ber. C 62.4 H 5.23 N 12.8 Gef. C 62.3 H 5.19 N 12.9.

3,3'-Azino-bis[4-(4-dimethylaminobenzyliden)tetrahydro-5-furanon] (12)

0.19 g (1 mmol) **10** werden mit 0.3 g (2 mmol) 4-Dimethylaminobenzaldehyd und einer Spatelspitze PTS in 10 ml DMF auf 60° erwärmt. Der nach 2–3 h abgeschiedene Niederschlag wird nach Abkühlen abgetrennt und mit DMF ausgekocht. Ausb. 0.08 g (33 %), grünlich-purpur schimmernde Kristalle, Schmp. > 350° (Zers.). – IR: 1745 cm⁻¹ (C=O). – UV (DMF): λ_{max} = 278; 585 nm. – C₂₆H₂₆N₄O₄ (458.5) Ber. C 68.1 H 5.71 N 12.2 Gef. C 67.8 H 5.68 N 12.1.

3-Dimethylaminomethylen-tetrahydro-2,4-furandion (14)¹⁴

0.25 g (2.5 mmol) **TA** werden mit 0.4 g (3 mmol) Methoxy-bis(dimethylamino)methan 30 min auf 50–60° erwärmt. Nach Abkühlen wird der gebildete Niederschlag abgetrennt und mit kaltem Ether gewaschen. Ausb. 0.31 g (80 %), orange Kristalle, Schmp. 147–148° (EtOH/Hexan). – IR: 1740, 1655 (C=O), 1615 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR: δ (ppm) = 3.40 (s, 3H, NCH₃), 3.82 (s, 3H, NCH₃), 4.45 (s, 2H, OCH₂), 7.48 (s, 1H, CH). – C₇H₉NO₃ (155.1) Ber. C 54.2 H 5.85 N 9.0 Gef. C 54.1 H 5.95 N 9.1.

2-Aminofuro[3,4-d]pyridin-5(7H)-on-dihydrat (15)

0.25 g (1.5 mmol) Ba(OH)₂, 0.27 g (1.5 mmol) Guanidincarbonat und 0.23 g (1.5 mmol) **14** werden in 20 ml 60proz. wäßrigem EtOH 15 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wird BaCO₃ abgetrennt, das Filtrat i. Vak. eingeengt und der Rückstand aus Pyridin/Essigester umkristallisiert. Ausb. 0.17 g (61 %), farblose Kristalle, Schmp. 78–80°, Entweichen des Kristallwassers, und 113–115°. – IR: 3430–3200 (NH), 1745 (C=O), 1675 (C=N), 1610 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR ([D₅]-Pyridin, 80 MHz): δ (ppm) = 4.41 (s, 2H, OCH₂), 8.44 (bs, 6H, NH₂ + 2 Wasser), 9.97 (s, 1H, CH). – C₆H₅N₃O₂ · 2 H₂O (187.2) Ber. C 38.5 H 4.84 N 22.5 Gef. C 38.2 H 4.99 N 22.5. – Die thermogravimetrische Untersuchung zeigt, daß **15** bei 84–85° 7.5 % Gewicht verliert.

(E/Z)-3-Ethoxymethylen-tetrahydro-2,4-furandion (16)

0.5 g (5 mmol) **TA** werden unter Argon mit 3.7 g (25 mmol) Orthoameisensäureethylester 2 h zum gelinden Sieden erhitzt. Nach Abkühlen und 24 h im Kühlschrank wird der Niederschlag unter Argon abgetrennt und aus CCl₄ umkristallisiert. Ausb. 0.47 g (60 %), orangefelbe Kristalle, Schmp. 89–92°. – IR: 1755, 1700 (C=O), 1610 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR (80 MHz): δ (ppm) = 1.53 (t, 3H, CH₃), 4.35–4.72 (q, 2H, CH₂), 4.51, 4.55 (2s, 2H, OCH₂), 7.74, 7.94 (2s, H, CH). – C₇H₈O₄ (156.1) Ber. C 53.8 H 5.16 Gef. C 53.6 H 5.21. – Das Isomerenverhältnis E/Z beträgt 42:58.

(E/Z)-3-Butylthiomethylen-tetrahydro-2,4-furandion (17)

A: 0.31 g (2 mmol) **16** werden in THF unter N₂ mit 0.19 g (2.1 mmol) Butanthiol und einigen Kristallen PTS 12 h auf 50–60° erwärmt. Nach Abkühlen auf Raumtemp. wird das Lösungsmittel i. Vak. entfernt und der Rückstand durch wenig Ether zur Kristallisation gebracht. Ausb. 0.21 g (53 %).

B: wie vorstehend, jedoch aus **14** und äquimol. Mengen Buthanthiol und PTS durch 20 h Erwärmen unter Rückfluß.

Schmp. 57–60° (Ether). – IR: 1760, 1700 (C=O), 1555 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR: δ (ppm) = 0.95 (t, 3H, CH₃), 1.15–2.0 (m, 4H, (CH₂)₂), 3.10 (t, 2H, SCH₂), 4.55, 4.60 (2s, 2H, OCH₂), 8.55, 8.65 (2s, H, CHS). – C₉H₁₂O₃S (200.2) Ber. C 54.0 H 6.03 S 16.0 Gef. C 54.1 H 6.03 S 16.1. – Das Isomerenverhältnis E/Z beträgt 45:55. – *Z-Isomer*, durch fraktionierende Kristallisation aus Ether, Schmp. 72–73°, – IR: 1740, 1690 (C=O), 1550 cm⁻¹ (C=C). – ¹H-NMR (80 MHz): δ (ppm) = 0.95 (t, 3H, CH₃), 1.15–2.0 (m, 4H, (CH₂)₂), 3.10 (t, 2H, SCH₂), 4.55 (s, 2H, OCH₂), 8.55 (s, H, CHS).

Literatur

- 1 L. Wolff und C. Schwabe, Liebigs Ann. Chem. 291, 231 (1896).
- 2 K. J. Boosen, Swiss Pat. 529128 (1972), R. Miller und L. Tenud, Swiss Pat. Appl. 3982/81, 3983/81 (1981), 604/84 (1984).
- 3 W. D. Kumler, J. Am. Chem. Soc. 60, 859 (1938).
- 4 S. Gelin, P. Pollet, J. Heterocycl. Chem. 12, 787 (1975).
- 5 D. G. Schmidt und H. Zimmer, ibid. 20, 787 (1983).
- 6 L. R. Krepski, L. E. Lynch, S. M. Heilmann und J. K. Rasmussen, Tetrahedron Lett. 26, 981 (1985).
- 7 E. A. Fehnel, J. A. Deyrup und M. B. Davidson, J. Org. Chem. 23, 1996 (1958).
- 8 D. G. Schmidt, P. D. Seemuth und H. Zimmer, ibid. 48, 1914 (1983).
- 9 T. Hiyama, H. Oishi und H. Saimoto, Tetrahedron Lett. 26, 2459 (1985).
- 10 K.-B. Walter, Dissertation Freiburg 1984.
- 11 S. Gelin und P. Pollet, J. Heterocycl. Chem. 16, 505 (1979).
- 12 H. Zimmer, W. W. Hillstrom, J. C. Schmidt, P. D. Seemuth und R. Voegeli, J. Org. Chem. 43, 1541 (1978).
- 13 O. S. Wolfbeis und H. Junek, Z. Naturforsch. 34b, 283 (1979).
- 14 S. Gelin und B. Chantegrel, J. Heterocycl. Chem. 18, 663 (1981).