203. Die Produkte der Thermolyse von *N*-(1-Pyridinio)-2-nitroaniliden sind keine Triaziridine, sondern 1,2-Bis[(2'-nitrophenyl)-azoxy]-benzole

von Hans Hilpert, Lienhard Hoesch¹⁾ und André S. Dreiding

Organisch-Chemisches Institut der Universität Zürich-Irchel, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich

(9.VII.81)

The Products of Thermolysis of *N*-(1-Pyridinio)-2-nitroanilides are not Triaziridines, but 1,2-Bis[(2'-nitrophenyl)azoxy]benzenes

Summary

The products of the thermolysis of *N*-(1-pyridinio)-2-nitroanilides (**1**) had previously been interpreted as tris(2-nitrophenyl)-triaziridines (**3**). The present work shows them to be actually 1,2-bis[(*Z*)-(2'-nitrophenyl)-ONN-azoxy]benzenes (**5**). The revised structural assignment is based on the chemical and the spectroscopic (especially ¹H-NMR.) properties of **5** and on the results of a X-ray structural analysis.

1. Einleitung. – Aus der Thermolyse der *N*-(1-Pyridinio)-2-nitroanilide **1** unter energischen Bedingungen (2 Std. Schmelze bei 140–150°) isolierte eine japanische Arbeitsgruppe [1], neben Pyridin, Produkte, die nach elementarer Zusammensetzung und Molekulargewicht formell Trimere **I** der entsprechenden 2-Nitrophenyl-nitrene **2** sind (*Schema 1*). Die japanischen Autoren haben diesen Produkten die Konstitution von Tris(2-nitrophenyl)-triaziridinen **3** zugeschrieben, und zwar auf der Basis von spektroskopischen Befunden sowie einigen Reduktionsexperimenten [1] [2]: Katalytische Hydrierung von **Ia** unter Ausbildung von 81% *o*-Phenylendiamin zeigte die Gegenwart von drei Benzolringen mit je zwei *ortho*-ständigen *N*-haltigen Funktionen [1]. Aus den IR.-Banden bei 1520 und 1350 cm⁻¹ und einigen MS.-Piken (*M*–O, *M*–NO und *M*–NO₂) [1], sowie aus einer (allerdings nur) 40proz. Ausbeute an *o*-Nitroanilin bei der Reduktion von **Ia** mit *O,O*-Diäthyl-dithiophosphorsäure [2] glaubten die Autoren schliessen zu können, dass jeweils eine dieser zwei *N*-haltigen Funktionen eine Nitrogruppe sei. Das (vermeintlich) beobachtete (1:3)-Verhältnis von zwei Multipletten für aromatische Protonen bei 8,1 und 7,6 ppm im ¹H-NMR.-Spektrum von **Ia** erschien [1] als Bestätigung der konstitutionellen Äquivalenz der drei Benzolringe mit jeweils einem H-Atom *ortho* zur Nitrogruppe und mit drei weiteren H-Atomen an jedem

¹⁾ Gegenwärtige Adresse: Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich, Zollikerstr. 107, 8008 Zürich.

2. Strukturzuordnung von 5. - Das $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum von **1a** in CDCl_3 weist bei 90 MHz zwei deutlich strukturierte Multiplette bei 8,3–8,0 und 7,9–7,3 ppm in einem von den bisherigen Angaben [1] abweichenden Intensitätsverhältnis von 1:2 auf. Bei 360 MHz ergeben sich in CDCl_3 und in $\text{D}_6\text{-DMSO}$ nach erster Ordnung interpretierbare $^1\text{H-NMR}$ -Spektren (s. *Tabelle*). Diese zeigen für **1a**, dass einer der drei Benzolringe symmetrisch *ortho*-disubstituiert ist ($AA'MM'$ -System für Ring A in **6**, $\text{R}=\text{H}$) und dass die beiden anderen Benzolringe unsymmetrisch *ortho*-disubstituiert und untereinander homotop sind (zwei identische $ABCD$ -Systeme für die Ringe B und C in **6**, $\text{R}=\text{H}$). Aufgrund der in *Kap. 1* zusammengefassten früheren Befunde [1] [2] sind in **1** mindestens zwei Nitrogruppen vorhanden. Wir setzen daher $\text{Y}=\text{NO}_2$ in **6**. Die nach der Summenformel $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{O}_6$ von **1a** noch verbleibenden vier N- und zwei O-Atome sind je zur Hälfte in X zu lokalisieren. Die beiden X müssen also identische zweibindige Funktionen N_2O sein, welche den Ring B und den Ring C mit Ring A verknüpfen. Damit resultiert für **1a** die Formel **6a** (*Schema 3*, $\text{R}=\text{H}$). Auch das $^{13}\text{C-NMR}$ -Spektrum von **1a** (s. *exper. Teil*) und das $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum von **1b** in C_6D_6 (s. *Tabelle*) sind im Einklang mit den Symmetrieeigenschaften von **6a** bzw. **6b**.

Von den möglichen Substrukturen kommt für $\text{X}=\text{N}_2\text{O}$ wegen der Stabilität von **1** praktisch nur die Azoxygruppe in Frage. Die bekannten Daten lassen aber keinen Schluss auf die Lage des O-Atoms und auf die Konfiguration an den N,N-Doppelbindungen zu, ausser dass beide Aspekte in beiden Gruppen X dieselben sein müssen. Eine *Röntgen*-Strukturanalyse [5] zeigt, dass **1a** die 1,2-Bis[(*Z*)-(2'-nitrophenyl)-*ONN*-azoxy]-benzol-Struktur **5a** besitzt. Für **1b** und **1c** dürften entsprechend die Strukturen **5b** und **5c** gelten.

3. Hypothese über die Umwandlung 1→5. - Für die Bildung von **5** aus **1** stellen wir die in *Schema 4* gezeigte Reaktionsfolge zur Diskussion. Sie basiert auf der Annahme, dass intermediär kein 2-Nitrophenyl-nitren (**2**, $\text{R}=\text{H}$) auftritt, da dieses sich bekanntlich [6] intramolekular zum thermisch stabilen Benzofuroxan (**7**) cyclisiert²⁾. Die zwei zur Bildung von **5** erforderlichen N,N-Verknüpfungen dürften

Schema 3

²⁾ Benzofuroxan (**7**) war unter den Produkten der Thermolyse von **1a** nicht zu finden; auch soll bei der Thermolyse von **7** das Produkt **5a** nicht gebildet werden [1].

Tabelle. 360-MHz-¹H-NMR-Signale von 1,2-Bis[(Z)-2-nitrophenyl]-ONN-azoxy-benzol (5a) und 1,2-Bis[(Z)-4-methyl-2-nitrophenyl]-ONN-azoxy-4-methylbenzol (5b)^{a)}

Verbindung	Lösungsmittel	H-C(3)	H-C(4)	H-C(3')	H-C(4')	H-C(5')	H-C(6')
		H-C(6)	H-C(5)	H-C(3'')	H-C(4'')	H-C(5'')	H-C(6'')
5a (= Ia)	CDCl ₃	8,15 ^{b)}	7,76 ^{b)}	8,15 (d × d)	7,48 (d × d × d)	7,69 (d × d × d)	7,43 (d × d)
				(8, 1,5)	(8, 8, 1,5)	(8, 8, 1,5)	(8, 1,5)
5a (= Ia)	D ₆ -DMSO	8,15 ^{b)}	7,99 ^{b)}	8,20 (d × d)	7,88 (d × d × d)	7,66 (d × d × d)	7,46 (d × d)
				(8, 1,5)	(8, 8, 1,5)	(8, 8, 1,5)	(8, 1,5)
5b (= Ib)	D ₆ D ₆	7,73 (d)	1,64 (s) ^{c)}	7,41 (d)	1,66 (s) ^{d)}	6,65 (d × d) ^{e)}	7,36 (d) ^{f)}
		(1,5)		(1,5)		(8, 1,5)	(8)
		7,81 (d)	6,47 (d × d)	7,41 (d)	1,66 (s) ^{d)}	6,63 (d × d) ^{e)}	7,33 (d) ^{f)}
		(8)	(8, 1,5)	(1,5)		(8, 1,5)	(8)

^{a)} Die chemischen Verschiebungen (δ, TMS_{int.} = 0 ppm) und die Kopplungskonstanten in Klammern (Hz) wurden z.T. durch Entkopplungen ermittelt (s. exper. Teil). ^{b)} AA' bzw. MM'-Teil eines AA'MM'-Systems ($J_{AM} = J_{A'M'} = 8$ Hz; $J_{AM'} = J_{A'M} = 1,5$ Hz). ^{c)} CH₃-C(4). ^{d)} CH₃-C(4') und CH₃-C(4''). ^{e)} Zuordnung zu H-C(5') bzw. H-C(5'') oder umgekehrt. ^{f)} Zuordnung zu H-C(6') bzw. H-C(6'') oder umgekehrt.

Schema 4

eher durch nukleophile Angriffe des formal negativ geladenen Imid-N-Atoms von **1** (vgl. [7]) an zwei positiv polarisierte N-Zentren zustandekommen, zunächst an dasjenige einer Nitro- (in **1**) und dann einer Nitrosogruppe (in **9**). Die Übertragung eines O-Atoms von N(1) zu N(2)³ und die Ausbildung der beiden Azoxyfunktionen wird durch die Abspaltung von insgesamt drei Molekeln Pyridin ($1 + 1 \rightarrow 8$, $8 \rightarrow 9$, $10 \rightarrow 5$) gefördert.

Dieses mechanistische Konzept ist im Einklang mit dem Befund, dass das *m*- bzw. das *p*-Isomere von **1** (d. h. *N*-(1-Pyridinio)-3- bzw. -4-nitroanilid) bei der Thermolyse ausser Pyridin nur *m*- bzw. *p*-Nitroanilin liefert [1]. Die vereinfachten Formulierungen in *Schema 4* sollen lediglich die Umbindungen plausibel machen, nicht aber deren Reihenfolge oder Schlüsse über Zwischenprodukte implizieren.

Diese Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt. Wir danken der Firma Sandoz AG, Basel, für grosszügige Forschungsbeiträge.

Experimenteller Teil

1. Allgemeines. – Siehe [8].

2. Thermolyse der *N*-(1-Pyridinio)-2-nitroanilide **1.** – 2.2. *1,2-Bis[(Z)-(2'-nitrophenyl)-ONN-azoxy]-benzol (5a)*. Eine Probe von 108 mg (0,50 mmol) **1a**, bereitet nach [9], wurde unter Rückfluss zum Schmelzen erhitzt und 2 Std. unter Rühren auf 145–150° gehalten. Durch Filtration einer Suspension des schwarzen Reaktionsgemisches in CHCl₃/Hexan 1:1 über wenig Kieselgel und anschliessende Chromatographie auf einer Lobar-A Säule (Merck) in CHCl₃/Hexan 2:1 wurden nach Eindampfen der Hauptfraktion und Versetzen mit Äther 33 mg (48%) **5a** als beige Schuppen, Smp. 125–130° erhalten; analytische DC. (Kieselgel, Pentan/Äther 1:1): R_f 0,30. Aus der Ätherlösung resultierte nach Eindampfen 6 mg (9%) 2-Nitroanilin, Smp. 70–72,5° ([10]: 71,5°). Zur Analyse wurde das rohe **5a** 2mal aus

³) Thermisch hervorgerufene intramolekulare Wanderungen eines O-Atoms von einem N-Atom auf ein anderes sind unseres Wissens noch nicht beobachtet worden.

C₂H₅OH umkristallisiert: 18 mg (26%) **5a**, beige Schuppen, Smp. 131,9-132,7° ([1]: 132-133°). - UV. und IR. identisch mit den Angaben in [1]. Gelegentlich kristallisierte aus C₅H₅OH eine zweite kristalline Modifikation von **5a**, Smp. 145,5-146,5°. Die beiden Modifikationen unterscheiden sich im Fingerprintbereich der IR.-Spektren in fester Phase, jedoch nicht in ihren ¹H-NMR.-Spektren. Kristallisation der ersten Modifikation aus C₅H₅OH nach Animpfen mit der zweiten Modifikation ergab Smp. 146°. - ¹H-NMR. (360 MHz, CDCl₃): für die Signale siehe *Tabelle*. - Einstrahlen bei 8,15 (H-C(3), H-C(6), H-C(3') und H-C(3'')) ergab: 7,76 (s, H-C(4) und H-C(5)); 7,48 (*d* × *d*, *J* = 8 und 1,5, H-C(4') und H-C(4'')). - Einstrahlen bei 7,76 (H-C(4) und H-C(5)) ergab: 8,15 (s, (H-C(3) und H-C(6)); 8,15 (*d* × *d*, *J* = 8 und 1,5, H-C(3') und H-C(3'')). - Einstrahlen bei 7,69 (H-C(5') und H-C(5'')) ergab: 7,48 (*d* × *d*, *J* = 8 und 1,5, H-C(4') und H-C(4'')); 7,43 (*d*, *J* = 1,5, H-C(6') und H-C(6'')). - ¹³C-NMR. (25,2 MHz, CDCl₃): 142,7 (s), 141,8 (s), 138,1 (s) im Intensitätsverhältnis von ca. 1:1:1 (C(1), C(2), C(1'), C(1''), C(2') und C(2'')); 134,3 (*d*), 132,2 (*d*), 128,6 (*d*), 125,7 (*d*), 125,0 (*d*), 124,3 (*d*) im Verhältnis von ca. 1:1:1:1:1 (C(3), C(4), C(5), C(6), C(3'), C(3''), C(4'), C(4''), C(5') und C(5'')). - ¹H-NMR. (360 MHz, D₆-DMSO): für die Signale siehe *Tabelle*. - MS.: 392/3 (*M*-O); 378/0,5 (*M*-NO); 362/14 (*M*-NO₂); 272/20; 270/36; 257/33; 256/99; 241/22; 240/31; 196/18; 182/15; 179/14; 168/15; 167/14; 166/58; 150/70; 140/12; 139/15; 136/12; 122/20; 106/78; 94/25; 93/20; 92/61; 90/13; 78/74; 77/27; 76/38; 65/15; 64/67; 63/39; 53/24; 52/27; 51/100; 50/34.

2.2. 1,2-Bis[(Z)-(4'-methyl-2'-nitrophenyl)-ONN-azoxy]-4-methylbenzol (**5b**). Wie in 2.1 wurden 229 mg (1,0 mmol) **1b** [9] geschmolzen und 2 Std. auf 145-150° erhitzt. Das Gemisch wurde chromatographisch in Pentan/Äther 1:1 aufgetrennt. Aus einer farblosen Fraktion wurden nach Versetzen mit Äther 24 mg (16%) **5b** als beige Schuppen, Smp. 166-168°, erhalten; analytische DC. (Kieselgel Pentan/Äther 1:1): Rf 0,32. Umkristallisation aus C₂H₅OH ergab 21 mg (14%) **5b** in beigen Schuppen, Smp. 168-169,5° ([1]: 168-169°). - UV. (C₂H₅OH): 323/9100; 251/19000 (s.). - IR. (CHCl₃): 3020w br.; 2930w; 2860w br.; 1615m; 1570m; 1530s br.; 1480s br.; 1400m; 1350s; 1295m; 1140m; 820m. - ¹H-NMR. (360 MHz, C₆D₆): für die Signale siehe *Tabelle*. Einstrahlen bei 7,81 (H-C(6)) ergab: 6,47 (br. s, H-C(5)). - Einstrahlen bei 6,64 (H-C(5') und H-C(5'')) ergab: 7,41 (s, H-C(3') und H-C(3'')); 7,36 und 7,33 (2 s, H-C(6') und H-C(6'')). - Einstrahlen bei 1,65 (CH₃-C(4), CH₃-C(4') und CH₃-C(4'')) ergab: 7,73 (*d*, *J* = 1,5, H-C(3)); 7,41 (*d*, *J* = 1,5, H-C(3') und H-C(3'')); 6,65 und 6,63 (je *d* × *d*, je *J* = 8 und 1,5, H-C(5') und H-C(5'')); 6,47 (*d* × *d*, *J* = 8 und 1,5, H-C(5)). - MS.: 450/2 (*M*); 434/4 (*M*-O); 420/0,5 (*M*-NO); 404/17 (*M*-NO₂); 300/13; 298/14; 285/31; 284/75; 269/19; 268/37; 224/11; 210/12; 207/12; 195/13; 180/20; 164/48; 152/10; 120/67; 107/13; 105/16; 92/34; 91/19; 90/13; 89/25; 78/54; 77/31; 66/20; 65/100; 64/12; 63/15; 53/30; 52/21; 51/22.

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] Y. Tamura, N. Tsujimoto, M. Ikeda & K. Tomita, Abstr. Third Intern. Congress Heterocycl. Chem., Tohoku University, Sendai, Japan 1971, S. 252.
- [2] S. Oae, N. Tsujimoto & A. Nakanishi, Bull. Chem. Soc. Jpn. 46, 535 (1973).
- [3] C. Leuenberger, L. Hoesch & A. S. Dreiding, Chem. Commun. 1980, 1197.
- [4] K. G. Taylor & T. Riehl, J. Am. Chem. Soc. 94, 250 (1972).
- [5] H. J. Bieri, R. Prewo, H. Hilpert, L. Hoesch & A. S. Dreiding, in Vorbereitung.
- [6] W. Meigen & W. Normann, Ber. Deutsch. Chem. Ges. 33, 2711 (1900); A. G. Green & F. M. Rowe, J. Chem. Soc. 101, 2443 (1912); P. A. S. Smith & J. H. Boyer, Org. Synthesis 31, 14 (1951); J. H. Boyer & F. C. Cantier, Chem. Rev. 1954, 1; J. I. G. Cadogan, M. Cameron-Wood, R. K. Mackie & R. J. G. Searle, J. Chem. Soc. 1965, 4831.
- [7] H. J. Timpe, Z. Chem. 12, 250 (1972); W. J. McKillip, E. A. Sedor, B. M. Culbertson & S. Wawzonek, Chem. Rev. 1973, 255.
- [8] L. Hoesch, Helv. Chim. Acta 64, 38 (1981).
- [9] Y. Tamura, N. Tsujimoto & M. Uchimura, Yakugaku Zasshi 91, 72 (1971).
- [10] Handbook of Chemistry and Physics, C-111, (1975-76).