CARBOXONIUM-IONEN-REAKTIONEN V. ¹⁾

SYNTHESE VON 1,3-OXATHIOLEN UND DEREN FRAGMENTIERUNG ZU β -THIA- γ,δ -ENONEN

Jochen Mattay und Hans-Dieter Scharf*

Institut für Organische Chemie der RWTH Aachen, Prof.-Pirlet-Straße 1,
 D-5100 Aachen, West-Germany

Summary: 1,3-Oxathioles 5 are formed in high yields upon treatment of 5-chloromethyl-1,3-oxathiolanes 3 with potassium t-butoxide in dimethyl sulfoxide at room temperature. The protoncatalyzed fragmentation of 5 leads in good yields to the new β -thia- γ,δ -enones 6.

Einführung: In Fortsetzung unserer Arbeiten über die Synthese von Furanen ²⁾ bei der 1,3-Dioxole bzw. β -Oxa- γ,δ -enone ¹⁾ Schlüsselstellungen einnehmen, untersuchen wir auch heteroanaloge Systeme vom Typ der 1,3-Oxathiole. Eine generelle Darstellungsmethode, die beliebig substituierte 1,3-Oxathiole 5 in guten Ausbeuten liefert, ist bisher nicht bekannt. Lediglich bei der Reaktion von Monothiobenzilen mit Diazolalkanen wurden eine Reihe von tetraarylsubstituierten 1,3-Oxathiolen synthetisiert ³⁾, während sich die übrigen beschriebenen Synthesen auf spezielle arylsubstituierte Verbindungen beschränken ⁴⁻⁶⁾. Im folgenden berichten wir über eine neue allgemeinere Methode zur Synthese von 1,3-Oxathiolen 5 und deren Fragmentierung zu β -Thia- γ,δ -enonen 6.

(1)

Synthese der 1,3-Oxathiole 5: Aus 3-Chlor-2-hydroxy-propylmercaptan 1 ^{7,8)} erhält man durch Acetalisierung ⁹⁾ mit den entsprechenden Carbonylverbindungen 2 die 1,3-Oxathiolane 3 in 68 - 97 % Ausbeute (s. Tab.). Mittels Kalium-tert. butylat in Dimethylsulfoxid bei Raumtemperatur entstehen in ebenfalls hohen Ausbeuten (70 - 93 %) aus 3 die 1,3-Oxathiole 5 durch HCl-Eliminierung und anschließende basenkatalysierte Isomerisierung ¹⁰⁾ in einer Eintopfreaktion (s. Tab.). Nur bei der Eliminierung mit Kaliumhydroxid in Glykol konnten die 5-Methylen-1,3-oxathiolane 4 im Gemisch mit 5 isoliert werden ¹¹⁾. Mit Kalium-tert.butylat in DMSO isomerisiert 4 äußerst leicht zu 5.

Synthese der β -Thia- γ,δ -enone 6: Unter der Wirkung von Säurekatalysatoren fragmentieren die 1,3-Oxathiole 5 zu den β -Thia- γ,δ -enonen 6 bereits bei Temperaturen > 50 °C.

In allen hier untersuchten Fällen erwiesen sich schwach saure Ionenaustauscher wie Lewatit CNP 80 ¹²⁾ (aktive Gruppe COOH) als optimale Katalysatoren (Ausbeuten 50 - 85 %, s. Tab.), zumal sie den Vorteil der leichten Abtrennbarkeit haben. Mit zunehmender Substitution der Thiovinylethergruppe steigen die Ausbeuten, wobei ähnlich wie bei den O-Analoga ¹⁾ Derivate cyclischer Ketone (z.B. 6d) die besten Ergebnisse zeigen.

Strukturen von 3 - 6: Die für 3 - 6 typischen spektroskopischen Daten bestätigen die hier angegebenen Strukturen.

3: ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta \approx 2.8-3.4$ (CH₂S), 3.5-3.7 (CH₂Cl), 4.2-4.7 (CHO), 5.1-5.5 (OCHAlkylS), 6.1-6.2 ppm (OCHArlyS). -¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta \approx 90-100$ (OCR₂S), 81-82 (CHO), 44 (CH₂Cl) und 36 ppm (CH₂S).

4: IR (kap.): $\tilde{\nu} \approx 3100$ (=C-H) und 1660 cm^{-1} (C=C). -¹H-NMR (CDCl₃): $\delta \approx 3.7-3.8$ (CH₂S), 4.0-4.1 (Z=C-H) und 4.4-4.5 ppm (E=C-H).

5: IR (kap.): $\tilde{\nu} \approx 3100$ (=C-H) und $1640-1650 \text{ cm}^{-1}$ (C=C). -¹H-NMR (CDCl₃): $\delta \approx 1.8$ (=C-CH₃), 5.0-5.1 (=CH), 6.0 (OCHAlkylS) und 6.8 ppm (OCHArlyS). -¹³C-NMR (C₆D₆) ¹³⁾: $\delta \approx 145-147$ (=C-O), 100 (OCR₂S), 96 (OCHRS), 91-92 (=CH-S) und 14-15 ppm (Allyl-CH₃).

6: IR (kap.) ν_{max} 3050-3080 (=C-H), 1700-1705 (C=O) und 1580-1605 cm^{-1} (C=C).-
 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): $\delta \approx 1.8-2.0$ (=C- CH_3), 2.2-2.3 (OC- CH_3), 3.3-3.5 ($\text{CH}_2\text{-S}$), 4.7-5.5 (O=C=CH) und 6.0-6.5 ppm (O-CH=).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): $\delta \approx 202$ (C=O), 130-140 (S-C=) 108-113 (=CH $_2$), 42 (CH_2S) und 27 ppm (Acetyl- CH_3).

Zum Bildungsmechanismus von 6 aus 5: Homogene (z.B. Adipinsäure) wie auch heterogene Katalysatoren (Lewatit CNP 80; SC 104 H, aktive Gruppe SO_3H) katalysieren die Fragmentierung von 5 zu 6. So führt bereits mehrstündiges Rühren von 5 mit dem Ionenaustauscher SC 104 H bei Raumtemperatur zum vollständigen Umsatz. In Analogie zur Bildung von β -Oxa- γ,δ -enonen aus 4-Methylen-1,3-dioxolanen²⁾ ist deshalb folgender Reaktionsmechanismus wahrscheinlich.¹⁴⁾

Ob diese Umlagerung auch bei hohen Temperaturen unter neutralen Bedingungen über Ylid-Zwischenstufen^{6b)} der Struktur 9 verlaufen kann, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen¹⁵⁾

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Unterstützung dieser Arbeit.

Literatur

- 1) IV. Mitteil.: J. Mattay, W. Thünker und H.-D. Scharf, Liebigs Ann. Chem. 1981, 1105.
- 2) H.-D. Scharf und E. Wolters, Chem. Ber. 111, 639 (1978).
- 3) C. Bak und K. Praefcke, (a) Chem. Ber. 112, 2744 (1979);
(b) J. Heterocycl. Chem. 17, 1655 (1980).
- 4) S. Mataka, S. Ishi-i und M. Tashiro, J. Org. Chem. 43, 3730 (1978).
- 5) U. Jacobsson Kempe, T. Kempe und T. Norin, J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1978, 1547.
- 6) K. Oka, A. Dobaski und S. Hara, (a) Tetrahedron Lett. 1980, 3579;
(b) J. Am. Chem. Soc. 103, 2757 (1981).
- 7) 1 wurde wie von B. Sjöberg (Lit.8) beschrieben in 80 % Ausbeute (bezogen auf eingesetztes Epichlorhydrin) synthetisiert (Ausbeute nach Lit. 8: 54 %). Die Struktur von 1 wurde erstmals aufgrund von ^1H - und ^{13}C -NMR-Spektren bewiesen:
 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): $\delta=1.60$ (t, $J=7\text{Hz}$; 1 H, SH), 2.77 (dd, $J \approx 7\text{Hz}$; 2H, CH_2S), 3.4 (s; 1H, OH), 3.70 (d; 2H, CH_2Cl) und 3.60-4.15 ppm (m, 1H, CHO).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): $\delta=28.29$ (CH_2SH), 47.31 (CH_2Cl) und 71.97 ppm (CHO).

- 8) B. Sjöberg, Chem. Ber. 74, 64 (1941).
- 9) G.E. Wilson, M.G. Huang und W.W. Schloman, J. Org. Chem. 33, 2133 (1968).
- 10) A.J. Hubert und H. Reimlinger, Synthesis 1969, 97.
- 11) 4 kann auch aus 3 analog zur Synthese der 4-Methylen-1,3-dioxolane mittels KOH in Glykol (Lit.1) in ca. 70 % Ausbeute hergestellt werden. Als optimal erwiesen sich dabei eine Reaktionstemperatur von 140 °C und eine Reaktionsdauer von wenigen Minuten.
- 12) Wir danken der Fa. Bayer AG. Leverkusen, für die zur Verfügung gestellten Ionenaustauscher.
- 13) Aufgrund der längeren Meßzeit konnten die ¹³C-NMR-Spektren nicht in CDCl₃ aufgenommen werden, da die in CDCl₃ stets vorhandenen Säurespuren die Fragmentierung von 5 zu 6 katalysieren. In C₆D₆ war 5 unter den Meßbedingungen stabil (vergl. Diskussion des Bildungsmechanismus).
- 14) Wie in Schema (3) angedeutet, ist eine H⁺-katalysierte Recyclisierung von 6 zu 5 möglich, wenn auch unter den Synthesebedingungen von untergeordneter Bedeutung.
- 15) 5 isomerisiert in siedendem Toluol nur in Gegenwart von H⁺-Katalysatoren zu 6. Bei sorgfältigem Ausschluß von H⁺ ist 5 unter diesen Bedingungen stabil.

TABELLE: Ausbeuten ^{a)} und Siedepunkte ^{b)} von 3, 5 und 6

Nr.	R ¹	R ²	R ³	<u>3</u>		<u>5</u>		<u>6</u>	
				Ausb.	Sdp.	Ausb.	Sdp.	Ausb.	Sdp.
<u>a</u>	H	H	H	75	64/8	73	72/93	50	~75/ 8
<u>b</u>	CH ₃	H	H	86	76/10	82	64/55	83	102/52
<u>c</u>	CH ₃	CH ₃	CH ₃	83	100/14	79	52/10	69	83/9
<u>d</u>	-(CH ₂) ₃	-	H	97	119/13	93	76/13	85	104/9
<u>e</u>	H	CHR ² R ³	= Ph	81	117/0.5	70	61/0.1	-	-

(a) Ausbeute in %. (b) Sdp. in °C/Torr. (c) Die Reaktionstemperatur der mit 20 % CNP 80 katalysierten Fragmentierung von 5 betrug i.a. 100 °C; bei d genüßten bereits 50 °C für einen Umsatz von 0.1 Mol/Std.

(Received in Germany 8 October 1981)