β-Lactame und β-Lactam-Zwischenprodukte, 2. Mitt.¹⁾:Stereo selektive Synthese von *cis*-3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on

Horst-Dieter Ambrosi, Annamarie Kunath und Klaus Jähnisch*

Zentrum für Selektive Organische Synthese, Rudower Chaussee 5, O-1199 Berlin-Adlershof

Eingegangen am 17. März, in überarbeiteter Form am 11. Mai 1992

β-Lactams and β-Lactam-Intermediates, II: Stereoselective Synthesis of *cis*-3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-one

Phthalylglycylchlorid (**1**) reagiert mit Benzalanilin (**3**) in Gegenwart von Triethylamin zum 1,4-Diphenyl-3-phthalimido-azetidin-2-on (**5**). Die Selektivität für die Bildung des *cis*-β-Lactams **5** konnte durch Verringerung der Chloridionenkonzentration in der Reaktionslösung und durch Temperaturniedrigung entscheidend verbessert werden. Hydrazinolyse von **5** führt zum 3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on (**8**).

Phthalylglycyl chloride (**1**) reacts with benzalaniline (**3**) in the presence of triethylamine to yield 1,4-diphenyl-3-phthalimido-azetidin-2-one (**5**). The selectivity of formation of *cis*-β-lactam **5** was improved considerably by decreasing the concentration of chloride in the reaction-solution and by lowering of the temperature. Hydrazinolysis of **5** yields 3-amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-one (**8**).

Im Rahmen unserer Untersuchungen zur stereoselektiven Synthese von β-Lactamen¹⁾ benötigten wir für die unabhängige Synthese eines der möglichen Diastereomeren *cis*-3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on (**8**). Bei der Literaturdurchsicht²⁾ fällt auf, daß kein bequemer Zugang für diese Verbindung existiert. Die Umsetzung des DANE-Salzes von Glycin mit Benzalanilin in Gegenwart von POCl₃ liefert die *cis*-**8**³⁾. Jedoch zeigten eigene Untersuchungen, daß die Ausb. unbefriedigend sind, die Arbeitsvorschrift schlecht reproduzierbar und die Isolierung des Endproduktes mit hohem Aufwand verbunden ist. - Eine weitere Methode besteht in der Umsetzung von Azidoacetylchlorid mit Benzalanilin in Gegenwart von Triethylamin⁴⁾. Diese Arbeitsweise hat den Nachteil, daß die Azidoverbindung zur explosionsartigen Zersetzung neigt und auch größere Mengen *trans*-β-Lactam entstehen. Mehrstufig verläuft die Synthese von *cis*-**8** aus Phthalylglycylchlorid und *S*-Methyl-thiobenzanilid⁵⁾. Die Methylthiogruppe muß nach der Ringschlußreaktion zum β-Lactam mit Raney-Nickel abgespalten werden. Und schließlich ist die Herstellung von enantiomerenreinem *cis*-**8** durch [2+2]-Cycloaddition von chiralen Ketenen mit Benzalanilin beschrieben⁶⁾. Die Ketenvorstufen sind hierbei nur mit hohem präparativen Aufwand zugänglich. Außerdem ist das Auxiliar nur schwer abspaltbar.

Die präparativ einfachste Methode zur Synthese von 3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on (**8**) besteht in der Umsetzung von aktiviertem Phthalylglycin mit Benzalanilin in Gegenwart von tertiären Aminen. Häufig verwendet werden dafür Phthalylglycylchlorid und Triethylamin. Die Reaktionen verlaufen mit guten Ausb., und man hat den Vorteil, daß die Schutzgruppe mit Hydrazin leicht abspaltbar ist. In der Lit. findet man entweder keine Angaben über die Stereochemie^{7,8)} oder aber die Aussage, daß nur *trans*-β-Lactam **8** gebildet wird^{9,10)}.

Wir haben zunächst die Literaturangaben⁷⁾ nachgearbeitet und gefunden, daß in Benzen bei Raumtemp. *cis/trans*-β-Lactame **5** im Verhältnis von 1:1.9 gebildet werden (vgl. Tab. 1 - Methode A). Aus diesem Gemisch kann man das *trans*-β-Lactam **5** mit guten Ausb. isolieren.

Die in der Lit. geführten Diskussionen^{11,15)} zeigen, daß viele Faktoren die Stereochemie bei der β-Lactambildung beeinflussen. Die Reihenfolge der Zugabe der Reagenzien, die Reaktionstemp., die verwendete Base zur Erzeugung des Ketens, die Substitution im Säurechlorid und im Azomethin und die Wahl des Lösungsmittels sollen hier

Tab. 1: 1,4-Diphenyl-3-phthalimido-azetidin-2-on (**5**)

Methode	Lösungsmittel	Konzentration von 1 in mol/l	Reaktionstemperatur	Rohausbeute ^{a)} 5 in %	<i>cis</i> / ^{a)} <i>trans</i>
A ^{b)}	Benzen	0,2	25°C	95	1:1,9
B ^{b)}	CH ₂ Cl ₂	0,2	25°C	53	1:1,2
C ^{b)}	CH ₂ Cl ₂	0,2	-15°C	40	1,2:1
D ^{b)}	CH ₂ Cl ₂	0,6	25°C	23	5:1
E ^{b)}	CH ₂ Cl ₂	0,6	-15°C	41	10:1
F ^{c)}	CH ₂ Cl ₂	0,6	-15°C	64	8:1

a) Bestimmung durch HPLC (Säule: Kieselgel Si 60, 7 μm, 140-4 mm, Fließgeschwindigkeit 1 ml/min, Hexan/*i*-Propanol = 97,5:2,5)

b) Zugabe von **1** zu **3** und Et₃N

c) Zugabe von **3** zu **1** und Et₃N

genannt sein. Eine ausführliche, systematische Untersuchung all dieser Einflüsse auf das *cis/trans*-Verhältnis im β -Lactam ist bisher nicht durchgeführt worden. Es ist aber bekannt, daß die Zugabe eines tert.amins zu einer Mischung aus Säurechlorid und Imin die Bildung des *trans*-isomeren β -Lactams bevorzugt⁴⁾. Erzeugt man zunächst durch Reaktion des Säurechlorides mit der Base das freie Keten und setzt mit dem Imin um, so findet man in vielen Fällen *cis*- β -Lactame im Überschuß¹²⁾. Diese Reaktionen werden in den meisten Fällen bei niedrigen Temp. durchgeführt.

Um den Einfluß der Temp. auf die genannte Reaktion zu untersuchen, war ein Lösungsmittelwechsel erforderlich. Wir nutzten das oft verwendete Dichlormethan und konnten zunächst feststellen, daß bei Raumtemp. das *cis/trans*-Verhältnis im Vergleich zur Reaktion in Benzen kaum verändert wird. Eine Temperaturniedrigung auf -15°C brachte zunächst nicht den gewünschten Erfolg: Es wird lediglich eine geringfügige Verbesserung der *cis*-Selektivität beobachtet (vgl. Tab. 1 - Methode B und C). Der entscheidende Durchbruch gelang durch Änderung der Konzentration der Reaktionspartner in der Lösung, ein Einflußfaktor auf das *cis/trans*-Verhältnis, der in der Literatur bisher nicht diskutiert wurde. Bei Verdreifachung der Konzentration findet man bei Raumtemp. ein *cis/trans*-Verhältnis von 5:1 (vgl. Tab. 1 - Methode D). Arbeitet man mit der gleichen Konzentration bei -15°C , so findet man je nach Reihenfolge der Zugabe von Säurechlorid, Triethylamin und Imin ein *cis/trans*-Verhältnis von 10:1 bis 8:1 (vgl. Tab. 1 - Methode E und F). Aus diesem Gemisch läßt sich reines *cis*- β -Lactam **5** in guten Ausb. isolieren.

Der in der Lit. diskutierte Reaktionsmechanismus ist im Schema 1 dargestellt. Die Addition des *E*-Imins **3** an das Keten **2** führt zur zwitterionischen Zwischenstufe **4**, aus der sich kinetisch kontrolliert durch conrotatorische, electrocyclic Ringschlußreaktion das *cis*- β -Lactam **5** bildet. Die Zwischenstufe **4** kann aber auch über **6** zu **7** isomerisieren und damit zum thermodynamisch stabileren *trans*- β -Lactam **5** führen. Bei der von uns gefundenen selektiven Erhöhung der *cis*- β -Lactam-Bildung nehmen wir an, daß die Konzentration des bei der Reaktion entstehenden Chloridions in der Lösung die entscheidende Einflußgröße ist. Das Chloridion reagiert als Nucleophil mit **4** und kann so über **6** die Isomerisierung zu **7** beschleunigen. Durch Verringerung der Lösungsmittelmenge und durch Temperaturniedrigung wird über das Dissoziationsgleichgewicht des Triethylaminhydrochlorids in Dichlormethan die Konzentration der Chloridionen in der Lösung verringert, so daß der Hauptteil des Salzes aus der Reaktionslösung ausfällt. Die Reihenfolge der Zugabe der Reaktionsparameter spielt bei der beschriebenen Reaktion eine untergeordnete Rolle (vgl. Tab. 1 - Methode E und F).

Die stereoselektive Synthese von *cis*- β -Lactamen ist auch aus biologischer Sicht von besonderem Interesse, da diese Verbindungen im Allgemeinen die höhere Aktivität¹⁶⁾ besitzen.

Experimenteller Teil

¹H-NMR-Spektren: 89 MHz Tesla BS 587.4.- ¹³C-NMR-Spektren: 20 MHz Varian CFT 20. Hexamethyldisiloxan als innerer Standard, chem. Verschiebungen in δ (ppm).- EI-MS: GC/MS-Datensystem HP 5985 B.-

Scheme 1

IR-Spektren: Spekord 75 IR Spektrometer (Carl-Zeiss, Jena).- Elementaranalysen: Elemental analyser-mod 1106 (CARLO ERBA).- HPLC-Untersuchungen: Chromatograph der Firma Knauer GmbH.

cis-1,4-Diphenyl-3-phthalimido-azetidin-2-on (5) (Methode F)

Zu einer Lösung von 9.6 g (43 mmol) Phthalylglycylchlorid **1** in 50 ml CH₂Cl₂ gibt man bei -15°C unter N₂ 6 ml (43 mmol) Triethylamin. Man rührt 10 min und tropft 7.78 g (43 mmol) Benzalanilin (**3**), gelöst in 20 ml CH₂Cl₂, zu. Nach 2stdg. Rühren bei Raumtemp. füllt man mit CH₂Cl₂ auf 300 ml auf, wäscht je einmal mit 100 ml 0.5 M Weinsäure, 100 ml gesättigter NaHCO₃-Lösung und 100 ml Wasser, trocknet über MgSO₄ und entfernt das Lösungsmittel i. Vak. Das in 64proz. (10.1 g) Ausb. erhaltene Rohprodukt **5** (*cis/trans* = 8:1) wird mit 150 ml Ethanol zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen kristallisiert *cis-5* in reiner Form. Ausb. 5.9 g (37%).- Schmp. 227-230°C (Ethanol) (Lit.⁴): 218-219°C).- C₂₃H₁₆N₂O₃ (368.4) Ber. C 75.0 H 4.4 N 7.6 Gef. C 74.8 H 4.2 N 7.6.- IR (KBr): ν = 1780 (C=O), 1760 (C=O), 1720 cm⁻¹ (C=O).- UV (Acetonitril): λ max (lg ε) = 251 nm (4.37).- ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 5.41 (d, J = 5 Hz, 1H, 4-H), 5.62 (d, J = 5 Hz, 1H, 3-H), 6.9-7.7 (m, 14 H arom.).- ¹³C-NMR (CDCl₃): δ = 58.9 und 60.8 (C-3 und C-4), 160.8 (C=O), 166.6 (C=O), 117.4; 123.4; 124.5; 127.2; 128.4; 128.5; 129.2; 131.2; 132.2; 134.2; 137.5 (arom. C).- MS (70 eV): m/z (%) = 368 (9) [M⁺], 249 (27), 181 (100), 160 (100), 133 (19), 104 (58), 77 (68).

trans-1,4-Diphenyl-3-phthalimido-azetidin-2-on (5) (Methode A - Literaturvorschrift⁷)

Ausb. 3.3 g (45%).- Schmp. 227-230°C (Ethanol) (Lit.⁷): 230-231°C).- C₂₃H₁₆N₂O₃ (368.4) Ber. C 75.0 H 4.4 N 7.6 Gef. C 74.8 H 4.2 N 7.4.- IR (KBr): ν = 1780 (C=O), 1760 (C=O), 1710 cm⁻¹ (C=O).- UV (Acetonitril): λ max (lg ε) = 251 nm (4.28).- ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 5.2 (d, J = 2.6 Hz, 1H, 4-H), 5.3 (d, J = 2.6 Hz, 1H, 3-H), 6.5-8.0 (m, 14 H arom.).- ¹³C-NMR (CDCl₃): δ = 61.3 und 62.9 (C-3 und C-4), 162.3 (C=O), 167.1 (C=O), 117.8; 123.7; 124.7; 126.3; 129.0; 129.3; 129.6; 131.9; 134.4; 134.8; 136.1 (arom. C).- MS (70 eV): m/z (%) = 368 (9) [M⁺], 249 (100), 181 (23), 104 (19), 77 (15).

cis-3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on (8)

5.8 g *cis-5* werden in 100 ml Ethanol suspendiert. Dazu gibt man 16 ml einer 1M Lösung von Hydrazinhydrat in Ethanol, kocht 2 h unter Rückfluß und läßt 12 h bei Raumtemp. stehen. Das ausgefallene Phthalylglycylhydrazid wird abgesaugt, das Filtrat i. Vak. eingeeengt, der verbleibende Feststoff in 20 ml CHCl₃ aufgenommen und der unlösliche Hydrazidrest nochmals abfiltriert. CHCl₃ entfernt man i. Vak. und reinigt den Rückstand durch SC (Kieselgel 60, Merck, 0.043-0.063 mm, CHCl₃). Ausb. 2.8 g (73%), Schmp. 179-180°C (Ethanol) (Lit.³): 175-176°C).- C₁₅H₁₄N₂O (238.3) Ber. C 75.6 H 5.9 N 11.8 Gef. C 75.5 H 5.8 N 11.6.- IR (KBr): ν = 3390; 3320 (NH₂), 1729 cm⁻¹ (C=O).- UV (Acetonitril): λ max (lg ε) = 253 nm (3.77).- ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1.23 (s, 2H, NH₂), 4.55 (d, J = 5

Hz, 1H, 4-H), 5.21 (d, J = 5 Hz, 1H, 3-H), 7.1-7.4 (m, 10 H arom.).- ¹³C-NMR (CDCl₃): 62.2 und 63.9 (C-3 und C-4), 168.3 (C=O), 117.6; 124.3; 127.2; 128.7; 128.8; 129.3; 134.5; 137.6 (arom. C).- MS (70 eV): m/z (%) = 238 (12) [M⁺], 182 (100), 119 (49), 104 (28), 91 (30), 77 (68).

trans-3-Amino-1,4-diphenyl-azetidin-2-on (8)

Darstellung aus 5.8 g *trans-5* analog der obigen Vorschrift.- Ausb. 2.8 g (75%), Schmp. 102-103°C (wenig Ethanol) (Lit.¹⁷): 108°C).- C₁₅H₁₄N₂O (238.3) Ber. C 75.6 H 5.9 N 11.8 Gef. C 75.5 H 5.8 N 11.6.- IR (KBr): ν = 3370, 3310 (NH₂), 1736 cm⁻¹ (C=O).- UV (Acetonitril): λ max (lg ε) = 253 nm (3.86).- ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1.67 (s, 2H, NH₂), 4.0 (d, J = 2.2 Hz, 1H, 4-H), 4.58 ppm (d, J = 2.2 Hz, 1H, 3-H), 7.2-7.4 (m, 10 H arom.).- ¹³C-NMR (CDCl₃): 66.7 und 70.0 (C-3 und C-4), 168.3 (C=O), 117.6; 124.3; 126.1; 128.8; 129.3; 129.4; 137.1; 137.6 (arom. C).- MS (70 eV): m/z (%) = 238 (16) [M⁺], 182 (100), 119 (32), 104 (14), 91 (12), 77 (24).

Literatur

- 1 W. Duczek, K. Jähnisch und Annamaria Kunath, G. Reck, G. Winter und B. Schulz, Liebigs Ann. Chem. 1992, 781.
- 2 F.H. van der Steen und G. van Koten, Tetrahedron 47, 7503 (1991).
- 3 S.D. Sharma und P.K. Gupta, Indian J. Chem., Sect. B 19B, 760 (1980).
- 4 A.K. Bose, B. Anjaneyulu, S.K. Bhattacharya und M.S. Manhas, Tetrahedron 23, 4769 (1967).
- 5 A.K. Bose, M.S. Manhas, J.C. Chip, H.P.S. Chawla und B. Dayal, J. Org. Chem. 39, 2877 (1974).
- 6 N. Ikota, Chem. Pharm. Bull. 38, 1601 (1990).
- 7 J.C. Sheehan und J.J. Ryan, J. Am. Chem. Soc. 73, 1204 (1951).
- 8 A.R. Butler und K.A. Freemann, J. Chem. Soc. Perkin Trans. II 1977, 765.
- 9 A.K. Bose, Y.H. Chiang und M.S. Manhas, Tetrahedron Lett. 1972, 4091.
- 10 I.G. Gunda, P.M. Mashava und X. Guan, Tetrahedron Lett. 1991, 581.
- 11 H.W. Moore, G. Hughes, K. Srinivasachar, M. Fernandez, N.V. Nguyen, D. Schoon und A. Tranne, J. Org. Chem. 50, 4231 (1985).
- 12 D.A. Evans und E.B. Sjogren, Tetrahedron Lett. 1985, 3783.
- 13 E. Lynch, S.M. Risemann, W.L. Laswell, D.M. Tschaen, R.P. Volante, G.B. Smith und I. Shinkai, J. Org. Chem. 54, 3792 (1989).
- 14 L.S. Hegedus, J. Montgomery, Y. Narukawa und D.C. Snustad, J. Am. Chem. Soc. 113, 5784 (1991).
- 15 W.T. Brady und M.M. Dad, J. Org. Chem. 56, 6118 (1991).
- 16 H. Yamashita, N. Minami, K. Sakakibara, S. Kobayashi und M. Ohno, Chem. Pharm. Bull. 36, 469 (1988).
- 17 P. Kumar und A.K. Mukerjee, Indian J. Chem., Sect. B, 20B, 420 (1981).

[Ph42]