Arch. Pharm. (Weinheim) 313, 35–39 (1980)

Über die cyclische „Carbonylierung“ in der Reihe der 1,2-Dihydroxylaminoalkane

Gerwalt Zinner*, Jürgen Schmidt und Willy Kilwing

Institut für Pharmazeutische Chemie der Technischen Universität Braunschweig, Beethovenstraße 55,
3300 Braunschweig.

Eingegangen am 30. März 1979

Bei der Einwirkung von Phosgen oder *N,N'*-Carbonyldiimidazol auf das bifunktionelle Hydroxylamin **1** entsteht das Derivat **3** des 1,2,5-Oxadiazin-6-ons, welches mit Isocyanaten und Säurechloriden umgesetzt wird.

Cyclic "Carbonylation" in the 1,2-Bis(hydroxylamino)alkane Series

Phosgene or *N,N'*-carbonyldiimidazole react with the hydroxylamine **1** to yield the derivative **3** of the 1,2,5-oxadiazin-6-one system. The reactivity of **3** towards isocyanates and carboxylic chlorides was investigated.

Wie wir bereits berichteten, konnte das als Beispiel eines 1,2-Dihydroxylaminoalkans dienende 2,3-Dihydroxylamino-2,3-dimethylbutan (**1**) zwar zu **2** cyclisch oxalyliert¹⁾, nicht jedoch mit Phosgen und auch *N,N'*-Carbonyldiimidazol zu dem nur auf anderem Wege zugänglichen¹⁾ 1,3-Dihydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazolidinon (**4**) cyclisch „carbonyliert“ werden, vielmehr entstand dabei unter *N*- und *O'*-Acylierung das 6-ringgliedrige 5-Hydroxy-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6*H*-1,2,5-oxadiazin-6-on (**3**)²⁾.

Mit dem *Phosgen*-Verfahren wurde **3** nur in Ausbeuten von 30–35 % erhalten; doppelt ergiebig verlief die Umsetzung mit *N,N'*-Carbonyldiimidazol in Tetrahydrofuran, die bei Umkristallisieren aus Chloroform das Imidazolium-Salz von **3** lieferte. Der Möglichkeit zur Salzbildung an der Hydroxamsäure-Funktion entspricht die Umsetzung mit Diazomethan zum Methylester **5**.

Mit je 4 aliphatischen und aromatischen Isocyanaten wurden, auch bei deren Überschuß und der Verwendung von Katalysatoren (Triethylamin, 4-Dimethylaminopyridin, „Dabco“, Tributylmethoxyzinn) nur die Derivate einer mono-Umsetzung an der [N–OH]-Gruppe zu **6** erhalten, kenntlich an der kurzwelligen Lage der Carbamoyl-Bande bei 1780 bis 1760/cm und der kürzerwelligen Verschiebung der cyclischen Carbonyl-Bande um etwa 20/cm gegenüber **3**. Dies entspricht dem offenkettigen Verbindungstyp³⁾ wie

	R		R		R'
5	Methyl	7a	Acetyl		
6a	Methylcarbamoyl	7b	Benzoyl		
6b	Ethylcarbamoyl	7c	4-Nitrobenzoyl		
6c	Propylcarbamoyl	7d	4-Chlorbenzoyl		
6d	tert-Butylcarbamoyl	8	Cyclohexylcarbamoyl	R	
6e	Phenylcarbamoyl	9a	Acetyl	R	
6f	3-Chlorphenylcarbamoyl	9b	4-Chlorbenzoyl	Acetyl	
6g	4-Chlorphenylcarbamoyl				
6h	3,4-Dichlorphenylcarbamoyl				

z.B. Me-N(CO₂Et)-O-CO-NH-Et mit 1785 und 1730/cm. Bei der Umsetzung mit Cyclohexylisocyanat wurde dagegen auch unter Eiskühlung im äquimolaren Ansatz nur das Produkt **8** einer [1 + 2]-Umsetzung isoliert.

In der Reihe der Säurechloride wurden mit Acetylchlorid sowohl die mono-Acylierung zu **7a** als auch (im Molverhältnis 1:2 und Gegenwart von Triethylamin) die bis-Acylierung zu **9a** erzielt. Benzoylchlorid, 4-Nitrobenzoylchlorid und 4-Chlorbenzoylchlorid ergaben nur die mono-Acylierungsprodukte **7**, jedoch konnte **7d** mit Acetylchlorid zusätzlich an der [NH]-Gruppe zu **9b** acyliert werden.

Für Sachbeihilfen danken wir dem Fonds der Chemie, für die Aufnahme der ¹H-NMR-Spektren dem Institut für Organische Chemie der TU Braunschweig und der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, Braunschweig-Stöckheim.

Experimenteller Teil

Von allen mit Summenformel und Mol.-Masse beschriebenen Substanzen wurden zutreffende elementaranalytische Daten (C,H,N; gegebenenfalls Cl) erhalten. HSR (Hydroxamsäure-Reaktion) bedeutet: Farbreaktion mit Eisen(III)-chlorid.

1. 5-Hydroxy-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-on (**3**)

a) durch Zutropfen von 25 mmol Phosgen (gelöst in Benzol) zu 25 mmol 2,3-Dihydroxylamino-2,3-dimethylbutan (**1**) und 50 mmol Triethylamin in 50 ml Benzol (0°, 2 h Rühren), Zugabe von 10 ml Ethanol zum eingeeengten Filtrat. Ausb. 31 %;

b) durch Zutropfen (0°, Rühren) von 25 mmol Phosgen (gelöst in Dioxan) zu 25 mmol **1** und 45 mmol Kaliumacetat in 22 ml Dioxan + 8 ml Wasser, 1 h Nachrühren bei Raumtemp., Einengen i. Vak. zur Trockne und Ausziehen mit warmem Chloroform. Ausb. 33 %;

c) durch portionsweise Zugabe (Raumtemp., Rühren) von 27 mmol *N,N'*-Carbonyldiimidazol zu 25 mmol **1** in 50 ml THF, nach 3 h i. Vak. einengen, mit Chloroform/Petrolether (1:1) kristallisieren lassen, aus Ethanol bei 40° schonend umkristallisieren. Ausb. 66 %; Schmp. 125–126° (in verschlossener Kapillare; im offenen Röhrchen sublimiert die Substanz ab 134°); HSR violett; IR (KBr): 3220, 3120 (OH, NH), 1680/cm (C=O); IR (25 mg in 1 ml THF): 3550 (OH), 3200 (NH), 1700/cm (C=O); ¹H-NMR (DMSO-D₆): δ (ppm) = 1,06 (s, 2 CH₃), 1,17 (s, 2 CH₃), 7,69 (s, NH), 9,47 (s, OH); C₇H₁₄N₂O₃ (174,2).

d) Ansatz c) ergab beim Umkristallisieren aus Chloroform (statt Ethanol) das Imidazolium-Salz von **3**, Ausb. 80 %; Schmp. 104°; HSR violett; IR (KBr): 3200, 3100 (NH), 2600–2300 (NH⁺), 1660/cm (C=O); C₁₀H₁₈N₄O₃ (242,3). Umkristallisieren aus Ethanol ergab **3**.

2. 5-Methoxy-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-on (**5**)

aus **3** in Methanol mit Diazomethan in Ether; Ausb. 96 %; Schmp. 85° (Benzol); HSR negativ; IR (KBr): 3200 (NH), 1730–1700/cm (C=O); ¹H-NMR (DMSO-D₆): δ (ppm) = 1,07 (s, 2 CH₃), 1,22 (s, 2 CH₃), 3,73 (s, CH₃O), 7,92 (s, NH); C₈H₁₆N₂O₃ (188,2).

3. 5-Carbamoyloxylierte 3,3,4,4-Tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-one (**6**)

aus äquimol. Mengen **3** und Isocyanat in THF; HSR negativ:

3.1. mit Methylisocyanat (5 min 60°):

5-Methylcarbamoyloxy- (**6a**); Ausb. 55 %; Schmp. 122–123° (Benzol/THF); IR (KBr): 3340, 3240 (NH), 1760, 1700/cm (C=O); C₉H₁₇N₃O₄ (231,3).

3.2. mit Ethylisocyanat (5 min 60°):

5-Ethylcarbamoyloxy- (**6b**); Ausb. 70 %; Schmp. 121–122° (Benzol); IR (KBr): 3280, 3210 (NH), 1760, 1700/cm (C=O); C₁₀H₁₉N₃O₄ (245,3).

3.3. mit Propylisocyanat (5 min 60°):

5-Propylcarbamoyloxy- (**6c**); Ausb. 80 %; Schmp. 120–121° (Benzol); IR (KBr): 3300 (Schulter), 3240 (NH), 1760, 1700/cm (C=O); C₁₁H₂₁N₃O₄ (259,3).

3.4. mit *tert*-Butylisocyanat (5 min 60°):

5-*tert*-Butylcarbamoyloxy- (**6d**); Ausb. 92 %; Schmp. 135° (Benzol); IR (KBr): 3280, 3200 (NH), 1770, 1700/cm (C=O); C₁₂H₂₃N₃O₄ (273,3).

3.5. mit Phenylisocyanat (2 h Rückfluß):

5-Phenylcarbamoyloxy- (**6e**); Ausb. 86 %; Schmp. 136° (Benzol); IR (KBr): 3270 (NH), 1765, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₉N₃O₄ (293,3).

3.6. mit 3-Chlorphenylisocyanat (2 h Rückfluß):

5-(3-Chlorphenylcarbamoyloxy)- (**6f**); Ausb. 74 %; Schmp. 138–139° (Ethylacetat); IR (KBr): 3240 (NH), 1780, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₈ClN₃O₄ (327,7).

3.7. mit 4-Chlorphenylisocyanat (2 h Rückfluß):

5-(4-Chlorphenylcarbamoyloxy)- (**6g**); Ausb. 39 %; Schmp. 110–111° (Benzol/Petrolether); IR (KBr): 3220 (NH), 1780, 1730/cm (C=O); C₁₄H₁₈ClN₃O₄ (327,7).

3.8. mit 3,4-Dichlorphenylisocyanat (10 min Rückfluß):

5-(3,4-Dichlorphenylcarbamoyloxy)- (**6h**); Ausb. 76 %; Schmp. 112–114° (Ethylacetat); IR (KBr): 3220 (NH), 1780, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₇Cl₂N₃O₄ (362,2).

4. 5-Acyloxylierte 3,3,4,4-Tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-one (**7**)

Aus 2,5 mmol **3** und 2,6 mmol Triethylamin in 20 ml THF, langsames Zutropfen von 2,5 mmol Säurechlorid, 10 min Erwärmen auf 65°, anderntags Aufarbeiten; HSR negativ.

4.1. mit Acetylchlorid: 5-Acetoxy- (**7a**); Ausb. 87 %; Schmp. 106–107° (Benzol/Petrolether); IR (KBr): 3220 (NH), 1800, 1700/cm (C=O); C₉H₁₆N₂O₄ (216,2).

4.2. mit Benzoylchlorid: 5-Benzoyloxy- (**7b**); Ausb. 86 %; Zers.-Schmp. 165–166° (Benzol); IR (KBr): 3240 (NH), 1770, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₈N₂O₄ (278,3).

4.3. mit 4-Nitrobenzoylchlorid: 5-(4-Nitrobenzoyloxy)- (**7c**); Ausb. 77 %; Zers.-Schmp. 174° (Benzol); IR (KBr): 3210 (NH), 1765, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₇N₃O₆ (323,3).

4.4. mit 4-Chlorbenzoylchlorid: 5-(4-Chlorbenzoyloxy)- (**7d**); Ausb. 67 %; Zers.-Schmp. 159–161° (Benzol/Petrolether); IR (KBr): 3230 (NH), 1775, 1705/cm (C=O); C₁₄H₁₇ClN₂O₄ (312,7).

5. 2-Cyclohexylcarbamoyl-5-cyclohexylcarbamoyloxy-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-on (**8**)

wurde in Ausb. von 70–80 % aus **3** und Cyclohexylisocyanat, auch im Mol-Verhältnis 1:1 und bei Eiskühlung (THF) erhalten. Schmp. 142–143° (Benzol/Petrolether); IR (KBr): 3390, 3210 (NH), 1780, 1700/cm (C=O); C₂₁H₃₆N₄O₅ (424,5).

6. 5-Acetoxy-2-acetyl-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-on (**9a**)

Aus 2,5 mmol **3** und 5 mmol Triethylamin in 20 ml THF, langsames Zutropfen von 5 mmol Acetylchlorid, 10 min Erwärmen auf 65°, anderntags Aufarbeiten; Ausb. 81 %; Schmp. 111–112° (Benzol/Petrolether); HSR negativ; IR (KBr): 1795, 1750, 1685/cm (C=O); C₁₁H₁₈N₂O₅ (258,3).

7. 2-Acetyl-5-(4-chlorbenzoyloxy)-3,3,4,4-tetramethyl-2,3,4,5-tetrahydro-6H-1,2,5-oxadiazin-6-on (**9b**)

Aus 2 mmol **7d** (s. 4.4) und 2 mmol Triethylamin in 20 ml THF, langsames Zutropfen von 2 mmol Acetylchlorid, 10 min Erwärmen auf 65°, anderntags Aufarbeiten; Ausb. 77 %; Schmp. 172–173° (Benzol); HSR negativ; IR (KBr): 1780, 1745, 1685/cm (C=O); C₁₆H₁₉ClN₂O₅ (354,8).