Literatur

- ** Teilergebnisse der Dissertation R. Barzen, Mainz 1981.
- 1 8. Mitt.: J. Herke und W. Schunack, Arch. Pharm. (Weinheim) 315, 641 (1982).
 - 2 J. W. Black, W. A. M. Duncan, J. C. Emmett, C. R. Ganellin, T. Hesselbo, M. E. Parsons und J. H. Wyllie, Agents Actions 3, 133 (1973).
 - 3 G. J. Durant, J. C. Emmett, C. R. Ganellin, P. D. Miles, M. E. Parsons, H. D. Prain und G. R. White, J. Med. Chem. 20, 901 (1977).
 - 4 R. W. Brimblecombe, W. A. M. Duncan, G. J. Durant, J. C. Emmett, C. R. Ganellin und M. E. Parsons, J. Int. Med. Res. 3, 86 (1975).
 - 5 R. Gompper und W. Töpfl, Chem. Ber. 95, 2871 (1962).
 - 6 Smith Kline & French Laboratories Ltd. (Erf. G. J. Durant, J. C. Emmett, C. R. Ganellin und H. D. Prain), D.O.S. 2 423 813 (5. 12. 1974); C. A. 82, 170 943v (1975).
 - 7 O. Wallach und H. Bleibtreu, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12, 1061 (1879).
 - 8 D. E. Worrall, J. Am. Chem. Soc. 50, 1456 (1928).
 - 9 J. Ross, J. Am. Chem. Soc. 55, 3672 (1933).
 - 10 J. W. Black, W. A. M. Duncan, G. J. Durant, C. R. Ganellin und M. E. Parsons, Nature (London) 236, 385 (1972).
 - 11 W. Schunack, H. Engler und E. Fritschi, Arzneim. Forsch. 29, 595 (1979).
 - 12 J. M. Van Rossum, Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 143, 299 (1963).
 - 13 J. Herke und W. Schunack, Eur. J. Med. Chem. Chim. Ther. 14, 203 (1979).
 - 14 R. Gompper und W. Töpfl, Chem. Ber. 95, 2861 (1962).
 - 15 K. Wegner, E. Fritschi und W. Schunack, Arch. Pharm (Weinheim) 311, 98 (1978).

[Ph 483]

Arch. Pharm. (Weinheim) 315, 684–691 (1982)

Studien zur Chemie der 1,4-Oxazine, 7. Mitt.¹⁾**Synthese von 1,4-Oxazinen aus 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen²⁾**

Herbert Bartsch

Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität Wien, Währinger Straße 10, A-1090 Wien
Eingegangen am 2. September 1981

Die Reaktion von **3** mit NH₃/Ethanol liefert bei 20° **4**, das durch verschiedene Methoden zu **5** cyclisiert werden kann. **5** wird auch auf direktem Weg aus **3** bei 80° erhalten. Versuche, durch partielle Reduktion von **4** zu **6** zu gelangen, liefern **7**. Erhitzen von **5** mit Acetanhydrid/Pyridin führt zu **12**, das zu **13** reduziert wird. **17** reagiert mit NH₃/Ethanol zu **18**, während unter reduktiven Bedingungen **19** entsteht.

1,4-Oxazines, VII: Synthesis of 1,4-Oxazines from 3-Oxa-1,5-dioxo Compounds

Reaction of **3** with NH₃/ethanol at 20°C yields **4** which can be cyclised to **5** by various methods. Compound **5** is formed directly from **3** at 80°C. Partial reduction of **4** yields **7** rather than **6**. Treatment

of **5** with acetic anhydride/pyridine at 100°C leads to **12** which can be reduced to **13**. Compound **17** reacts with NH₃/ethanol to yield **18**, whereas **19** is formed under reductive conditions.

Die von *Correia*³⁾ beschriebene Reaktion von Diphenacylanilin zu 2,4,6-Triphenyl-1,4-oxazin ist als prinzipielle Synthesemethode für 1,4-Oxazine nicht geeignet. Dieser Ringschluß läßt sich auf andere 3-Aza-1,5-dioxo-Verbindungen mit Substitutionsmustern, die von Diphenacylanilin abweichen, auch bei Variation der Cyclisierungsmittel nicht anwenden⁴⁾.

Die Frage, ob durch Cyclisierung von 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen – also durch einen Ringschluß über die Stickstofffunktion – eine gangbare Alternative für die Synthese von 1,4-Oxazinen gegeben ist, sollte in der vorliegenden Arbeit geklärt werden.

Die Darstellung des Diphenacylothers (**3**) erfolgte nach der von *Mayfield* und *Yates*⁵⁾ beschriebenen Methode aus **1** und **2**. Durch geringfügige Abwandlung der Reaktionsbedingungen und eine geänderte Aufarbeitung konnte die Ausbeute an **3** verbessert werden. In gleicher Weise wurde aus **1** und **16**⁶⁾ der Acetylphenacylother (**17**), dessen Herstellung auch auf anderem Weg möglich ist⁷⁾, erhalten.

3 wurde bei 20° in 10proz. ammoniakal. Ethanol gelöst. Der nach kurzer Zeit aus der klaren Lösung ausfallende Niederschlag konnte als Monoimin **4** charakterisiert werden. Bei dünn-schichtchromatographischen Untersuchungen von **4** an Kieselgel fiel auf, daß unabhängig vom verwendeten Fließmittel quantitativ ein gelber Fleck entstand. Die nach präp. DC isolierte gelbe Substanz stellte ein Dehydratisierungsprodukt von **4** dar. Mit Hilfe der spektroskopischen Daten und der Elementaranalyse konnte ihm eindeutig die Struktur des Oxazins **5** zugeordnet werden. Die Überführung von **4** in **5** war nicht nur an Kieselgel möglich, sondern gelang auch durch trockenes Erhitzen von **4** oder Erwärmen der ethanol. Lösung. Als geeignete Darstellungsmethode für **5** erwies sich jedoch die direkte Umsetzung von **3** mit NH₃/Ethanol im Autoklaven bei 80°.

Versuche, durch selektive Reduktion der Iminogruppe in **4** das Aminoketon **6** und daraus durch anschließende Cyclisierung das entsprechende Dihydrooxazin darzustellen, führten trotz des Einsatzes verschiedener Hydrierkatalysatoren jeweils zu **7**, das auch aus **5** unter den gleichen Bedingungen erhalten wurde.

Durch vergleichende Untersuchungen an **3** konnte gezeigt werden, daß praktisch kein Unterschied in der Reaktivität von Carbonyl- und Iminofunktion gegenüber molekularem Wasserstoff gegeben ist; die Reduktion von **3** zu **8** erfolgte mit der gleichen Geschwin-

digkeit wie die Morpholinbildung aus **4**, **8**, das ein völlig unspezifisches Massenspektrum lieferte, konnte chemisch einerseits durch Überführung in den mehrfach beschriebenen Diphenethylether (**9**) und andererseits durch Darstellung seines Monoacetats **10** und Diacetats **11** bewiesen werden.

Versuche, die Stabilität von **5** – nach mehrstündiger Aufbewahrung bei 20° zerfließen die gelben Kristalle zu öligen Zersetzungsprodukten – durch Salzbildung mit Triphenylcarbeniumtetrafluorborat zu erhöhen, waren nicht erfolgreich. Jedoch konnte eine Stabilisierung des Ringsystems, wie sie schon bei 1,4-Benzoxazinen beobachtet wurde⁸⁾, durch Einführung einer Acetylgruppe am Stickstoff erreicht werden.

Aus **5** wurde durch mehrstündiges Erhitzen in Acetanhydrid/Pyridin unter Doppelbindungsisomerisierung das beständige Dienamid **12** erhalten. Einen chemischen Beweis für **12** durch Umwandlung in **14**, das aus **7** zugänglich ist, zu führen, war nicht möglich, da **12** katalytisch nicht hydriert werden konnte. Aus dem Kalottenmodell ist ersichtlich, daß die beiden Benzolringe durch die N-ständige Acetylgruppe aus der Ebene des Oxazinringes herausgedreht werden und dadurch offensichtlich die Anlagerung des Moleküls an den Katalysator verhindert wird. Aus den gleichen Gründen konnte aus **12** hergestelltes Ethylprodukt **13** nicht zu **15** hydriert werden.

Erwähnenswert erscheint die Tatsache, daß Umsetzungen von **3** (und auch von **17**) mit primären Aminen, die zu N-alkylierten Verbindungen des Typs **13** führen müßten, in jedem Fall erfolglos blieben. Die direkte Ausbildung der Dienaminstruktur bei einem Ringschluß dürfte aus energetischen Gründen nicht möglich sein.

Die Abwandlung der 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindung durch Austausch eines elektronenziehenden Phenylrestes in **3** gegen die elektronenliefernde Methylgruppe ließ einen negativen Einfluß auf die Stabilität des Cyclisierungsprodukts erwarten. Es zeigte sich auch, daß das aus **17** durch Einwirkung von ammoniakal. Ethanol erhaltene Reaktionsprodukt **18** nicht unzersetzt isoliert und nur durch sein 1H -NMR-Spektrum identifiziert

werden konnte. Eine weitere Charakterisierung durch Salzbildung mit Triphenylcarbeniumtetrafluorborat oder Acetylierung am Stickstoff war auf Grund der leichten Zersetzbarkeit von **18** nicht möglich.

Um einen chemischen Beweis für den Ringschluß zu **18** zu führen, wurde **17** unter reduktiven Bedingungen cyclisiert. Das erhaltene Rohprodukt, das hauptsächlich aus **19** bestand, konnte weder destillativ noch chromatographisch gereinigt werden. Die Elementzusammensetzung von **19** wurde nach gaschromatographischer Trennung durch Massenspektrometrie ermittelt. Der Versuch, durch Acetylierung des in Mischung vorliegenden Morpholins **19** eine als Reinsubstanz isolierbare Verbindung zu erhalten, führte wiederum zu einem nur gaschromatographisch trennbaren Reaktionsgemisch, welches als Hauptbestandteil **20** enthielt.

Im Gegensatz von 3-Aza-1,5-dicarbonylverbindungen stellen 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen offensichtlich geeignete Ausgangssubstanzen zur Synthese von 1,4-Oxazinen dar. Die Schwierigkeiten, mit Hilfe dieser Methode Oxazine mit funktionellen Gruppen am Ring darzustellen, dürften nicht in der Durchführung des Ringschlusses, sondern – wie orientierende Versuche gezeigt hatten – in der Herstellung der entsprechenden Dioxo-Verbindungen bestehen. Aus diesem Grund wird das Studium der Synthese von funktionalisierten 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen Aufgabe weiterer Untersuchungen sein.

Herrn Univ.-Doz. Dr. E. Haslinger und Herrn Dr. A. Nikiforov, Institut für Organische Chemie der Universität Wien, danke ich für die Aufnahme des ^{13}C -NMR-Spektrums bzw. die Durchführung der Massenfeinbestimmung und Herrn Dr. J. Zak, Mikroanalytisches Laboratorium des Instituts für Physikalische Chemie der Universität Wien, für die Ausführung der Elementaranalysen.

Experimenteller Teil

Präp. DC: Fertigplatten, Kieselgel 60 F₂₅₄ (Fa. Merck, 20 x 20 cm, Schichtdicke 2 mm); *SC:* Kieselgel 60, 70–230 mesh (Fa. Merck). *Schmp.:* Kofler Heizmikroskop (Fa. Reichert), unkorrr.; *IR:* Jasco IRA 1; $^1\text{H-NMR}$: Varian EM-390; $^{13}\text{C-NMR}$: Varian XL 100; *MS:* Varian-MAT 111; Massenfeinbestimmung: Varian-MAT 311; *GC:* Varian 3700.

Darstellung der 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen

Zu 10 mmol Dioxolan **2**⁵⁾ bzw. **16**⁶⁾ in 40 ml absol. Benzol und 0,2 ml BF₃-Etherat werden 9,6 mmol **1** in 15 ml absol. Benzol bei 15° zugetropft. Nach dem Abklingen der N₂-Entwicklung wird das Lösungsmittel i. Vak. abdestilliert und der Rückstand mit 50 ml 80proz. Dioxan, welches 0,3 g 4-Toluolsulfonsäure enthält, 6 h zum Rückfluß erhitzt. Die Mischung wird in 1N-NaHCO₃ eingetragen und mit Ether extrahiert. Nach dem Waschen mit H₂O wird über Na₂SO₄ getrocknet und der Ether i. Vak. entfernt. Durch kontinuierliche Extraktion der Waschflüssigkeit mit Ether wird weiteres Rohprodukt gewonnen.

Diphenacylether (3)

Das aus **1** und **2** erhaltene Rohprodukt wird i. Vak. fraktioniert. Sdp_{-0,05}: 150°; Schmp. 72° (Cyclohexan), (Schmp.⁵⁾ 70–71°; Ausb. 960 mg (38 % bez. auf **2**), (Ausb.⁵⁾ 27 % bez. auf **2**).

Acetylphenacylether (17)

Das aus **1** und **16** gewonnene Rohprodukt wird durch SC mit dem Fließmittelgemisch Benzol/Ethylacetat (6 + 4) getrennt und die Fraktion mit dem Rf = 0,24 destillativ gereinigt. Ausb. 1,13 g (59 % bez. auf **16**). Die physikalischen und spektroskopischen Daten stimmen mit auf anderem Weg dargestelltem **17**⁷⁾ überein.

Umsetzung der 3-Oxa-1,5-dioxo-Verbindungen mit NH₃/Ethanol

2 mmol **3** bzw. **17** werden mit der angegebenen Menge 10proz. ammoniakal. Ethanol zur Reaktion gebracht und die Reaktionslösung aufgearbeitet.

2-[(2-Imino-2-phenyl)ethoxy]-1-phenylethanon (4)

Aus 508 mg **3** in 10 ml NH₃/Ethanol während 10 min bei 20°. Weißer Niederschlag. Schmp. ab 90° Zers.; Ausb. 360 mg (77 %). C₁₆H₁₅NO₂ (253,3) Ber. C 75,9 H 5,97 N 5,5 Gef. C 75,9 H 6,07 N 5,6 Mol.-Masse 253 (ms). – IR (KBr): 1580 (C=N), 1633 cm⁻¹ (CO). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl₃): δ (ppm) = 3,45 (s; NH), 3,72, 3,88 (AB-System; J = 11 Hz, CH₂CN), 4,63 (s; CH₂CO), 7,23–7,87 (m; 10 H arom.). – MS (70 eV): m/e = 253 (7 % M⁺), 235 (27 % M⁺-H₂O).

3,5-Diphenyl-2H-1,4-oxazin (5)

Aus 508 mg **3** in 7 ml NH₃/Ethanol während 2 h bei 80°. Nach dem Einengen der Reaktionslösung auf die Hälfte kristallisieren gelbe Kristalle. Schmp. 83° (Methanol); Ausb. 340 mg (72 %). C₁₆H₁₃NO (235,3) Ber. C 81,7 H 5,57 N 6,0 Gef. C 81,3 H 5,70 N 5,9 Mol.-Masse 235 (ms). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl₃): δ (ppm) = 4,78 (s; CH₂), 6,93 (s; CH), 7,20–8,07 (m; 10 H arom.).

3-Methyl-5-phenyl-2H-1,4-oxazin (18)

Aus 384 mg **17** in 40 ml NH₃/Ethanol während 12 h bei 5°. Das Lösungsmittel wird i. Vak. abdestilliert. C₁₁H₁₁NO (173.2). – ¹H-NMR (CD₃OD): δ (ppm) = 2.15 (s; CH₃), 4.28 (s; CH₂-C-Me), 6.83 (s; CH=C-Ar), 7.13–7.67 (m; 5H arom.)

Katalytische Hydrierung

1 mmol Substanz wird in 10 ml Ethanol gelöst und nach Zusatz von 10proz. Pd/C hydriert. Nach Aufnahme der entsprechenden H₂-Menge wird der Katalysator abfiltriert und das Lösungsmittel i. Vak. abgedampft. Die Ausbeute ist quantitativ.

3,5-Diphenylmorpholin (7)

Aus 253 mg **4** bzw. 235 mg **5** innerhalb 15 min nach Aufnahme von 2 mmol H₂. Schmp. 105° (Methanol). C₁₆H₁₇NO (239.3) Ber. C 80.3 H 7.16 N 5.9 Gef. C 80.3 H 7.23 N 5.8 Mol.-Masse 239 (ms). – ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2.03 (s; NH), 3.33, 3.81, 4.07 (ABM-System; J_{AB} = J_{AM} = J_{BM} = 11 Hz, 2CH₂-CH), 7.20–7.57 (m; 10 H arom.).

2,2'-Oxybis(1-phenylethanol) (8)

Aus 254 mg **3** innerhalb 15 min nach Aufnahme von 2 mmol H₂. Schmp. 113° (Ethanol). C₁₆H₁₈O₃ (258.3) Ber. C 74.4 H 7.02 Gef. C 74.6 H 7.04. – ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 2.5–3.2 (2 OH), 3.47–3.90 (m; 2 CH₂), 4.77–5.17 (m; 2 CH), 7.23–7.53 (m; 10 H arom.).

Diphenethylether (9)

Aus 254 mg **3** nach 24 h und Aufnahme von 4 mmol H₂. Die Daten decken sich mit denen der mehrfach beschriebenen Verbindung.

3-Methyl-5-phenylmorpholin (19)

192 mg (1 mmol) **17** in 4 ml Ethanol werden mit 16 ml 10proz. ammoniakal. Ethanol versetzt und nach Zugabe von 10proz. Pd/C bis zum Stillstand der H₂-Aufnahme hydriert. Das von Katalysator und Lösungsmittel befreite Rohprodukt wird unter folgenden Trennbedingungen der GC unterworfen: Glassäule, 1.5 m; 3% OV 17 auf Chromosorb W/HP 120/140 mesh; 28 ml N₂/min. Von der Substanz mit der Retentionszeit (R_t) = 300 sec wurde die Elementzusammensetzung durch Massenfeybestimmung ermittelt. C₁₁H₁₅NO Mol.-Masse Ber. 177.115³⁷, Gef. 177.115⁴ ± 0.0005. – ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 1.03 (d; J = 6 Hz, CH₃), 2.2 (NH), 3.00–4.07 (m; 2 CH-CH₂), 7.13–7.47 (m; 5 H arom.).

Umsetzungen mit Acetanhydrid

1 mmol der entsprechenden Substanz in 10 ml absol. Benzol (a–c) bzw. 5 ml absol. Pyridin (d) wird a) mit 200 mg Acetanhydrid, b) 400 mg Acetanhydrid, c) 200 mg Acetanhydrid und 200 mg Na₂CO₃ und d) 150 mg Acetanhydrid versetzt und zum Rückfluß (a–c) bzw. auf 100° (d) erhitzt. Nach beendeter Reaktion wird mit 1N-NaHCO₃ und H₂O gewaschen (a–c) und das Lösungsmittel i. Vak. abdestilliert (a–d).

2-(2-Hydroxy-2-phenylethoxy)-1-phenylethyl acetat (10)

Nach a) aus 258 mg **8** durch 5stdg. Erhitzen. Die Reinigung des Öls erfolgt durch Destillation bei 170°_{0.003}; Ausb. 280 mg (93%). C₁₈H₂₀O₄ (300.4) Ber. C 72.0 H 6.72 Gef. C 72.0 H 6.74. – IR (KBr):

1740 cm^{-1} (CO). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 2.10 (s; CH_3), 2.4–3.0 (OH), 3.58–3.87 (m; 2 CH_2), 4.70–4.97 (m; Ar-CH-O), 5.87–6.10 (m; Ar-CH-OCO), 7.28 (s; 10 H arom.). – MS (70 eV): m/e = 240 (3 % M^+ - CH_3COOH).

2,2'-Oxybis(1-phenylethyl acetat) (11)

Aus 300 mg **10** nach a) durch 45stdg. Erhitzen bzw. aus 258 mg **8** nach b) durch 50stdg. Erhitzen. Der Rückstand wird destillativ bei $160^\circ_{0.002}$ gereinigt. Schmp. 66–68°; Ausb. 310 mg (90 %). $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_5$ (342.4) Ber. C 70.2 H 6.48 Gef. C 70.5 H 6.66. – IR (KBr): 1735 cm^{-1} (CO). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 2.03 (s; 2 CH_3), 3.43–4.03 (m; 2 CH_2), 5.80–6.07 (m; 2CH), 7.23 (s; 10 H arom.). – MS (70 eV): m/e = 222 (6 % M^+ -2 CH_3COOH).

4-Acetyl-3,5-diphenylmorpholin (14)

Nach c) aus 239 mg **7** durch 15 stdg. Erhitzen. Der Rückstand wird der präp. DC mit Benzol/Ethylacetat (6+4) unterworfen. Rf = 0.17; Schmp. 130–131° (Ethanol); Ausb. 150 mg (53 %). $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{NO}_2$ (281.4) Ber. C 76.8 H 6.81 N 5.0 Gef. C 77.0 H 6.86 N 4.9 Mol.-Masse 281 (ms). – IR (KBr): 1640 cm^{-1} (CO). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 2.20 (s; CH_3), 3.97 und 4.57 (AB-Teil des ABM-Syst.; $J_{\text{AB}} = 12$ Hz, $J_{\text{AM}} = 2$ Hz, $J_{\text{BM}} = 4$ Hz, 2 CH_2), 5.30–5.53 (m, M-Teil des ABM-Syst.; 2 CH), 6.90–7.37 (m; 10 H arom.).

4-Acetyl-3-methyl-5-phenylmorpholin (20)

180 mg des bei **19** erhaltenen Rohprodukts werden nach c) 15 h rückfließend erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird unter den bei **19** beschriebenen Trennbedingungen der GC unterworfen. $R_t = 564$ sec. $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{NO}_2$ (219.3) Mol.-Masse 219 (ms). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 0.95 (d; $J = 7$ Hz, CH_3), 2.20 (s; CH_3CO), 3.60–3.90 (m; 2 CH_2), 3.97–4.17 (m; CH-C), 5.43–5.57 (m; CH-Ar), 7.20–7.47 (m; 5H arom.).

4-Acetyl-3,5-diphenyl-4H-1,4-oxazin (12)

Aus 235 mg **5** nach d) durch 11 stdg. Erhitzen. Das Rohprodukt wird mit Benzol/Ethylacetat (9+1) der präp. DC unterzogen. Rf = 0.47; Schmp. 125–126° (Methanol); Ausb. 170 mg (61 %). $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{NO}_2$ (277.3) Ber. C 78.0 H 5.45 N 5.1 Gef. C 77.9 H 5.56 N 5.1 Mol.-Masse 277 (ms). – IR (KBr): 1745 cm^{-1} (CO). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 2.27 (s; CH_3), 6.54 (d; $J = 3$ Hz, CH), 7.17–7.60 (m; 10 H arom. und CH). – $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 21.06 (CH_3), 101.75 (C olefin.), 123.90–135.48 (10 C arom. und 3 C olefin.), 169.42 (CON). – MS (80 eV): m/e = 277 (15 % M^+), 235 (100 % M^+ -Keten).

Reduktion mit LiAlH_4

100 mg **12** bzw. **14** in 10 ml absol. Ether werden zu einer Suspension von 40 mg LiAlH_4 in 5 ml absol. Ether getropft und 1 h zum Sieden erhitzt. Nach Zersetzen des LiAlH_4 -Überschusses mit H_2O wird vom Niederschlag abgesaugt und das Lösungsmittel abdestilliert.

4-Ethyl-3,5-diphenyl-4H-1,4-oxazin (13)

Aus **12** als Öl. Ausb. 60 mg (63 %). $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{NO}$ (263.3) Mol.-Masse 263 (ms). – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 1.20 (t; $J = 7$ Hz, CH_3), 3.48 (q; $J = 7$ Hz, CH_2), 6.14 (d; $J = 3$ Hz, CH), 7.03–7.87 (m; 10 H arom. und CH). – MS (70 eV): m/e = 263 (1 % M^+), 249 (10 % M^+ - CH_2), 235 (71 % M^+ - C_2H_4).

4-Ethyl-3,5-diphenylmorpholin (15)

Aus 14. Schmp. 52–55° (70proz. Ethanol); Ausb. 70 mg (74 %). $C_{18}H_{21}NO$ (267.4) Ber. C 80.9 H 7.92 N 5.2 Gef. C 80.7 H 7.89 N 5.2 Mol.-Masse 267 (ms). – 1H -NMR ($CDCl_3$): δ (ppm) = 0.63 (t; J=7 Hz, CH_3), 2.42 (q; J=7 Hz, CH_2), 3.37–4.00 (m; 2 $CH-CH_2$), 7.17–7.63 (10H arom.).

Literatur

6. Mitt.: H. Bartsch und O. Schwarz, Arch. Pharm. (Weinheim) 315, 545 (1982).
- Vorgetragen bei der Wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Pharmazeutischen Gesellschaft, Graz (Österreich), Mai 1981.
- J. Correia, J. Org. Chem. 38, 3433 (1973).
- H. Bartsch und G. Haubold, Monatsh. Chem., im Druck.
- R.J. Mayfield und P. Yates, Org. Prep. Proced. Int. 3, 201 (1971).
- L.P. Dmitrieva, N.P. Vasil'ev und A.S. Atavin, Khim. Atsetilena 1968, 244; C.A. 71, 61263a (1969).
- K. Skinnemoen und K. Undheim, Acta Chem. Scand. Ser. B 34, 295 (1980).
- H. Bartsch, W. Kropp und M. Pailer, Monatsh. Chem. 110, 257 (1979); ibid. 110, 267 (1979).

[Ph 484]

Arch. Pharm. (Weinheim) 315, 691–697 (1982)

Weitere Erkenntnisse über die Abbauprodukte der Valepotriate aus *Kentranthus ruber* (L.) DC*)****Georg Schneider* und Michael Willems****

Pharmakognostisches Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Georg-Voigt-Straße 16, 6 Frankfurt am Main 11
Eingegangen am 2. September 1981

Baldrinal (2), Desacylbaldrinal (4) und Valtroxal (3) sind chloroformlösliche Abbauprodukte des Valtrats (1). Die schwer wasserlöslichen Verbindungen sind in alkalischem und stark saurem Milieu instabil.

Die akute Toxizität (Maus, i.p.) der Abbauprodukte ist geringer als die von 1. Die Spontanmotilität (Maus, i.p.) wird gehemmt. Die sedierende Wirkung von 3 ist stärker und anhaltender als die von 2 und 4. Der durch Acetylcholin oder Histamin induzierte Spasmus beim isolierten Meerschweinchen-darm und der Blutdruck (Ratte) werden nicht beeinflusst.

Decomposition Products of the Valepotriates from *Kentranthus Ruber* (L.) DC

Baldrinal (2), deacylbaldrinal (4) and valtroxal (3) are decomposition products of valtrate (1). They are soluble in chloroform, difficult to dissolve in water and instable in alkaline and strongly acidic systems.

***) Herrn Prof. Dr. H. Oelschläger mit besten Wünschen zum 60. Geburtstag gewidmet.