Cyanamid als Seitenkettendienophil in der intramolekularen [4+2]-Cycloaddition mit 1,2,4,5-Tetrazinen⁺⁾

Gunther Seitz* und Xiao-guang Yang

Pharmazeutisch-Chemisches Institut der Philipps-Universität, Marbacher Weg 6, D-3550 Marburg/Lahn

Eingegangen am 21. August 1990

Wir erweitern die Anwendungsbreite der intramolekularen *Diels-Alder*-Reaktion von 1,2,4,5-Tetrazinen durch Einbeziehung von Cyanamid als Seitenkettendienophil und beschreiben Synthesewege zu neuen, anellierten Heterobicyclen wie 1,4-Oxazino-, 1,4-Thiazino- und Pyrazino[2,3-*c*]-1,2,4-triazinen **12a-d**, **17a** bzw. **22c,d**.

Cyanamide as Side-chain Dienophile in the Intramolecular [4+2]-Cycloaddition with 1,2,4,5-Tetrazines

Including cyanamide as side-chain dienophile we expand the scope of the intramolecular *Diels-Alder* reaction of 1,2,4,5-tetrazines and describe synthetic routes to novel fused heterobicycles such as 1,4-oxazino-, 1,4-thiazino- and pyrazino[2,3-*c*]-1,2,4-triazines **12a-d**, **17a,d**, and **22c,d**, respectively.

In einer Serie von Arbeiten¹⁻⁴⁾ konnten wir kürzlich zeigen, daß donor-substituierte Nitrile unter geeigneten Reaktionsbedingungen ausgeprägte Dienophilie gegenüber einer Vielzahl von akzeptorsubstituierten, cyclischen Azadien-Systemen wie 1,2,4,5-Tetrazinen oder 1,2,4-Triazinen aufweisen. Mit *N,N*-Dimethylcyanamid (**2**) als Dienophil entstehen in der *bimolekularen* [4+2]-Cycloaddition mit inversem Elektronenbedarf⁵⁾ aus 1,2,4,5-Tetrazinen aminsubstituierte Triazine **4**, mit dem Triazin **5** die unerwarteten Reaktionsprodukte **6a** und **6b**.

Die *intramolekulare* Variante dieser eleganten Synthesemethode⁶⁾ mit Cyanamid als Seitenkettendienophil wurde im Gegensatz zu der zuvor erwähnten *intermolekularen* *Diels-Alder*-Reaktion noch nicht untersucht. Wir beschreiben hier erstmals gangbare Wege zur Einführung von Cyanamid als Seitenkettendienophil in unterschiedlich substituierte Tetrazinsysteme **8a-c** sowie die *intramolekulare* *Diels-Alder*-Cycloaddition der resultierenden Reaktionsprodukte **10**, **15** und **20**.

Als Edukte zur Synthese von 1,4-Oxazin-anellierten Triazinen **12** (Schema 2) dienten die gut zugänglichen Tetrazine

8a-d⁷⁾, deren Methylsulfonyl- bzw. Brom-Substituent in 3-Position des Tetrazinsystems gute Abgangsgruppen darstellen. Diese werden bei nucleophilem Angriff des aus NaH und dem Aminoalkanol **7** generierten Alkanolat nach einem Additions-Eliminierungs-Mechanismus glatt gegen die aminsubstituierte Alkoxygruppe ausgetauscht. Die tertiären Amine **9a-d** können anschließend durch Umsetzung mit Bromcyan in Diethylether⁸⁾ zu den intensiv farbigen, mit dem gewünschten Seitenkettendienophil versehenen Tetrazinen **10a-d** umgewandelt werden. Diese besitzen eine zur Isolierung ausreichende Stabilität und können nach *sc* Reinigung in Ausbeuten zwischen 40-80% gewonnen werden. Beim Erhitzen in Diphenylether reagieren sie im Sinne einer intramolekularen [4+2]-Cycloaddition, trotz der die Reaktivität mindernden Donorsubstituenten in 1,4-Position des Diazadiensystems (entspricht der 3,6-Stellung im Tetrazin) von z.B. **10a** und **10b**. Dieser Effekt wird offensichtlich durch den für die intramolekulare Variante der *Diels-Alder*-Reaktion typische "entropische Hilfestellung"⁹⁾ überkom-

⁺⁾ Herrn Prof. Dr. Klaus Hartke mit den besten Wünschen zum 60. Geburtstag gewidmet.

pensiert und damit die Bildung der Cycloaddukte **11a-d** entscheidend gefördert. Die thermisch instabilen Heterotricyclen **11** sind Pentazaabarelderivate und dürften durch eine hohe Winkelspannung ausgezeichnet sein; deswegen findet unter den angewendeten drastischen Reaktionsbedingungen rasch N_2 -Eliminierung statt. Eine Isolierung der Verbindungen **11** ist deswegen nicht möglich. Als Reaktionsprodukte entstehen bisher unbekannte 1,4-Oxazino[2,3-*e*]-1,2,4-triazine **12a-d** in brauchbaren Ausbeuten.

Zur Synthese der thiazinanellierten Triazine **17a,d** wurden die Tetrazine **8a,d** mit dem aus Salz **13** und NaH gewonnenen Thiolat in die tertiären Amine **14**¹⁰ übergeführt, deren Reaktion mit Bromcyan in Diethylether die entspr. Cyanamide **15a,d** liefert. Im Gegensatz zu den Cyanamiden **10** ist hier die das Dienophil tragende Seitenkette über eine Thioetherfunktion mit dem Diazadiensystem verknüpft. An-

schließendes Erhitzen in Diphenylether führt über die analog **11** instabilen tricyclischen *Diels-Alder*-Addukte **16a,d** nach N_2 -Eliminierung zu neuen 1,4-Thiazino[2,3-*e*]-1,2,4-triazinen **17a,d** (Schema 3).

Zur Gewinnung von Pyrazino[2,3-*e*]triazinen des Typs **22** wurden die 3-Brom-tetrazine **8c,d** mit dem dreifach methylierten Ethylendiamin **18** zu **19c,d**¹⁰ umgesetzt, die mit Bromcyan in THF zu den mit Cyanamid als Seitenketten-dienophil versehenen Tetrazinen **20c,d** reagieren. Die abschließende inverse, intramolekulare *Diels-Alder*-Reaktion zu den nicht isolierbaren Verbindungen **21a,d** mit nachfolgender [4+2]-Cycloreversion zu **22a,d** verläuft auch mit einer Aminfunktion als Bindeglied zwischen Diazadiensystem und Dienophil erfolgreich, wenn auch unter etwas drastischeren Reaktionsbedingungen wie Erhitzen in Diphenylether auf ca. 230°C (Schema 4).

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Experimenteller Teil

Allgemeine Vorschrift zur Einführung der Cyanamid-Seitenkette in die Tetrazine 8a-d

Eine aus 240 mg (8 mmol) NaH (80%) und 712 mg (8 mmol) 7 in 25 ml Toluol bereitete Aminoalkanolat-Lösung tropft man bei 0°C langsam in eine Lösung von 8 mmol 8a-d (bei 8c unter Kühlung mit Aceton/Trockeneis auf -70°C) und läßt 12 h bei Raumtemp. reagieren (bei 8c 1 h bei -10°C). Die Reaktionsmischung wird mit 20 ml Wasser versetzt, die wäßrige Phase zweimal mit je 20 ml Chloroform extrahiert, und die vereinigten organischen Phasen werden über Na₂SO₄ getrocknet. Das nach Entfernen des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt¹⁰ (rotes Pulver oder Öl) wird zur Ermittlung der Rohausbeute gewogen, in 20 ml Diethylether gelöst und bei 0°C mit dreifachem Überschuß an Bromcyan, gelöst in 10 ml Diethylether, versetzt und bis zu 22 h bei Raumtemp. gerührt. Nach Abtrennen eines zuweilen auftretenden Niederschlags wird das Lösungsmittel i. Vak. entfernt und der Rückstand über eine Kieselgelsäule (40 cm x 2,5 cm; Essigsäureethylester) filtriert. Der nach Entfernen des Lösungsmittels erhaltene Rückstand wird umkristallisiert.

N-Methyl-*N*-[2-(6-dimethylamino-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)oxyethyl]-cyanamid (10a)

Ausb. aus 612 mg (3 mmol) 8a 350 mg (52%) rote Plättchen vom Schmp. 99°C (Ethylacetat).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2210; 1570; 1480; 1370; 1330; 1020; 970; 950 cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 4.72-4.68 (t; 2H, OCH₂, ³J = 5.0 Hz), 3.57-3.53 (t; 2H, CH₂N, ³J = 5.0 Hz), 3.36 (s; 6H, N(CH₃)₂), 3.08 (s; 3H, CH₃).- ¹³C-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 163.1, 161.5, 111.1, 65.1 (OCH₂), 51.4 (CH₂N), 39.1 (N(CH₃)₂), 36.8 (N(CH₃)₂).- MS (70 eV): *m/z* (%) = 223 (45%, M⁺), 70 (100).- UV (CH₂Cl₂): λ max (lg ϵ) = 246 (4.25), 444 (2.76), 520 nm (2.68).- C₈H₁₅N₇O (223.2) Ber. C 43.0 H 5.81 N 43.9 Gef. C 43.1 H 5.81 N 44.0.

N-Methyl-*N*-[2-(6-morpholino-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)oxyethyl]-cyanamid (10b)

Ausb. aus 1.28 g (5 mmol) 8a 450 mg (34%) rote Kristalle vom Schmp. 125°C (Essigsäureethylester).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2860; 2220; 1590; 1470; 1445; 1325; 1250; 1120; 965; 950; 910 cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 4.73-4.69 (t; 2H, OCH₂, ³J = 5.4 Hz), 3.92-3.84 (m; 8H, Morpholin-H), 3.56-3.52 (t; 2H, CH₂-N, ³J = 5.4 Hz), 3.05 (s; 3H, NCH₃).- ¹³C-

NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 163.8, 161.6, 117.8, 66.2, 65.2, 51.5, 44.4, 39.7.- MS (70 eV): *m/z* = 265 (44%, M⁺), 112 (100).- UV (CH₂Cl₂): λ max (lg ϵ) = 248 (4.14), 423 (2.85), 525 nm (2.42).- C₁₀H₁₅N₇O₂ (265.3) Ber. C 45.3 H 5.7 N 37.0 Gef. C 45.5 H 5.7 N 36.7.

N-Methyl-*N*-[2-(6-methylthio-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)oxyethyl]-cyanamid (10c)

Ausb. aus 900 mg (4.4 mmol) 8c 200 mg (20%) rote Nadeln vom Schmp. 60°C (n-Hexan/Essigsäureethylester 1:1).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2210; 1476; 1385; 1340; 1200; 1020; 932; 906 cm⁻¹.- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 4.83-4.80 (t; 2H, OCH₂, ³J = 5.2 Hz), 3.65-3.63 (t; 2H, CH₂N, ³J = 5.2 Hz), 3.10 (s; 3H, NCH₃), 2.76 (s; 3H, SCH₃).- ¹³C-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 172.6, 165.6, 117.6, 66.2, 51.5, 39.8, 14.1.- MS (70 eV): *m/z* (%) = 226 (52%, M⁺), 115 (100).- UV (CH₂Cl₂): λ max (lg ϵ) = 254 (4.24), 392 (2.99), 523 nm (2.65).- C₇H₁₀N₄OS (226.26) Ber. C 37.2 H 4.45 N 37.1 S 14.2 Gef. C 37.2 H 4.34 N 37.4 S 14.2.

N-Methyl-*N*-[2-(6-phenyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)oxyethyl]-cyanamid (10d)

Ausb. aus 2.8 g (12 mmol) 8d 2.0 g (69%) rote Kristalle vom Schmp. 137°C (n-Hexan).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3070; 2920; 2210; 1600; 1480; 1420; 1350; 1180; 1060; 950; 920; 780; 700 cm⁻¹.- MS (eV): *m/z* (%) = 256 (31, M⁺), 103 (100).- ¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 8.52-8.48 (m; 2H, Aromaten-H), 7.52-7.56 (m; 3H, Aromaten-H), 4.91 (t; 2H, OCH₂, ³J = 5.4 Hz), 3.61 (t; 2H, CH₂N, ³J = 5.4 Hz), 3.08 (s; 3H, NCH₃).- ¹³C-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 166.3, 163.6, 132.1 (CH), 131.4, 129.5 (CH), 127.7 (CH), 117.6, 66.1 (CH₂), 51.6 (CH₂), 39.8 (CH₃).- UV (CH₂Cl₂): λ max (lg ϵ) = 260 (4.47), 345 (3.07), 532 nm (2.63).- C₁₂H₁₂N₆O (256.3) Ber. C 56.2 H 4.7 N 32.8 Gef. C 56.2 H 4.8 N 32.9.

Allgemeine Vorschrift zur Synthese der [1,4]-Oxazino[2,3-*e*]-1,2,4-triazine 12a-d

Eine Lösung von je 1 mmol der Cyanamide 10a-d in 20 ml trockenem Diphenylether wird mehrere h unter Argon erhitzt (10a: 5 h, ca. 220°C; 10b: 3 h, ca. 220°C; 10c: 4 h, 210°C; 10d: 1 h, 200°C). Nach dem Erkalten werden Lösungsmittel und Produkt an Kieselgel (Säule 40 cm x 2.5 cm) getrennt: Zunächst wird mit n-Hexan der Diphenylether, anschließend Produkt 12 eluiert: 12a mit Dichlormethan/Methanol 9:1; 12b mit Essigsäureethylester/THF 7:3; 12c mit Essigsäureethylester/THF 9:1; 12d mit Essigsäureethylester/n-Hexan 1:1.

6,7-Dihydro-3-dimethylamino-5-methyl-[1,4]oxazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (12a)

Ausb. aus 406 mg (1.82 mmol) **10a** 320 mg (91%) beige Kristallnadeln vom Schmp. 117°C (Essigsäureethylester/Hexan 1:1).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2890; 1595; 1550; 1500; 1420; 1370; 1220; 1130; 1110; 1060; 1030; 1010; 930; 905; 860; 780; 746; 725 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 4.32-4.39 (t; 2H, OCH_2 , 3J = 5.2 Hz), 3.54-3.51 (t; 2H, CH_2N , 3J = 5.2 Hz), 3.15 (s; 3H, NCH_3), 3.12 (s; 6H, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 159.5, 146.5, 145.6, 63.3, 47.5, 37.3, 34.1.- MS (70 eV): m/z = 195 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 248 (4.05), 336 nm (3.52).- $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_5\text{O}$ (195.2) Ber. C 49.2 H 6.71 N 35.9 Gef. C 49.3 H 6.74 N 35.9.

6,7-Dihydro-5-methyl-3-morpholino-[1,4]oxazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (12b)

Ausb. aus 265 mg (1 mmol) **10b** 220 mg (93%) farblose Kristalle vom Schmp. 132°C.- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2960; 2860; 1600; 1520; 1440; 1365; 1300; 1270; 1245; 1150; 1120; 1000; 915; 865; 780 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 4.66-4.62 (t; 2H, OCH_2 , 3J = 5.2 Hz), 3.82-3.68 (m; 8H, Morpholin-H), 3.57-3.53 (t; 2H, CH_2N , 3J = 5.2 Hz), 3.18 (s; 3H, NCH_3).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 159.0, 147.4, 145.8, 66.7, 63.5, 47.5, 44.8, 34.3.- MS (70 eV): m/z = 237 (92%, M^+), 180 (100).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 248 (4.07), 330 nm (3.51).- $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_2$ (237.3) Ber. C 50.6 H 6.4 N 29.5 Gef. C 50.6 H 6.4 N 29.4.

6,7-Dihydro-5-methyl-3-methylthio-[1,4]oxazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (12c)

Ausb. aus 200 mg (0.9 mmol) **10c** 80 mg (42%) beige Kristalle vom Schmp. 167°C (Essigsäureethylester).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920, 2860, 1586, 1512, 1410, 1392, 1370, 1285, 1220, 1200, 1120, 1110, 960, 905, 780 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 4.40 (t; 2H, OCH_2 , 3J = 4.8 Hz), 3.60 (t; 2H, CH_2N , 3J = 4.8 Hz), 3.19 (s; 3H, NCH_3), 2.56 (s; 3H, SCH_3).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 166.1, 150.2, 144.4, 63.5, 47.5, 35.4, 14.5.- MS (70 eV): m/z = 198 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 244 (3.93), 314 nm (3.57).- $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_4\text{OS}$ (198.2) Ber. C 42.4 H 5.1 N 28.3 S 16.2 Gef. C 42.1 H 5.0 N 28.2 S 15.7.

6,7-Dihydro-5-methyl-3-phenyl-[1,4]oxazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (12d)

Ausb. aus 307 mg (1.2 mmol) **10d** 95 mg (30%) beige Kristalle vom Schmp. 157°C (Essigsäureethylester).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3060; 2992; 2920; 1590; 1510; 1450; 1403; 1370; 1335; 1270; 1225; 1150; 1100; 770; 705; 655 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 8.45-8.35 (m; 2H, Aromaten-H), 7.53-7.44 (m; 3H, Aromaten-H), 4.47 (t; 2H, OCH_2 , 3J = 4.8 Hz), 3.68 (t; 2H, NCH_2 , 3J = 4.8 Hz), 3.30 (s; 3H, NCH_3).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 158.9, 151.8, 145.7, 135.9, 130.1, 128.3, 127.6, 63.7, 47.2, 34.4.- MS (70 eV): m/z = 228 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 242 (4.31), 274 (3.87), 310 nm (3.83).- $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}$ (228.26) Ber. C 63.1 H 5.3 N 24.5 Gef. C 63.1 H 5.3 N 24.5.

N-Methyl-N-[2-(6-dimethylamino-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)thioethyl]-cyanamid (15a)

Eine Suspension von 840 mg (14 mmol) NaH (80 proz.) in 20 ml trockenem Toluol läßt man mit 1.1 g (7 mmol) 2-Dimethylaminoethanol-thiolhydrochlorid bis zur Beendigung der Gasentwicklung bei Raumtemp. reagieren. Nach Zugabe einer Lösung von 710 mg (3.5 mmol) **8a** in 15 ml Toluol läßt man 6 h bei Raumtemp. unter Rühren reagieren. Die Lösung wird mit 20 ml Wasser versetzt, die wäßrige Phase zweimal mit je 20 ml Toluol extrahiert, die org. Phase über Na_2SO_4 getrocknet und das Lösungsmittel i. Vak. entfernt. Das Rohprodukt (600 mg, 3.1 mmol, 75%) wird ohne Charakterisierung in 20 ml trockenem Ether gelöst, mit einer Lösung von 910 mg (9 mmol) Bromcyan in 10 ml Ether versetzt und 4.5 h bei Raumtemp. gerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit Ether gewaschen, und die

vereinigten Filtrate werden i. Vak. eingengt. Der kristalline Rückstand wird an Kieselgel (Säule 40 cm x 2.5 cm; Ethylacetat) gereinigt. Ausb. 206 mg (24%) rotes Pulver vom Schmp. 80°C (Essigsäureethylester).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2210; 1590; 1560; 1425; 1232; 1065; 1040; 836; 805 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 3.46-3.43 (t; 2H, SCH_2 , 3J = 7 Hz), 3.34 (s; 3H, NCH_3), 2.96-2.93 (t; 2H, CH_2N , 3J = 7 Hz), 2.98 (s; 3H, NCH_3), 2.94 (s; 3H, NCH_3).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 163.4, 160.4, 117.8, 51.5, 39.1, 36.7, 35.4, 27.8.- MS (70 eV): m/z = 239 (25%, M^+), 69 (100).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 275 (4.03), 455 (2.75), 510 nm (2.52).- $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_7\text{S}$ (239.3) Ber. 239.0953 Gef. 239.0949 (MS). Wegen Zersetlichkeit konnte keine stimmende Elementaranalyse erhalten werden.

6,7-Dihydro-3-dimethylamino-5-methyl-[1,4]thiazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (17a)

Eine Lösung von 200 mg (0.83 mmol) **15a** in 20 ml Diphenylether wird 4 h unter Argon auf 220°C erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Rohprodukt an Kieselgel (Säule 40 cm x 2.5 cm) getrennt. 1) n-Hexan eluiert Diphenylether, 2) Ethylacetat/THF 9:1 eluiert das Reaktionsprodukt.- Ausb. 145 mg (82%); Schmp. 102°C (n-Hexan).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2860; 1567; 1533; 1400; 1355; 1205; 1100; 900; 780 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 3.78-3.75 (t; 2H, SCH_2 , 3J = 5.1 Hz), 3.17 (s; 3H, NCH_3), 3.14 (s; 6H, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$), 3.08-3.05 (t; 2H, CH_2N , 3J = 5.1 Hz).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 159.9, 150.2, 134.4, 51.0, 36.7, 36.1, 24.1.- MS (70 eV): m/z = 211 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 270 (3.98), 353 nm (2.66).- $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_5\text{S}$ (211.3) Ber. C 45.5 H 6.20 N 33.1 S 15.2 Gef. C 45.3 H 6.12 N 33.1 S 15.1.

N-Methyl-N-[2-(6-phenyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)thioethyl]-cyanamid (15d)

Eine Suspension von 600 mg (25 mmol) NaH (80%) in 30 ml trockenem Toluol läßt man mit 1.6 g (12 mmol) 2-Dimethylamino-ethanthiohydrochlorid bis zur Beendigung der Gasentwicklung bei Raumtemp. reagieren. Nach Zugabe einer Lösung von 1.42 g (6 mmol) **8d** in 20 ml Toluol wird 5 d bei Raumtemp. gerührt, Wasser (10 ml) zugefügt, die wäßrige Phase zweimal mit je 20 ml Toluol ausgeschüttelt, und die vereinigten org. Phasen werden über Na_2SO_4 getrocknet. Nach Entfernen des Lösungsmittels i. Vak. erhält man 1 g (64%, 4 mmol) rotes, öliges Rohprodukt, das ohne Charakterisierung in 30 ml trockenem THF gelöst und mit einer Lösung von 1.05 g (10 mmol) Bromcyan in 20 ml THF 3 h bei Raumtemp. gerührt wird. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit THF gewaschen und das nach Einengen der Filtrate erhaltene Rohprodukt an Kieselgel (Säule 40 cm x 2.5 cm; Chloroform) gereinigt. Ausb. 650 mg (40%) rote Kristalle vom Schmp. 95°C (Hexan/Ethylacetat 1:1).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3110; 2205; 1600; 1550; 1350; 1195; 1060; 1040; 900; 760; 700 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 8.58-8.49 (m; 2H, Aromaten-H), 7.63-7.56 (m; 3H, Aromaten-H), 3.63-3.59 (t; 2H, SCH_2 , 3J = 6.9 Hz), 3.51-3.47 (t; 2H, CH_2N , 3J = 6.9 Hz), 3.01 (s; 3H, NCH_3).- $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 173.9, 162.9, 132.8, 131.3, 129.3, 127.8, 117.6, 51.8, 39.3, 27.8.- MS (70 eV): m/z = 272 (16%, M^+), 103 (100).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 290 (4.47), 377 (2.90), 530 nm (2.39).- $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{S}$ (272.3) Ber. C 52.9 H 4.4 N 30.9 S 11.8 Gef. C 52.9 H 4.4 N 30.9 S 11.8.

6,7-Dihydro-5-methyl-3-phenyl-[1,4]thiazino[2,3-e]-1,2,4-triazin (17d)

Eine Lösung von 408 mg (1.5 mmol) **15d** in 15 ml Diphenylether wird 3 h unter Argon auf 190-210°C erhitzt. Nach dem Erkalten erfolgt wie unter **17a** beschrieben die Trennung des Lösungsmittels vom Produkt (Fließmittel: 1. n-Hexan, 2. Dichlormethan/Ethylacetat 1:1). Ausb. 100 mg (27%); Schmp. 165°C (Hexan/Ethylacetat 1:1).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3060; 2920; 1540; 1498; 1470; 1425; 1405; 1390; 1350; 1270; 1230; 1165; 1125; 1050; 1040; 910; 760; 700 cm^{-1} .- $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 8.41-8.36 (m; 2H, Aromaten-H), 7.48-7.44 (m; 3H, Aromaten-H), 3.85-3.82 (t; 2H, SCH_2 , 3J = 5.1 Hz), 3.29 (s; 3H, NCH_3), 3.19-3.17 (t; 2H, CH_2N , 3J = 5.1 Hz).-

^{13}C -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 159.4, 150.3, 145.7, 135.9, 130.6, 128.6, 127.9, 50.6, 36.4, 24.1.- MS (70 eV): m/z = 244 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 248 (4.44), 335 nm (3.99).- $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{S}$ (244.3) Ber. C 59.0 H 4.9 N 22.9 S 13.1 Gef. C 58.8 H 4.7 N 22.9 S 12.9.

N-Methyl-[2-(6-methylthio-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)methylaminoethyl]-cyanamid (20c)

Eine Lösung von 1.5 g (7.5 mmol) 8c in 30 ml trockenem Toluol erhitzt man mit 1.63 g (15 mmol) *N,N,N'*-Trimethylethylendiamin (18) in 10 ml Toluol 2 h auf 80°C. Das nach Entfernen des Lösungsmittels i.Vak. erhaltene Rohprodukt, 1.48 g (6.5 mmol) 19, wird ohne Charakterisierung in 30 ml THF gelöst, tropfenweise mit einer Lösung von 1.5 g (15 mmol) Bromcyan in 10 ml THF versetzt und 3 h bei Raumtemp. gerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit THF gewaschen und das Filtrat eingeeengt. Nach Entfernen des Lösungsmittels wird der Rückstand analog 15a sc aufgearbeitet (Fließmittel n-Hexan/Ethylacetat 2:8). Ausb. 1.4 g (78%) rote Kristalle vom Schmp. 61°C (n-Hexan/Ethylacetat 1:1).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2920; 2205; 1545; 1405; 1350; 1275; 1210; 1105; 1040; 980; 925; 795 cm^{-1} .- ^1H -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 4.02-3.99 (t; 2H, CH_2 , 3J = 6.2 Hz), 3.41 (s; 3H, NCH_3), 3.39-3.36 (t; 2H, CH_2 , 3J = 6.3 Hz), 2.96 (s; 3H, NCH_3), 2.68 (s; 3H, SCH_3).- ^{13}C -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 166.4, 160.3, 118.1, 50.3, 46.8, 39.2, 35.8, 13.7.- MS (70 eV): m/z = 239 (41%, M^+), 69 (100).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 278 (4.38), 450 (2.85), 515 nm (2.74).- $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_7\text{S}$ (239.3) Ber. C 40.1 H 5.5 N 41.0 S 13.4 Gef. C 40.1 H 5.3 N 40.8 S 13.4.

5,8-Dimethyl-3-methylthio-5,6,7,8-tetrahydropyrazino[2,3-*e*]1,2,4-triazin (22c)

Eine Lösung von 956 mg (4 mmol) 20c in 20 ml Diphenylether wird unter Argon 12 h bei 220-240°C erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Reaktionsmischung analog 17a sc aufgetrennt (Fließmittel: 1. n-Hexan, 2. Ethylacetat/THF 9:1) Ausb. 180 mg (21%) gelbe Kristalle; Schmp. 121°C (n-Hexan/Ethylacetat).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 2910; 2845; 1580; 1530; 1500; 1400; 1385; 1215; 1200; 955 cm^{-1} .- ^1H -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 4.70-4.86 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.1 Hz), 3.54-3.51 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.1 Hz), 3.35 (s; 6H, zwei NCH_3), 3.04 (s; 3H, SCH_3).- ^{13}C -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 161.1, 145.5, 145.4, 47.3, 46.2, 36.5, 35.3, 14.1.- MS (70 eV): m/z = 211 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 258 (4.08), 328 nm (3.71).- $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_5\text{S}$ (211.3) Ber. C 45.5 H 6.2 N 33.1 S 15.2 Gef. C 45.5 H 6.0 N 32.9 S 15.1.

N-Methyl-[2-(6-phenyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)methylaminoethyl]cyanamid (20d)

Eine Lösung von 1.65 g (7 mmol) 8d in 20 ml trockenem Toluol versetzt man mit 1.2 g (12 mmol) *N,N,N'*-Trimethylethylendiamin (18) und rührt 3.5 h bei Raumtemp. Danach gibt man 40 ml Wasser zur Reaktionsmischung, schüttelt die wäßrige Phase zweimal mit je 20 ml Dichlormethan aus und trocknet die vereinigten org. Phasen über Na_2SO_4 . Das nach Entfernen des Lösungsmittels i.Vak. erhaltene Rohprodukt *N*-Methyl-*N*-(2-dimethylaminoethyl)amino-6-phenyl-1,2,4,5-tetrazin (19d) (1.5 g, 81%, 6 mmol, rotes Öl) wird ohne Charakterisierung in 30 ml trockenem Ether gelöst, tropfenweise mit einer Lösung von 1.05 g (10 mmol) Bromcyan in 10 ml Ether versetzt und 15 h bei Raumtemp. gerührt. Der Niederschlag

wird abfiltriert, mit wenig Ether gewaschen und das Filtrat eingeeengt. Der nach Entfernen des Lösungsmittels erhaltene Rückstand wird analog 15a sc gereinigt (Ethylacetat/n-Hexan 7:3). Ausb. 1.45 g (79%) rote Kristalle; Schmp. 124°C (Ethylacetat).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3070; 2980; 2210; 1560; 1440; 1423; 1359; 1246; 1125; 1063; 1040; 975; 960; 766; 700 cm^{-1} .- ^1H -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 8.42-8.38 (m; 2H, Aromaten-H), 7.56-7.50 (m; 3H, Aromaten-H), 4.10-4.05 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.3 Hz), 3.48 (s; 3H, NCH_3), 3.40-3.35 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.4 Hz), 2.97 (s; 3H, NCH_3).- ^{13}C -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 160.6, 159.4, 132.5, 130.7, 129.1, 128.9, 126.2, 126.1, 50.3, 46.9, 39.2, 36.0.- MS (70 eV): m/z = 269 (6%, M^+), 69 (100).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 292 (4.45), 407 (3.06), 538 nm (2.50).- $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{N}_7$ (269.3) Ber. C 58.0 H 5.6 N 36.4 Gef. C 57.9 H 5.6 N 36.4.

5,8-Dimethyl-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazino[2,3-*e*]1,2,4-triazin (22d)

Eine Lösung von 700 mg (4 mmol) 20d in 15 ml Diphenylether wird unter Argon 6 h auf 230°C erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Reaktionsmischung analog 17a aufgearbeitet (Fließmittel: 1. n-Hexan, 2. Ethylacetat/Methanol 98:2). Ausb. 250 mg (40%) beige Nadeln; Schmp. 144°C (Ethylacetat).- IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3060; 2930; 2858; 1585; 1545; 1512; 1410; 1385; 1352; 770; 700 cm^{-1} .- ^1H -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 8.38-8.34 (m; 2H, Aromaten-H), 7.45-7.36 (m; 3H, Aromaten-H), 3.61-3.57 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.8 Hz), 3.46-3.43 (t; 2H, CH_2 , 3J = 5.8 Hz), 3.24 (s; 3H, NCH_3), 3.17 (s; 3H, NCH_3).- ^{13}C -NMR (CDCl_3): δ (ppm) = 155.0, 145.9, 145.8, 136.8, 129.3, 128.8, 128.2, 126.9, 47.0, 46.1, 36.2, 34.9.- MS (70 eV): m/z = 241 (100%, M^+).- UV (CH_2Cl_2): λ max (lg ϵ) = 238 (4.35), 306 nm (4.08).- $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{N}_5$ (241.3) Ber. C 64.7 H 6.3 N 29.0 Gef. C 64.5 H 6.3 N 29.1.

Literatur

- G. Seitz und W. Overheu, *Chemiker-Ztg.* 103, 230 (1979).
- G. Seitz und R. Mohr, *Chemiker-Ztg.* 109, 348 (1985).
- G. Seitz und H. Waßmuth, *Chemiker-Ztg.* 112, 281 (1988).
- G. Seitz und R. John, *Chem. Ber.* 122, 1381 (1989).
- Neuere Zusammenfassungen: D.L. Boger, *Tetrahedron* 39, 2869 (1983) und *Chem. Rev.* 86, 781 (1986); D.L. Boger und S.M. Weinreb, *Hetero Diels-Alder Methodology in Organic Synthesis*, S. 335, Academic Press, Inc., New York 1987; E.C. Taylor, *Bull. Soc. Chim. Belg.* 97, 599 (1988) sowie die Serie inverser intramolekularer [4+2]-Cycloadditionen wie z.B. D.A. DeBie, A. Ostrowicz, G. Geurtsen, und H.C. van der Plas, *Tetrahedron* 44, 2977 (1988) und dort zit. Lit.
- G. Seitz und J. Richter, *Chem. Ber.* 122, 2177 (1989).
- L. Görgе, Dissertation, Marburg 1986 sowie A. Mangia, F. Bortesi und U. Amendola, *J. Heterocycl. Chem.* 14, 587 (1977) und V.A. Ershov und I.Ya. Postovskii, *Khim. Geterosikl. Soedin* 4, 571 (1971); *C.A.* 76, 25252r (1972).
- J.v. Braun, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* 33, 1438 (1900).
- E. Ciganek und R.M. Joyce, *Organic Reactions*, Vol. 32, S. 1 ff., Wiley, New York 1984.
- Um Ausbeuteverluste bei der aufwendigen Reinigung der in der Regel als rote Öle anfallenden tert. Amine 9, 14 und 19 zu vermeiden, wurden die Verbindungen ohne nähere Charakterisierung als Rohprodukte weiter umgesetzt. [Ph857]