TRANSFORMATIONS THERMIQUES DES PHOTOOXYDES MÉSO DES ACÈNES—V

INFLUENCE DES PHÉNYLES EN MÉSO EN SÉRIE NAPHTACÉNIQUE

J. RIGAUDY et D. SPARFEL.

Laboratoire de Recherches Organiques de l'E.S.P.C.I. et de l'Université Pierre et Marie Curie (E.R.A. No. 170),
10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05, France

(Received in France 14 October 1977; Received in the UK for publication 24 January 1978)

Résumé—L'influence des substituants phényles en *méso* sur l'évolution thermique des endoperoxydes naphtacéniques est illustrée par la disparité des isomérisations que subissent, par thermolyse au reflux de solvants divers, les deux photooxydes isomères, 1d (en 5-12) et 1e (en 6-11), issus du diphenyl-5,12 naphtacène 2d. Alors que 1d, qui se dissocie en outre dans une proportion notable, fournit uniquement le diéther cyclobuténique 4d, le photooxyde 1e conduit à l'acétal bicyclique 12, accompagné d'un dimère, de structure 18. Les intermédiaires primaires de ces transformations sont des diépoxydes instables, plus ou moins aptes à s'ouvrir en diéthers *o*-quinodiméthaniques, ainsi que le montre la capture de 6d, de 11, et celle de 16, sous forme d'adduits 9d, 13 et 14, lorsqu'on opère en présence de *N*-méthylmaléimide. Les différences observées s'interprètent par l'effet des phényles sur les étapes successives de ce processus d'isomérisation, étudié précédemment en série anthracénique et naphtacénique simple. On décrit les dégradations chimiques et discute les données spectroscopiques qui établissent les structures des divers composés nouveaux.

Abstract—The influence of *meso*-phenylsubstituents on the thermal behaviour of naphthacenic endoperoxides is illustrated by the disparity of isomerizations which undergo, under thermolysis at reflux temperatures in various solvents, the two isomeric photooxides, 1d (5-12) and 1e (6-11), afforded by 5,12-diphenylnaphthacene 2d. Whereas 1d, which dissociates also to an appreciable extent, gives only the cyclobutenic diether 4d, 1e leads to a bicyclic acetal, 12, accompanied by a dimer, 18. The primary intermediates of these transformations are unstable diepoxides apt to open more or less easily into *o*-quinodimethanic diethers, as is shown by the trapping of 6d, 11 and also 16, as adducts 9d, 13 and 14, when one carries out the thermolysis in the presence of *N*-methylmaleimide. The established discrepancies are explained by the effect of phenyl groups on the successive steps of this isomerization process, which has been described before for anthracenic and unsubstituted naphthacenic photooxides. Chemical degradations along with spectral data, which prove the structures of the new compounds, are presented.

Il est maintenant bien établi que la nature des groupes situés en *méso* exerce une influence déterminante sur le cours de l'évolution thermique des photooxydes anthracéniques. Les deux cas extrêmes sont ceux du photooxyde 1b du diphenyl-9,10 anthracène, qui subit quasi-intégralement la dissociation rétrodiénique,^{1a,b} et du photooxyde d'anthracène 1a, où intervient presque exclusivement l'homolyse de la liaison peroxydique. Celle-ci conduit au diradical oxygéné 5a qui peut alors se fragmenter en anthraquinone ou se cycliser en un *méso* diépoxyde instable 6a lequel s'ouvre ensuite en diéther *o*-quinodiméthanique 7a; ce dernier donne naissance, selon les conditions, à des dimères ou au produit de cyclisation intramoléculaire, le diéther benzocyclobuténique 4a, qui sont effectivement isolés.^{2a,b,c,d}

Une même influence des phényles se retrouve au moins qualitativement en série naphtacénique, où il est connu que le photooxyde de rubrène (tétraphényl-5,6,11,12 naphtacène), à l'opposé de celui du naphtacène 1c, se dissocie par chauffage dans une proportion d'environ 80%.^{1b,3} En outre, nous avons montré antérieurement⁴ que l'isomérisation thermique du photooxyde 1e se distingue de celle de 1a par deux caractéristiques:

Une régio-spécificité de la première étape. La cyclisation du diradical oxygéné 5e ne s'effectue que sur le benzo latéral, fournissant comme seul intermédiaire le

méso-diépoxyde 6c, qu'on pouvait piéger sous forme d'adduit 9c, et

Une déviation du réarrangement dans la seconde étape. L'évolution ultérieure de 6c aboutit essentiellement à l'acétal bicyclique 3c tandis que le diéther naphtocyclobuténique 4c ne se forme plus qu'en très faible proportion. Il faut d'ailleurs noter que ce second type d'isomérisation apparaît aussi accessoirement, en concurrence avec le premier, chez certains photooxydes d'anthracènes substitués.^{2a,b}

Si le caractère dihydronaphtacénique du squelette du photooxyde entraînait ainsi des divergences, il était probable qu'une substitution partielle par des phényles en *méso* ne manquerait pas d'influer également sur l'orientation des transformations dans cette série, sans promouvoir une large dissociation susceptible de contrecarrer leur étude comme chez le photooxyde de rubrène. Le diphenyl-5,12 naphtacène 2d, qui, ainsi que nous l'avons montré récemment,⁶ fournit les deux photooxydes isomères, en 5-12,1d, et en 6-11,1e, offrait un moyen aisé de le vérifier. Nous avons par suite étendu nos essais à ces deux photooxydes.

Comme précédemment les thermolyses ont été effectuées au reflux de solvants aromatiques de points d'ébullition variés; les mélanges résultants étaient résolus par CCM sur silice. Les transformations étant très lentes

Fig. 1.

Tableau 1.

Solvants (Eb, °C)	Durée du Δ (en heures)	Rendements en composés isolés			
		1d	2d	4d	Bilan
Benzène (80°C)	7	80	2	3	85
Chlorobenzène (132°C)	7	-	30	50	80
Ethylbenzène (136°C)	7	-	36	44	80
<i>o</i> -Dichlorobenzène (180°C)	0,7	-	30	32	62
Vératrole (206°C)	0,1	-	35	15	50

Pourcentage des produits isolés par CCM après reflux du photooxyde 1d dans le solvant indiqué dans la première colonne. La durée du chauffage est celle nécessaire pour transformer intégralement le photooxyde (excepté dans le cas du benzène).

Tableau 2.

NMM (moles)	Rendements en composés isolés				Bilan
	2d	4d	8d	9d	
0	30	50	-	-	80
12	-	-	32	52	84

Pourcentages des composés isolés par CCM après reflux du photooxyde 1d dans le chlorobenzène en présence de NMM.

dans le benzène, il était avantageux, dans un but préparatif, d'opérer au reflux du chlorobenzène qui conduit aux meilleurs bilans.

Thermolyses du photooxyde en 5-12,1d

Il est clair que ce photooxyde subit simultanément, à température élevée, les deux types généraux d'évolution constatés en série anthracénique car, à l'issue des thermolyses, on séparait toujours deux composés: du diphényl-5,12 naphtacène régénéré 2d et un produit d'isomérisation unique, le diéther naphtocyclobuténique diphénylé 4d. Les résultats des essais, rassemblés au Tableau 1, montrent en outre que si le pourcentage de dissociation reste sensiblement constant, et voisin de 35%, dès qu'on atteint une température suffisante pour décomposer le photooxyde, les rendements en diéther 4d s'amenuisent dans les solvants à haut point d'ébullition du fait d'une dégradation ultérieure de ce composé.

La répartition d'une dissociation rétrodiénique notable, mais moins importante que chez les photooxydes de diphényl-9,10 anthracène ou de rubrène, n'était pas inattendue; elle tient là aussi au supplément de stabilité qu'apportent les phényles au système aromatique restauré et qui abaisse l'énergie d'activation du processus correspondant.⁷ La formation exclusive du diéther 4d dans l'isomérisation, qui constitue une différence significative avec le photooxyde non substitué 1c, appelait par contre une interprétation. Elle devait résulter d'une évolution préférentielle du diépoxyde 6d par ouverture concertée en diéther *o*-quinodiméthanique 7d suivie de la cyclisation en 4d.

Nous avons pu le vérifier en opérant, de même que dans nos études antérieures, en présence d'un philodiène

susceptible de capter les intermédiaires. Le chauffage du photooxyde 1d au reflux du chlorobenzène en présence d'un large excès de *N*-méthylmaléimide ne fournit plus les composés précédents mais conduit à deux adduits qu'on sépare par CCM: l'adduit du diphényl-5,12 naphtacène 8d que nous avons décrit auparavant⁶ et un adduit nouveau, 9d, résultant de la fixation du philodiène en 1-4 sur le diépoxyde 6d. Les rendements en produits isolés, indiqués au Tableau 2, montrent que ce dernier est majoritaire; on ne décelait pas par contre, comme en série anthracénique, d'adduit dérivant du diéther *o*-quinodiméthanique 7d. Cette confirmation du passage par le diépoxyde 6d au cours de l'isomérisation renforce l'idée que la différence avec le photooxyde non substitué intervient à ce stade; les phényles, stabilisant le système *o*-quinodiméthanique, favorisent l'ouverture électrocyclique du diépoxyde en diéther 7d aux dépens de la transformation concurrente en acétal bicyclique correspondant 3d, qui résulterait comme on peut le supposer de la rupture radicalaire initiale d'une liaison C-C dans le diépoxyde.

On conçoit également qu'ici les phényles soient défavorables à une capture du diéther *o*-quinodiméthanique 7d par le philodiène du fait de l'encombrement stérique qu'ils apportent tandis qu'ils ne peuvent qu'accélérer la cyclisation non concertée en 4d laquelle bénéficie en outre du rétablissement du système naphtalénique.

Thermolyses du photooxyde en 6-11,1e

Le comportement thermique de ce photooxyde devait se révéler proche de celui du photooxyde de naphtacène car le pont dioxygéné s'y trouve également fixé sur des

Fig. 2.

Tableau 3.

Solvants (Eb, °C)	Durée du Δ (en heures)	Rendements en composés isolés		
		12	18	Bilan
Toluène (110°C)	20	52	19	71
Chlorobenzène (132°C)	7	60	22	82
Ethylbenzène (136°C)	7	55	15	70
<i>o</i> -Dichlorobenzène (160°C)	2	52	21	73

Pourcentages des produits isolés par CCM après reflux du photooxyde **1e** dans le solvant indiqué dans la première colonne. La durée du chauffage est celle nécessaire pour transformer intégralement le photooxyde.

carbones *méso* porteurs d'hydrogène. En fait l'analogie n'est que partielle et l'on observe là également des différences notables.

Par chauffage à sec ou au reflux des solvants, ce photooxyde, qui ne se dissocie pas de manière appréciable, fournit deux composés nouveaux. L'un, toujours largement majoritaire, est l'acétal bicyclique 12, analogue diphenylé de celui qu'on obtient en série non substituée; l'autre s'est avéré être un dimère de l'endoperoxyde, dont la structure, 18, correspondait à celle du dimère stable [Dimère II selon^{2d}] qui se forme lors de la thermolyse du photooxyde d'anthracène dans les mêmes conditions. Les proportions en dimère 18, qui variaient légèrement selon les solvants utilisés (Tableau 3), demeuraient voisines de 20%, et, contrairement au cas du photooxyde d'anthracène, le dimère ne cédait pas la place au diéther cyclobuténique correspondant 17, lorsqu'on opérait par pyrolyse instantanée en solution diluée.^{2a,c} La nature des produits obtenus laissait présager qu'il intervenait dans ce cas une divergence avec la série simple dès la première étape de l'isomérisation, les deux diépoxydes isomères 11 et 15 devant se former simultanément, en proportions inégales avant d'évoluer à leur tour. La capture des intermédiaires étant là aussi susceptible de le confirmer, nous avons porté au reflux une solution chlorobenzénique de photooxyde **1e**, additionnée d'excès variables de *N*-méthylmaléimide (Tableau 4). On isolait toujours dans ces conditions, de l'acétal bicyclique 12 mais aussi deux adduits, l'adduit 13 dérivé du diépoxyde 11, et l'adduit 14 correspondant à la fixation de la *N*-méthylmaléimide sur le diéther *o*-quinodiméthanique 16. Des proportions de ces divers composés, consignées au Tableau 4, on peut déduire qu'une partie au moins de l'acétal 12 provient d'une

isomérisation ultérieure du diépoxyde 11, car l'ensemble de l'adduit 13 et de l'acétal restant correspond sensiblement au pourcentage d'acétal isolé en l'absence de philodiène. Toutefois, la persistance d'une fraction constante d'acétal 12 lorsqu'on accroît fortement la proportion molaire de *N*-méthylmaléimide suggère également la possibilité d'un passage direct du diradical oxygéné à 12. A rapprocher de cette observation était l'absence ici, dans toutes les conditions, de la quinone correspondante; la diphenyl-6,11 naphtacènequinone-5,12, alors que le photooxyde non substitué **1e** fournit toujours un pourcentage élevé de naphtacènequinone; cette différence pourrait être due à la présence de phényles en *méso* qui s'opposent à l'arrachement nécessaire des hydrogènes (*péri*) du diradical oxygéné correspondant. Une pluralité de mécanismes menant à l'acétal 12 n'est donc pas exclue, mais c'est un point que nous ne sommes pas en mesure de préciser pour l'instant.

Quant à l'adduit 14, qui ne peut provenir que de l'*o*-quinodiméthane 16, son obtention s'accorde avec la disparition du dimère 18, car ce dernier doit être issu de 16 par un processus de cyclo-addition analogue à celui qu'on a rencontré chez le photooxyde d'anthracène porté aux mêmes températures et qui semble propre aux diéthers *o*-quinodiméthaniques non substitués aux extrémités réactives du système conjugué. On pouvait en outre s'étonner que, dans le cas présent, le diépoxyde 15, précurseur de 16, échappe à la capture par le philodiène, toutefois la protection stérique apportée par les phényles en *méso* paraît en être la raison principale. On connaît en effet des *o*-quinodiméthanes de structures très voisines dans lesquels la présence de phényles identiquement placés entraîne une inhibition totale de l'addition diénique.⁸

Tableau 4.

NMH (moles)	Rendements en composés isolés				Bilan
	12	18	13	14	
0	60	22	-	-	82
4	22	-	43	28	93
12	23	-	41	32	96

Pourcentages des composés isolés par CCM après reflux du photooxyde **1e** dans le chlorobenzène avec des proportions variables de *N*-méthylmaléimide (NMH).

En conclusion, chez le photooxyde 1e, la différence essentielle avec la série non substituée est donc que la présence de phényles sur le noyau *méso* adjacent au cycle peroxydé, en stabilisant les structures dihydro-2,3 naphthaléniques, permet la formation concurrente du diépoxyde 15 et supprime ainsi la spécificité de la première étape de l'isomérisation. Elle favorise aussi apparemment le passage à l'acétal bicyclique 12, mode d'isomérisation qui apparaît prédominant en série naphthalénique lorsque le pont peroxyde est fixé sur des carbones porteurs d'hydrogène.

Établissement des structures des composés nouveaux

Les divers dérivés nouveaux mentionnés ci-dessus étant apparentés à ceux qu'on a précédemment décrits dans les autres séries, nous limitons à l'essentiel la discussion des preuves rassemblées à l'appui de leurs structures.

La diéther naphthocyclobuténique 4d. De même que chez l'analogue 4c,⁴ le spectre de RMN (¹H) traduit la symétrie de la molécule et décèle les quatre protons blindés du noyau benzénique dioxygéné qui apparaissent sous forme d'un singulet. Les substituants phényles, dont l'effet est sensible sur les protons situés en 6 et 11, influent également sur la scission acido-catalysée, qui se trouve facilitée ici, et s'accompagne d'une ouverture oxydante du cycle à 4 chaînons. Traité par BBr₃, le diéther 4d ne fournit pas, tel 4c, le dibromure correspondant 19, mais du dibenzoyl-2,3 naphthalène 20.

Ainsi que d'autres auteurs l'avaient constaté avec le diméthoxy-1,2 diphényl-1,2 naphtho[2,3-c] cyclobutène,⁹ l'action du brome à la température ambiante conduit également au dérivé dibenzoylé 20; de plus si on la prolonge durant plusieurs jours, jusqu'à disparition totale de 4d, et qu'on traite ensuite au diazométhane, on peut caractériser à côté de 20 du tétrabromovératrole 22, dérivé stable du tétrabromopyrocatechol 21, qui provient par polysubstitution du second motif de la molécule. Il faut ajouter qu'en raison de l'analogie avec les autres diéthers de ce type une configuration *cis* au point de jonction des deux motifs de 4d paraît très probable.

L'acétal bicyclique 12. Ici, le spectre de RMN (¹H) révèle une dissymétrie et un effet de blindage sélectif sur les protons du noyau benzo (H-2 et H-4), comparables à ceux qu'on trouvait pour l'acétal 3c. Un effet de blindage dû aux phényles en *péri* est en outre relevé pour H-6 et H-13 (voir Partie Expérimentale).

L'hydrolyse en milieu acide de 12 s'effectue aisément, mais doit s'accompagner d'une autoxydation spontanée puisqu'elle conduit directement à la lactone 25, qu'on a méthylée par le diazométhane en 26. Une synthèse de 26 a été ensuite réalisée, selon le même principe qu'en série simple, à partir de l'anhydride diphénylé 23. L'action modérée du magnésien de l'*o*-bromo-anisole sur 23 mène au céto-acide 27, lequel par réduction en milieu basique fort, suivie d'acidification, fournit la lactone 26.

Là encore pour obtenir majoritairement le céto-acide 27, il faut éviter l'excès de magnésien et le chauffage qui déterminent la formation majoritaire de la lactone diarylée 24. La meilleure préparation de 27 consiste d'ailleurs à traiter l'anhydride 23 par l'organo-cadmien correspondant à froid.

Comme son analogue non phénylé le céto-acide 27, d'après son spectre IR en KBr, doit se trouver à l'état solide sous forme lactol cyclique 29, mais conduit toutefois quantitativement au céto-ester 28 par action du diazométhane, ce qui assure sa structure.

Les adduits diépoxydiques 9d et 13. Passage à un adduit 1-4 du diphényl-5,12 naphthalène, 10d. Les caractéristiques spectrales et en particulier l'étroite analogie des données de RMN (¹H) entre ces deux adduits et l'adduit du diépoxyde anthracénique 9a^{2c} s'accordent avec les structures 9d et 13. De plus, une confirmation par voie chimique a pu être obtenue pour l'adduit 9d, qui seul se prête à la méthode de réduction habituellement employée: traité par le zinc en présence de NaI, 9d conduit à un adduit 10d du diphényl-5,12 naphthalène, isomère de celui qu'on obtient par addition directe de la *N*-méthyl-maléimide sur cet hydrocarbure.⁶ Ce nouvel adduit 10d se dissocie en régénérant l'hydrocarbure 2d lorsqu'on le chauffe à très haute température (500°).

Des valeurs des déplacements chimiques observés pour les adduits 9d, 13 et 10d, on peut déduire pour ce qui est des configurations stériques, des conclusions analogues à celles tirées dans les cas de 9a et 10a,^{2c} et de 9c et 10c.⁴ Ainsi le déblindage relatif des protons du *N*-CH₃ doit traduire une orientation *exo* du cycle maléimide, tandis que le fort déblindage des protons situés en α des CO, constaté en passant de 10d ($\delta = 3.05$ ppm) à 9d ($\delta = 3.63$ ppm) doit résulter de la proximité des deux ponts époxydes dans ce dernier cas (Fig. 4).

L'adduit 14 du diéther *o*-quinodiméthanique 16. La structure de cet adduit, qui s'accorde avec son spectre de RMN, a été confirmée, comme pour les analogues,^{2a,c,5b} par la scission qu'il subit en milieu basique du fait d'une double élimination. Traité par le méthylate de potassium dans le DMSO, il conduit en effet à l'imide naphthalénique 32 et au diphénol 30¹⁰ qu'on ne caractérise en proportion élevée qu'après passage au diéther méthylique 31. L'imide naphthalénique 32, qui n'était pas décrite, a été préparée en chauffant au reflux du xylène l'anhydride naphthalènedicarboxylique-2,3 avec la méthylamine.

Le dimère 18. Passage à un second dimère 34. En transposant à la présente série les résultats observés dans le cas du photooxyde d'anthracène,^{2d} on pouvait envisager *a priori* la formation successive, à partir du diéther *o*-quinodiméthanique intermédiaire 16, de trois dimères, 33, 18 et 34, correspondant respectivement aux dimères I, II et III selon.^{2d} On constate en fait que le spectre de RMN (¹H) du dimère isolé s'accorde bien avec la structure 18 car il traduit la présence, à côté des protons aromatiques, de 5 protons éthyléniques et de 3 protons tertiaires déblindés, et on n'y décèle pas le proton tertiaire à haut champ trouvé chez le dimère I et qu'on attendrait pour la structure 33. Une simulation sur ordinateur a d'ailleurs permis de calculer, pour le motif non aromatique, un spectre superposable au spectre expérimental (Fig. 5).

On peut remarquer par ailleurs que le dimère 18 se forme dans des conditions de thermolyse, et en particulier à des températures, très analogues à celles qui conduisent dans le cas du photooxyde d'anthracène au dimère II, de structure similaire.^{2a,c} Ce dernier dimère, à température nettement plus élevée (200°), ou sous l'action des acides,¹¹ se transformait partiellement en un dimère symétrique III. Ici, la pyrolyse à haute température n'aboutit qu'à une dégradation, mais un traitement de 18 par CF₃-CO₂H en milieu anhydre le transforme incomplètement en un produit cristallisé, très peu soluble et très peu fusible (> 500°), pour lequel on peut envisager la structure 34 sur la base de diverses données spectroscopiques. Les indices les plus nets proviennent du spectre de masse qui comporte, outre l'ion moléculaire

Fig. 3.

H situés sur positions	9d	13	10d	9c ⁴	10c ⁴
1-4	2,83 (m)	3,06 (m)	4,40 (m)	3,22 (m)	4,57 (m)
2-3	6,13 (q)	6,22 (q)	6,40 (q)	6,31 (q)	6,56 (q)
5-12	-	3,85 (s)	-	4,15 (s)	7,82 (s)
N-CH ₃	2,93 (s)	2,92 (s)	2,87 (s)	2,96 (s)	2,97 (s)
H en α des CO	3,63 (t)	3,58 (t)	3,05 (t)	3,64 (t)	3,10 (t)

Déplacements chimiques des divers protons dans CDCl₃ ($\delta_{TMS} = 0$) des adduits naphthacéniques en séries simple et diphenylée.

Fig. 4.

laire, des ions qui résultent de l'élimination de un et de deux motifs correspondant à la diphenyl-1,4 naphthoquinone-2,3. Il faut ajouter que la configuration stérique tête-queue est admise pour les dimères 18 et 34 par analogie avec les dimères anthracéniques pour lesquels elle a été déduite d'un spectre de rayons X.^{2d} Dans le cas présent, la présence de phényles en *méso* dans le diéther *o*-quinodiméthanique 16 ne peut d'ailleurs que défavoriser les dimérisations du type tête-tête.

PARTIE EXPERIMENTALE

Pour les types d'appareil utilisés, les conditions d'enregistrement et les techniques de chromatographie, voir ref. 6.

Les analyses élémentaires ont été réalisées au Laboratoire de Microanalyse de l'Université Paris VI. Tous les composés pour lesquels le mot *Analyse* est indiqué, suivi d'une formule explicite, ont fourni des résultats analytiques correspondant à la formule à $\pm 0,3\%$ au plus.

Thermolyse des photooxydes

Décomposition thermique du photooxyde 1d

(a) *En absence de N-méthylmaléimide.* On chauffe 0,15 g de photooxyde 1d au reflux du solvant (25 cm³) sous atmosphère d'azote pendant le temps indiqué au Tableau 1. Après élimination du solvant, le résidu est chromatographié (éluant: benzène-cyclohexane: 2-8) et on isole par ordre d'éluion: l'hydrocarbure 2d, $F_{\text{mél}} = 207-208^\circ\text{C}$ [$F_{\text{mél}} = 207-208^\circ\text{C}$ d'après¹²]; le diéther naphthocyclobuténique 4d, $F_{\text{mél}} = 220^\circ\text{C}$. Les rendements en produits isolés sont mentionnés au Tableau 1.

Diphényl-5a,11b dihydro-5a,11b [naphtho-2'-3'-3,4]cyclobuta[1,2-b]benzodioxanne-1,4. 4d. Cristaux incolores, $F_{\text{mél}} = 220^\circ\text{C}$ (cyclohexane). Analyse: C₂₀H₂₀O₂ (C, H, O). UV-visible (THF): λ_{max} nm (log ϵ): 322(3.31); 308(3.41); 278(3.86); 233(4.84). IR (KBr): $\nu = 1605, 1495$ et 1260 cm^{-1} . RMN (DMSO-D₆; HMDS): 4H (H₁-H₂-H₃-H₄,s) à $\delta = 6.73$; 2H (H₅-H₆,m) à $\delta = 7.40$; 2H (H₇-H₁₀,m) à $\delta = 7.85$; 2H (H₈-H₁₁,s) à $\delta = 7.95$; 10H (2 phényles en 5a et 11b,s) à $\delta = 7.10$.

(b) *En présence de N-méthylmaléimide.* Sous azote, on porte au reflux 450 mg de photooxyde 1d, 1,45 g de N-méthylmaléimide (12 fois la théorie) dans 25 cm³ de chlorobenzène anhydre pendant 7 h. Après concentration du solvant, on obtient un résidu cristallisé que l'on chromatographie (éluant: CH₂Cl₂). On recueille par ordre d'éluion: 171 mg d'adduit de l'hydrocarbure, 8d (Rdt = 32%), $F_{\text{décomp}} = 342-344^\circ\text{C}$ [$F = 342-344^\circ\text{C}$ d'après⁴]; 297 mg d'adduit diépoxydiéther 9d (Rdt = 52%), $F_{\text{mél}} = 346-348^\circ\text{C}$.

N - Methyl diépoxy - 4a,5; 12 - 12a diphenyl - 5,12 hexahydro-1,4,4a,5,12,12a éthano-1,4 naphthacénedicarboximide-13,14,9d. Cristaux incolores, $F_{\text{mél}} = 346-348^\circ\text{C}$ (THF). Analyse: C₃₃H₂₃NO₄ (C, H, N, O). UV-visible (éther): λ_{max} nm (log ϵ): 328(2.95); 320(2.87); 313(2.87); 297(3.55); 284(3.74); 275(3.75); 265(3.70); 257(3.66); 240(4.88); 235(4.85). IR (KBr): $\nu_{\text{C=O}} = 1785$ et 1710 cm^{-1} ; $\nu = 1430, 1380, 1300\text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; TMS): 2H (H₁-H₄,m) à $\delta = 2.83$; 3H (N-CH₃,s) à $\delta = 2.93$; 2H (H₁₁-H₁₄,t) à $\delta = 3.63$; 2H (H₂,H₃,q) à $\delta = 6.13$; 16H (aromatiques,m) à $\delta = 7.66$.

Décomposition thermique du photooxyde 1e

(a) *En absence de N-méthylmaléimide.* On chauffe 0,17 g de photooxyde 1e au reflux du solvant (25 cm³) sous atmosphère d'azote pendant le temps indiqué au Tableau 3. Après évaporation du solvant le résidu est chromatographié (éluant: benzène-cyclohexane: 7-3) et on isole par ordre d'éluion: l'acétal bicyclique 12, $F_{\text{mél}} = 184^\circ\text{C}$; le dimère 18, $F_{\text{mél}} = 243-245^\circ\text{C}$. Les rendements en produits isolés sont mentionnés au Tableau 3.

Epoxy-6,13 diphenyl-7,12 dihydro-6,13 benzob[naphtho[2,3-e]oxépine 12. Cristaux incolores; $F_{\text{mél}} = 184^\circ\text{C}$ (CH₃OH). Analyse: C₃₀H₂₀O₂ (C, H, O). UV-visible (THF): λ_{max} nm (log ϵ): 300(4.06); 243(4.72). IR (KBr): $\nu = 1600, 1480, 1460$ et 1200 cm^{-1} . RMN (CDCl₃; HMDS): 1H (H₁₁,s) à $\delta = 5.71$; 1H (H₆,s) à $\delta = 6.38$; 1H (H₄,m) à $\delta = 6.52$; 1H (H₂,m) à $\delta = 6.77$; 16H (aromatiques,m) à $\delta = 7.50$.

Dimère 18. (type II). Cristaux incolores, $F_{\text{mél}} = 243-245^\circ\text{C}$ (CH₃CN). Analyse: C₆₀H₄₀O₄ (C, H, O). UV-visible (THF): λ_{max} nm (log ϵ): 302(4.34); 243(4.95). IR (KBr): $\nu = 1410, 1195\text{ cm}^{-1}$. RMN (THF-D₆; TMS): 1H (H₈,s) à $\delta = 4.81$; 1H (H₆,d) à $\delta = 5.40$; 1H (H₂,d) à $\delta = 5.70$; 1H (H₁₁,m) à $\delta = 5.80$.

1H ($H_{D2,m}$) à $\delta = 5.73$; 1H ($H_{E,m}$) à $\delta = 5.83$; 1H ($H_{F,m}$) à $\delta = 5.96$; 1H ($H_{G,m}$) à $\delta = 6.31$; 32H (aromatiques,m) centré à $\delta = 7.45$.

(b) *En présence de N-méthylmaléimide*. (12 moles). On porte au reflux (55 min) 182 mg de photooxyde 1e, et 616 mg de NMM (12 fois la théorie) dans 15 cm³ de chlorobenzène. Le solvant est éliminé et le résidu solide est résolu par CCM. On effectue deux chromatographies successives. Lorsq'un porte au reflux 192 mg de photooxyde 1e, 209 mg de NMM (4 fois la théorie), dans 10 cm³ de chlorobenzène anhydre pendant une heure sous azote, on recueille: 43 mg d'acétal bicyclique 12 (Rdt = 22%), $F_{\text{max}} = 184^\circ\text{C}$; 63 mg d'adduit *o*-quinodiméthanique 14 (Rdt = 28%), $F_{\text{max}} = 374-375^\circ\text{C}$; 104 mg d'adduit diépoxydique 13 (Rdt = 43%), $F_{\text{max}} = 398-399^\circ\text{C}$.

(c) *En présence de N-méthylmaléimide*. (4 moles). Dans les mêmes conditions opératoires, lorsqu'on porte au reflux 192 mg de photooxyde 1e, 209 mg de NMM (4 fois la théorie), dans 10 cm³ de chlorobenzène anhydre pendant une heure sous azote, on recueille: 43 mg d'acétal bicyclique 12 (Rdt = 22%), $F_{\text{max}} = 184^\circ\text{C}$; 63 mg d'adduit *o*-quinodiméthanique 14 (Rdt = 28%), $F_{\text{max}} = 374-375^\circ\text{C}$; 104 mg d'adduit diépoxydique 13 (Rdt = 43%), $F_{\text{max}} = 398-399^\circ\text{C}$.

N-Méthyl diépoxy-4a,5; 12-12a diphenyl-6,11 hexahydro-1,4,4a,5,12,12a éthano-1,4 naphtacènedicarboximide-13,14,13. Cristaux incolores, $F_{\text{max}} = 398-399^\circ\text{C}$ ($\text{CH}_3\text{CN}-\text{CHCl}_3$; 3-1). Analyse: $\text{C}_{33}\text{H}_{25}\text{NO}_4$ (C, H, N, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 299(4.04); 245(4.85), IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1780$ et 1705 cm^{-1} ; $\nu = 1430, 1380, 1280 \text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; TMS): 3H ($\text{N}-\text{CH}_3,s$) à $\delta = 2.92$; 2H ($\text{H}_1-\text{H}_{6,m}$) à $\delta = 3.06$; 2H ($\text{H}_{13}-\text{H}_{14,t}$) à $\delta = 3.58$; 2H ($\text{H}_5-\text{H}_{12,s}$) à $\delta = 3.85$; 2H ($\text{H}_7-\text{H}_{3,q}$) à $\delta = 6.22$; 14H (aromatiques,m) à $\delta = 7.53$.

N - Méthyl diphenyl - 7,12 dihydro - 5,14 éthano - 5,14 benzo[f]naphto[2,3,b]dioxocinne-1,4 dicarboximide-15,16 14. Cristaux incolores, $F_{\text{max}} = 374-375^\circ\text{C}$ (CH_3CN). Analyse: $\text{C}_{35}\text{H}_{25}\text{NO}_4$ (C, H, N, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 296(4.06); 271(3.81); 241(4.73). IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1785$ et 1710 cm^{-1} ; $\nu = 1380, 1190 \text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; TMS): 3H ($\text{N}-\text{CH}_3,s$) à $\delta = 2.62$; 2H ($\text{H}_{15}-\text{H}_{16,m}$) à $\delta = 4.05$; 2H ($\text{H}_7-\text{H}_{12,t}$) à $\delta = 5.50$; 18H (aromatiques,m) à $\delta = 7.32$.

Etablissement des structures des composés nouveaux

Diéther naphtocyclobuténique 4d

Scission de 4d par BB₃. A une solution de 60 mg de diéther naphtocyclobuténique 4d dans 10 cm³ de CH_2Cl_2 anhydre, on ajoute 1 cm³ de BB₃, durée: 30 min à 0°C. On hydrolyse par de la glace, extrait à l'éther et traite de manière usuelle. L'huile obtenue après évaporation est passée sur CCM (éluant: benzène). On isole la bande $R_f = 0.5$ qui donne après cristallisation 36 mg de dibenzoyl-2,3 naphthalène 20 (Rdt = 82%), $F_{\text{max}} = 144-146^\circ\text{C}$ [$F = 145^\circ\text{C}$ d'après¹³].

Action du brome sur 4d, 30 mg de 4d sont dissous dans 2 cm³ de CHCl_3 , on ajoute 5 cm³ d'une solution de brome (préparée à partir de 2 cm³ de brome dilué à 50 cm³ par CHCl_3). On agite magnétiquement pendant 4 jours, puis on ajoute de nouveau 3 cm³ de la même solution de brome et on laisse 3 jours. La solution est ensuite concentrée jusqu'à l'obtention d'une résine et on verse 5 cm³ d'une solution de diazométhane (7 jours à 0°C). On concentre et on effectue une CCM (éluant: benzène). On isole par ordre d'éluion: 20 mg de tétrabromovératrole 22 (Rdt = 58%), $F_{\text{max}} = 119-120^\circ\text{C}$ [$F = 118-120^\circ\text{C}$ d'après¹⁴]; 21 mg de dérivé dibenzoylé 20 (Rdt = 65%), $F_{\text{max}} = 144-145^\circ\text{C}$.

Acétal bicyclique 12

(a) Dégradation de l'acétal 12: obtention de la lactone 26

Hydrolyse de 12: lactone phénolique 25. A une solution de 42 mg d'acétal bicyclique 12 dans 40 cm³ de THF, on ajoute 10 cm³ d'une solution acide (préparée à partir de 5 cm³ d' H_2SO_4 concentré d = 1.83 et 5 cm³ d'eau). Durée: douze jours sous agitation magnétique puis traitement usuel; la résine est passée sur CCM (éluant: CH_2Cl_2 -éther: 95-5). On isole la bande $R_f = 0.4$ et on récupère ainsi 30 mg de lactone phénolique 25 (Rdt = 70%).

(*o*-Hydroxyphényl)-3 diphenyl-4,9 3H-naphto[2,3-c]furannone-

1 25. Cristaux incolores, $F_{\text{max}} = 272-273^\circ\text{C}$ (oxyde d'isopropyle). Analyse: $\text{C}_{30}\text{H}_{20}\text{O}_3$ (C, H, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 344(3.96); 330(3.85); 305(4.16), 291(4.17); 244(5.00). IR (KBr): $\nu_{\text{OH}} = 3460 \text{ cm}^{-1}$; $\nu_{\text{CO}} = 1745 \text{ cm}^{-1}$. RMN (DMSO- D_6 ; HMDS): 3H (2 aromatiques + 1 tertiaire,m) à $\delta = 6.56$; 16H (aromatiques,m) à $\delta = 7.50$; 1H (OH, mobile avec D_2O) à $\delta = 9.30$.

Action du diazométhane sur 25: lactone 26. 65 mg de lactone phénolique 25, sont dissous dans 2 cm³ de THF anhydre puis on ajoute 2 cm³ d'une solution éthérée de diazométhane. Durée: 24 h à 0°C; après évaporation du solvant, la lactone méthoxylée 26 cristallise, poids = 68 mg (Rdt = 98%).

(*o*-Méthoxyphényl)-3 diphenyl-4,9 3H-naphto[2,3-c]furannone-1 26. Cristaux incolores: $F_{\text{max}} = 234-235^\circ\text{C}$ (CH_3OH). Analyse: $\text{C}_{31}\text{H}_{22}\text{O}_3$ (C, H, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 345(3.79); 331(3.68); 305(3.97); 293(3.94); 245(4.82). IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1770 \text{ cm}^{-1}$; $\nu = 1600, 1490 \text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; HMDS): 3H (OCH_3,s) à $\delta = 3.40$; 5H (4 aromatiques + 1 tertiaire,m) à $\delta = 6.58$; 14H (aromatiques,m) à $\delta = 7.46$.

(b) Synthèse indépendante de la lactone 26

Céto-acide 27 par condensation magnésienne. 532 mg d'anhydride 23 sont dissous à chaud dans 25 cm³ de benzène anhydre, puis on laisse refroidir: l'anhydride ne précipite pas. On ajoute goutte à goutte 2 cm³ de magnésien de l'*o*-bromanisole (d'après le dosage préalable 1 cm³ de $\text{RMgX} = 218 \text{ mg}$, soit 1.8 fois la quantité théorique). On agite magnétiquement pendant 17 h à T° ordinaire, puis on hydrolyse par NH_4Cl . On extrait à l'éther et on fait subir le traitement usuel. Par évaporation du solvant le céto-acide 27 cristallise, poids: 420 mg (Rdt = 60%).

Céto-acide 27 par condensation cadmiennne. On prépare un magnésien à partir de 35 cm³ d'éther anhydre, 10 cm³ d'*o*-bromanisole et 2.460 g de Mg. On ajoute ensuite 11.5 g de chlorure de cadmium anhydre sous très forte agitation. La solution est portée au reflux 90 min. On refroidit la solution, ajoute 4 g de CdCl_2 et distille l'éther.

On récupère ainsi environ 20 cm³ d'une huile assez visqueuse, sur laquelle on additionne une solution de 1.009 g de 23 dans 25 cm³ de benzène anhydre et on laisse 20 h à agiter. Après une hydrolyse acide (HCl 50%), on filtre les impuretés minérales et fait subir le traitement usuel. On recueille 858 mg de céto-acide 27 (Rdt = 66%).

Acide (o-méthoxybenzoyl)-3 diphenyl-1,4 naphtoïque-2 27. Cristaux incolores, $F_{\text{max}} = 241-242^\circ\text{C}$ (cyclohexane- CH_3CN : 4-1). Analyse: $\text{C}_{31}\text{H}_{22}\text{O}_4$ (C, H, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 342(3.57); 327(3.49); 304(3.97); 292(3.95); 282(3.94); 246(4.75). IR (KBr): $\nu_{\text{OH}} = 3400 \text{ cm}^{-1}$; $\nu_{\text{CO}} = 1760 \text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; HMDS): 3H (OCH_3,s) à $\delta = 3.53$; 18H (aromatiques,m) à $\delta = 7.46$; 1H (OH sous les aromatiques, mobile avec D_2O) à $\delta = 7.30$.

Excès d'organomagnésien: lactone 24. A une solution de 115 mg d'anhydride 23 dans 20 cm³ de benzène anhydre, on additionne goutte à goutte 16 cm³ d'une solution magnésienne d'*o*-bromanisole (10 fois la théorie) sous agitation magnétique. On évapore l'éther et on porte au reflux 2 h. On hydrolyse par HCl 10%; et extrait à l'éther, puis on effectue le traitement usuel. Après évaporation du solvant, on recueille 131 mg de produit de double condensation 24 (Rdt = 73%).

Bis (o-méthoxyphényl)-3,3 diphenyl-4,9 3H-naphto[2,3-c]furannone-1 24. Cristaux incolores, $F_{\text{max}} = 318-319^\circ\text{C}$ (dioxanne). Analyse: $\text{C}_{32}\text{H}_{22}\text{O}_4$ (C, H, O). UV-visible (THF): $\lambda_{\text{max, nm}}(\log \epsilon)$: 343(3.68); 329(3.58); 305(3.96); 283(4.06); 246(4.83). IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1765 \text{ cm}^{-1}$; $\nu = 1250 \text{ cm}^{-1}$.

Réduction du céto-acide 27: lactone 26. 68 mg d'acide 27 sont dissous dans 25 cm³ de méthanol anhydre, on ajoute 100 mg de méthylate de potassium cristallisé. La fluorescence bleue disparaît, on additionne 100 mg de NaBH_4 (4 fois). On hydrolyse par HCl 10%, puis on effectue le traitement usuel. Après évaporation, on obtient une résine que l'on chromatographie (éluant: benzène-éther: 95-5). On isole par ordre d'éluion: 7 mg de lactone méthoxylée 26 (Rdt = 11%; Rdt = 55% par rapport au produit ayant réagi). Fusion sans dépression avec échantillon de la dégradation chimique, $F_{\text{max}} = 234-235^\circ\text{C}$. 46 mg d'acide 27 n'ayant pas réagi (Rdt = 68%), $F_{\text{max}} = 241-242^\circ\text{C}$.

Action de diazométhane sur 27: le céto-ester 28. 190 mg de céto-acide 27 sont dissous dans 5 cm³ de THF anhydre, puis on ajoute 5 cm³ d'une solution étherée de diazométhane, durée: 60 min. Le cétoester 28 cristallise après évaporation du solvant; poids: 190 mg (Rdt = 97%).

(*o*-Méthoxybenzoyl)-3 méthoxycarbonyl-2 diphenyl-1,4 naphthalène 28. Cristaux incolores, $F_{\text{melt}} = 169-170^{\circ}\text{C}$ (CH₃OH). Analyse: C₃₂H₂₄O₄ (C, H, O). UV-visible (THF): λ_{max} , nm(log ϵ): 304(4.08); 232(4.66). IR (KBr): $\nu_{\text{COOCH}_3} = 1730\text{ cm}^{-1}$; $\nu_{\text{CO}} = 1665\text{ cm}^{-1}$. RMN (CDCl₃; HMDS): 3H (OCH₃,s) à $\delta = 3.28$; 3H (OCH₃,s) à $\delta = 3.51$; 18H (aromatiques,m) à $\delta = 7.26$.

Adduit diépoxydique 9d

(a) Désoxygénation de 9d: adduit 1-4 10d. 163 mg d'adduit 9d sont mis en suspension dans 250 cm³ d'acide acétique sous agitation magnétique. On ajoute une solution aqueuse de 5.128 g d'iode de sodium, 1.21 g d'acétate de sodium et 5 cm³ d'eau, puis 5.284 g de zinc en poudre par petites portions, durée = 18 h. On fait subir le traitement usuel; l'huile est passée sur CCM (CH₂Cl₂) et on obtient ainsi 91 mg d'adduit 1-4 10d (Rdt = 60%).

N-Méthyl diphenyl-5,12 dihydro-1,4 éthano-1,4 naphthalénedi-carboximide-13,14 10d. Cristaux incolores, $F_{\text{melt}} = 364-365^{\circ}\text{C}$ (THF). Analyse: C₃₅H₂₅NO₂ (C, H, N, O). UV-visible (THF): λ_{max} , nm(log ϵ): 381(4.01); 364(4.07); 346(3.92); 330(3.65); 315(3.32); 269(4.87); 262(4.69). IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1780$ et 1700 cm^{-1} . RMN (CDCl₃; TMS): 3H (N-CH₃,s) à $\delta = 2.87$; 2H (H₁₃-H₁₄,t) à $\delta = 3.05$; 2H (H₁-H₄,m) à $\delta = 4.40$; 2H (H₇-H₈,t) à $\delta = 6.40$; 14H (aromatiques,m) à $\delta = 7.58$; 2H (H₆-H₁₁,s) à $\delta = 8.03$; SM = M⁺ 491; m/e: 380 (M-NMM).

(b) Dissociation de l'adduit 1-4 10d. 25 mg de 10d placés dans un tube scellé que l'on chauffe 60 min par un four électrique 500°C < T < 530°C. Puis on fait une CCM (cyclohexane) on isole la bande rouge orangé correspondant au diphenyl-5,12 naphthalène 2d, poids = 14 mg (Rdt = 53%), $F_{\text{melt}} = 207^{\circ}\text{C}$ [F = 207-208°C d'après¹²].

Adduit du diéther *o*-quinodiméthanique 14

(a) Coupure basique de l'adduit 14: obtention de l'imide 32. A une solution de 55 mg d'adduit 14 dans 10 cm³ de DMSO anhydre on ajoute, sous barbotage d'azote, 40 mg de méthylate de potassium en 15 mn. La réaction dure 1 h. La résine obtenue après concentration est dissoute dans 2 cm³ de THF anhydre, puis on ajoute 2 cm³ d'une solution étherée de diazométhane. Durée: 15 h à 0°C. On concentre et on sépare sur CCM (éluant: CH₂Cl₂); on isole par ordre d'éluion: 33 mg de diéther méthylique 31 (R_f = 0.5; Rdt = 93%), $F_{\text{melt}} = 184-185^{\circ}\text{C}$ [F = 179-180°C d'après¹⁰], 18 mg d'imide naphthalénique 32 (R_f = 0.2; Rdt = 81%), $F_{\text{melt}} = 240-242^{\circ}\text{C}$.

(b) Synthèse de l'imide naphthalénique 32. On porte au reflux 30 min 209 mg d'anhydride naphthalénedicarboxylique-2,3, 20 cm³ de xylène, 10 cm³ de méthylamine (en solution benzénique à 10%). Par distillation on élimine le benzène, et on porte de nouveau au reflux 3 h. L'imide naphthalénique 32 cristallise après évaporation du xylène, poids = 214 mg (Rdt = 96%).

N-Méthyl naphthalénedicarboximide-2,3 32. Cristaux incolores, $F_{\text{melt}} = 240-242^{\circ}\text{C}$ (oxyde d'isopropyle). Analyse: C₁₅H₉NO₂ (C, H, N, O). UV-visible (éther): λ_{max} , nm(log ϵ): 353(3.76); 337(3.54); 321(3.20); 289(3.99); 280(3.97); 274(3.94); 256(4.96); 215(4.46). IR (KBr): $\nu_{\text{CO}} = 1760$ et 1710 cm^{-1} ; $\nu = 1430$, 1380 cm^{-1} . RMN (CDCl₃; HMDS): 3H (N-CH₃,s) à $\delta = 3.18$; 2H (H₆-H₇,m) à $\delta = 7.68$; 2H (H₇-H₈,m) à $\delta = 8.05$; 2H (H₁-H₄,s) à $\delta = 8.28$.

Isomérisation du dimère 18: dimère 34. (type III). On dissout 19 mg de dimère 18 dans 8 cm³ de chlorure de méthylène anhydre. Cette solution est refroidie à 0°C, puis on ajoute 1 cm³ d'une solution froide (préparée à partir d'1 cm³ d'anhydride trifluoroacétique et de 9 cm³ d'acide trifluoroacétique). Durée de réaction: 10 min, la solution prend une couleur cognac avant de redevenir incolore. On hydrolyse à l'éther ordinaire, puis on fait subir le traitement usuel. Par évaporation du solvant, le dimère 34 cristallise; après de nombreux lavages à l'éther, on obtient 9 mg de 34 (Rdt = 50%).

Dimère 34. Sublimation, F > 500°C. Analyse: C₆₀H₄₀O₄ (C, H, O). IR (KBr): $\nu = 1400$, 1200 , 1000 cm^{-1} . SM: M cal. pour C₆₀H₄₀O₄ = 824.46; m⁺/e = 824 (M⁺, 100%); 513 (24%); 204 (24%) [M-2(diphenyl-1,4 naphthalénone-2,3)].

BIBLIOGRAPHIE

- ¹Ch. Dufraisse et L. Enderlin, *C.R. Acad. Sci.* 191, Série C, 1321 (1930); ²H. H. Wasserman, J. R. Scheffer et J. L. Cooper, *J. Am. Chem. Soc.* 94, 4991 (1972).
- ³J. Rigaudy, J. Baranne-Lafont, M. Moreau et Nguyen Kim Cuong, *C.R. Acad. Sci.* 276, Série C, 1607 (1973); ⁴J. Rigaudy, J. Baranne-Lafont, A. Defoin et Nguyen Kim Cuong, *C.R. Acad. Sci.* 290, Série C, 527 (1975); ⁵J. Rigaudy, J. Baranne-Lafont, A. Defoin et Nguyen Kim Cuong, *Tetrahedron* 34, 73 (1978); ⁶A. Defoin, J. Baranne-Lafont, J. Rigaudy et J. Guilhem, *Tetrahedron* 34, 83 (1978).
- ⁷Ch. Dufraisse, Ch. Moureu et P. M. Dean, *C.R. Acad. Sci.* 182, 1584 (1926).
- ⁸J. Rigaudy et D. Sparfel, *Tetrahedron* 34, 113 (1978).
- ⁹J. Rigaudy, M. Moreau et Nguyen Kim Cuong, *C.R. Acad. Sci.* 274, Série C, 1589 (1972); ¹⁰J. Rigaudy, M. C. Perlat, D. Simon et Nguyen Kim Cuong, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 493 (1976).
- ¹¹J. Rigaudy et D. Sparfel, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 742 (1977).
- ¹²D. R. Kearns et A. U. Khan, *Photochem. and Photobiol.* 193 (1969).
- ¹³D. W. Jones et G. Kneen, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. I* 171 et 175 (1975).
- ¹⁴M. P. Cava, B. Hwang et J. P. Van Meter, *J. Am. Chem. Soc.* 85, 4031 (1963).
- ¹⁵D. W. Jones et R. L. Wile, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. I* 1 (1974).
- ¹⁶J. Rigaudy, J. Baranne-Lafont et A. Defoin, résultats non publiés.
- ¹⁷Ch. Dufraisse et R. Horclois, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 3, 1894 (1936).
- ¹⁸J. D. Loudon et A. D. B. Sloan, *J. Chem. Soc.* 3262 (1962).
- ¹⁹H. Cousin, *Ann. Chim.* 13, 487 (1898).