N-Substituierte Derivate von Dehydroabietylamin und Dehydroabietylguanidin

von Rudolf Albrecht, Clemens Rufer und Eberhard Schröder

Aus dem Hauptlaboratorium der Schering AG, D-1 Berlin

Eingegangen am 24. März 1969

Zur Untersuchung ihrer antimikrobiellen Wirkung werden aus Dehydroabietylamin dargestellt: *N*-Monoalkyl- und *N,N*-Dialkyl-dehydroabietylamine, am *N*- oder *N'*-Atom durch eine Alkyl-, substit. Alkyl-, Acyl-, Amino- oder Nitro-Gruppe substituierte Dehydroabietylguanidine, Dehydroabietylarnstoff, -thioarnstoff, Salze des Dehydroabietylisoarnstoffs und -isothioarnstoffs, quaternäre Dehydroabietylammioniumsalze und 2-Dehydroabietyl-amino-pyrimidin.

N-Substituted Derivatives of Dehydroabietylamine and Dehydroabietylguanidine

The following derivatives of dehydroabietylamine have been synthesized in order to investigate their antimicrobial activity: *N*-monoalkyl- and *N,N*-dialkyl-dehydroabietylamine; dehydroabietylguanidines, which are substituted at the *N*- or *N'*-atom by an alkyl-, substituted alkyl-, acyl-, amino- or nitro-group; dehydroabietylurea, -thiourea, salts of dehydroabietylisourea and -isothiourea, quaternary dehydroabietylammionium salts and 2-dehydroabietyl-amino-pyrimidine.

Im Zusammenhang mit Untersuchungen über Dehydroabietylguanidin-Derivate als antimikrobiell wirksame Verbindungen¹⁻³⁾ berichten wir in dieser Arbeit über Verbindungen **1**, die aus Dehydroabietylamin⁴⁾ (**2**) dargestellt werden, und in denen X eine

mono- oder disubstituierte Aminogruppe, eine quaternäre Ammoniumgruppe, eine substituierte Guanidinogruppe oder einen Harnstoff- bzw. Thioharnstoff-Rest darstellt.

Die biologischen Ergebnisse werden in Lit.¹⁾ mitgeteilt.

1) E. Schröder, R. Albrecht und C. Rufer, Arzneimittel-Forsch., im Druck.

2) R. Albrecht, H. Heidepriem und E. Schröder, Liebigs Ann. Chem. 725, 154 (1969).

3) C. Rufer, R. Albrecht und E. Schröder, Liebigs Ann. Chem. 728, 193 (1969), nachstehend.

4) W. J. Gottstein und L. C. Cheney, J. org. Chemistry 30, 2072 (1965).

Aliphatische Guanidine werden am besten durch Umsetzung eines *S*-Methyl-isothiuroniumsalzes mit einem Amin dargestellt. Die meisten der von uns synthetisierten Dehydroabietylguanidine wurden dementsprechend aus *N*-Dehydroabietyl-*S*-methylisothiuroniumacetat erhalten. Dazu wurde aus Dehydroabietylamin (**2**; als Acetat eingesetzt) mit Hilfe von NH_4SCN und Benzoylchlorid der entsprechende Thioharnstoff **3** hergestellt; als Nebenprodukt entstand *N*-Benzoyl-dehydroabietylamin (**4**). Umsetzung von **3** mit Methyljodid und Versetzen der freien Base **5** mit Essigsäure ergab *N*-Dehydroabietyl-*S*-methylisothiuroniumacetat (**5** · $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$). Diese Verbindung reagierte mit verschiedenen Basen zu den Dehydroabietylguanidinen **6**–**16**. Die präparativen Einzelheiten gehen aus Tabelle 1 hervor. — In gleicher Weise wurde **5** mit Hydrazin umgesetzt, wobei *N'*-Amino-*N*-dehydroabietyl-guanidin (**17**) entsteht (Tabelle 1).

Zur Darstellung von *N*-Methyl-*N*-dehydroabietyl-guanidiniumacetat **20** wurde *N*-Methyl-dehydroabietylamin (**19**) mit *S*-Methylisothiuroniumacetat zusammenschmelzen. **19** wurde dazu durch LiAlH_4 -Reduktion von *N*-Formyl-dehydroabietylamin³⁾ (**18**) gewonnen.

Tabelle 1. Darstellung und Charakterisierung der Dehydroabetylguanidine 6–17
 aus *N*-Dehydroabetyl-*S*-methyl-isothiuroniumacetat ($5 \cdot \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$; 10 mMol) und Aminen HNR₁R₂

Nr.	HNR ₁ R ₂	Lösungsmittel Äthanol	Zeit (Temperatur)	Aufarbeitung nach Eindampfen i. Vak.	Ausbeute [% d. Th.]	Schmp. [°C]	Bruttoformel (Mol.-Gew.)	C	H	N	Analysen
6	1,15 ml HN(C ₂ H ₅) ₂	ohne	3 Stdn. (100°)	Umkrst. aus Äther und Essigester	50	168–171	C ₂₇ H ₄₅ N ₃ O ₂ (443.7)	Ber. 73.08 Gef. 72.71	10.23 10.27	9.47 9.25	
7	0,6 ml H ₂ NC ₂ H ₄ OH	20 ccm	6 Stdn. (Rückfluß)	Umkrst. aus Essigester/Äther	70	154–155	C ₂₅ H ₄₁ N ₃ O ₃ (431.7)	Ber. 69.56 Gef. 69.51	9.58 9.60	9.74 9.60	
8	1,05 ml H ₂ NC ₂ H ₄ OC ₂ H ₅	20 ccm	6 Stdn. (Rückfluß)	Umkrst. aus Essigester	67	112–113	C ₂₇ H ₄₅ N ₃ O ₃ (459.7)	Ber. 70.54 Gef. 70.31	9.87 9.93	9.15 9.37	
9	1,2 ml H ₂ NC ₂ H ₄ N(C ₂ H ₅) ₂	ohne	72 Stdn. (20°)	Präparative Elektrophorese ^{a)}	80	b)	C ₂₉ H ₅₀ N ₄ O ₂ (486.7)	Ber. 70.17 Gef. 69.82	10.60 10.39	11.29 ^{c,h)} 11.44	
10	1,3 g H ₂ NC ₂ H ₄ N	30 ccm	3 Stdn. (Rückfluß)	Präparative Elektrophorese ^{a)}	31	b)	C ₂₉ H ₄₈ N ₄ O ₃ (500.7)	Ber. 67.40 Gef. 66.55	9.72 9.70	10.85 11.27	
11	0,85 ml HN	20 ccm	3 Stdn. (Rückfluß)	Digieren mit Essigester	77	170–172	C ₂₇ H ₄₃ N ₃ O ₂ (441.6)	Ber. 73.43 Gef. 73.58	9.82 10.04	9.52 9.54	
12	0,85 g HN	ohne	3 Stdn. (100°)	Umkrst. aus Essigester/Petroläther und Essigester	82	147–149	C ₂₈ H ₄₅ N ₃ O ₂ (455.7)	Ber. 73.80 Gef. 73.87	9.96 10.02	9.23 9.23	
13	1 ml HN	ohne	2 Stdn. (100°)	Präparative Elektrophorese ^{a)}	65	b)	C ₂₇ H ₄₃ N ₃ O ₃ (457.7)	Ber. 68.22 Gef. 68.44	9.11 9.56	8.84 ^{d,h)} 8.92	
14	1,29 g HN	80 ccm	3 Stdn. (Rückfluß)	Präparative Elektrophorese ^{a)}	57	b)	C ₂₇ H ₄₄ N ₄ O ₂ (456.7)	Ber. — Gef. —	—	10.96 ^{e,h)} 10.71	
15	1 g HN	30 ccm	6 Stdn. (Rückfluß)	— ^{b)}	100	b)	C ₂₈ H ₄₆ N ₄ O ₂ (470.7)	Ber. 69.77 Gef. 69.20	9.88 10.13	11.63 ^{f,h)} 11.24	
16	1,3 g HN	20 ccm	4 Stdn. (Rückfluß)	Präparative Elektrophorese ^{a)}	30	b)	C ₂₉ H ₄₈ N ₄ O ₃ (500.7)	Ber. 66.35 Gef. 66.72	9.41 9.73	10.37 ^{g,h)} 10.85	
17	10 ml H ₂ N·NH ₂ ·H ₂ O (80 proz.)	200 ccm	168 Stdn. (20°)	Digieren mit Essigester	80	175–181	C ₂₇ H ₄₆ N ₄ O ₂ (402.6)	Ber. 68.63 Gef. 68.80	9.51 9.55	13.88 13.58	

a) Einzelheiten bei Lit.³⁾. — b) Gefrieretrocknet. — c) Enthält 1.99% H₂O. — d) Enthält 3.73% H₂O. — e) Enthält 8.14% H₂O und 2.46% CH₃CO₂H. — f) Enthält 2.34% H₂O. — g) Enthält 2.71% H₂O und 5.65% CH₃CO₂H. — h) Die berechneten Analysenwerte berücksichtigen den H₂O- bzw. CH₃CO₂H-Gehalt. —
 p) Als Rohprodukt analysiert.

N'-Methyl-*N*-dehydroabietyl-guanidiniumacetat (**21**) wurde durch Umsetzung von Dehydroabietylamin (**2**) und *N*-Methyl-*S*-methyl-isothiuroniumacetat dargestellt. Aus dem Rohprodukt konnte rein und kristallin jedoch nur das Pikrat erhalten und gereinigt werden. Dieses wurde mit Pyridin-hydrochlorid in Äthanol umgesetzt, das Pyridiniumpikrat abgetrennt und das gelöste *N*'-Methyl-*N*-dehydroabietyl-guanidinhydrochlorid in Essigsäure/Ameisensäure-Puffer durch präparative Elektrophorese gereinigt. Auf diese Weise wurde nach Dünnschichtchromatographie und Elektrophorese reines **21** erhalten.

Umsetzung des Dehydroabietylamins (**2**) mit *N*-Nitro-*S*-methyl-isothioharnstoff lieferte *N*'-Nitro-*N*-dehydroabietyl-guanidin (**22**).

Durch Umsetzung von Dehydroabietylguanidin⁵⁾ mit Acetylchlorid oder *p*-Toluolsulfochlorid wurden Acetyl- bzw. *p*-Toluolsulfonyl-dehydroabietylguanidin erhalten, wobei die Stellung des Acyl-Restes (N oder N') nicht geklärt werden konnte. Mit Malonaldehyd-tetraäthylacetal reagierte Dehydroabietylguanidin zum 2-Dehydroabietyl-amino-pyrimidin (**23**).

N-Dehydroabietyl-*O*-methyl-isoharnstoff-hydrochlorid (**25**) wurde aus Dehydroabietylamin (**2**) über das entsprechende Cyanamid **24** erhalten. Umsetzung von **2** mit Phosgen (zum Isocyanat **26**) und anschließend mit Ammoniak lieferte Dehydroabietylharnstoff (**27**).

Aus *N*-Methyl-dehydroabietylamin (**19**) wurden durch Acylierung die Derivate **28**–**32** erhalten, aus ihnen durch Lithiumaluminiumhydrid-Reduktion die entsprechenden tertiären Amine **33**–**37**. Diese wurden mit Methyljodid zu den quater-

⁵⁾ N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken (Erf. B. M. van der Weide und L. M. Gindraux), D. A. S. 1 182895 v. 3. 12. 1964 [C. 1965, Nr. 30-2347].

Tabelle 2. Darstellung und Charakterisierung der tertiären Amine 33–37 und quaternären Salze 38–42
 DMF = Dimethylformamid.

Nr.	R	Ausgangs- material	Reagens- mittel	Lösungs- mittel	Zeit (Temperatur)	Ausbeute [% d. Th.]	Schmp. [°C]	Bruttoformel (Mol.-Gew.)	C	H	Cl	J	N
33	CH ₃	12 mMol 28	36 mMol LiAlH ₄	120 ccm Dioxan	17 Stdn. (Rückfluß)	88a)	223–224b) (Zers.)	C ₂₄ H ₃₆ ClN ^{b)} (350.0)	Ber. — Gef. —	—	10.13 9.92	—	4.00b) 3.95
34	n-C ₃ H ₇	20 mMol 29	60 mMol LiAlH ₄	200 ccm Dioxan	20 Stdn. (Rückfluß)	90a)	214–217b)	C ₂₄ H ₄₀ ClN ^{b)} (378.0)	Ber. — Gef. —	—	—	—	—
35	n-C ₄ H ₉	20 mMol 30	60 mMol LiAlH ₄	200 ccm Dioxan	20 Stdn. (Rückfluß)	89a)	230–231b)	C ₂₃ H ₄₂ ClN ^{b)} (392.0)	Ber. 76.70 Gef. 76.59	10.80 11.18	9.04 9.28	—	3.57b) 3.44
36	n-C ₁₂ H ₂₅	20 mMol 31	60 mMol LiAlH ₄	200 ccm Dioxan	20 Stdn. (Rückfluß)	85a)	169b)	C ₃₃ H ₅₈ ClN ^{b)} (504.3)	Ber. 78.59 Gef. 78.50	11.59 11.52	7.03 7.30	—	2.78b) 2.84
37	CH ₂ CH ₂ OC ₆ H ₅	20 mMol 32	60 mMol LiAlH ₄	200 ccm Dioxan	20 Stdn. (Rückfluß)	80a)	179–180b)	C ₃₀ H ₄₂ ClNO (456.1)	Ber. 76.37 Gef. 76.39	9.28 9.25	7.77 7.58	—	3.07b) 2.98
38 ^{c)}	CH ₃	46 mMol 33	1.73 ccm CH ₃ J	46 ccm DMF	24 Stdn. (20°)	75	254–254.5d) (Zers.)	C ₂₁ H ₃₆ JN (455.5)	Ber. 60.65 Gef. 60.54	8.41 8.80	—	27.86 27.81	3.08 3.09
39	n-C ₃ H ₇	17 mMol 34	3.2 ccm CH ₃ J	17 ccm DMF	24 Stdn. (20°)	35	128–132e) (Zers.)	C ₂₂ H ₄₂ JN (483.5)	Ber. — Gef. —	—	—	26.25 26.51	2.90 2.96
40	n-C ₄ H ₉	14 mMol 35	6 ccm CH ₃ J	ohne	5 Tage (20°)	31	109–113f)	C ₂₂ H ₄₄ JN (497.6)	Ber. 62.76 Gef. 62.56	8.92 8.76	—	25.50 25.57	2.85 2.93
41	n-C ₁₂ H ₂₅	3.7 mMol 36	1.5 ccm CH ₃ J	ohne	2 Tage (20°)	39	124–125e) (Zers.)	C ₃₄ H ₆₀ JN (609.8)	Ber. — Gef. —	—	—	20.81 20.95	2.30 2.55
42	CH ₂ CH ₂ OC ₆ H ₅	13.5 mMol 37	2.55 ccm CH ₃ J	13.5 ccm DMF	2 Tage (20°)	40	173–174g) (Zers.)	C ₃₀ H ₄₄ JNO (561.6)	Ber. 64.16 Gef. 64.35	7.90 8.07	—	—	2.49 2.54

a) Rohes Amin. — b) Hydrochlorid. — c) Das entsprechende Trimethyl-dehydrobiethyl-ammoniumacetat (aus 38 und Silberacetat in H₂O/CH₃OH) hat den Schmp. 190° (Zers.). — d) Aus Äthanol/DMF. — e) Nach Lösen in Äthanol und Versetzen mit Äther. — f) Aus Benzol. — g) Aus Äthanol/Wasser.

nären Salzen **38–42** umgesetzt. Die Verbindungen **33–42** sind in Tabelle 2 (mit präparativen Einzelheiten) zusammengestellt.

Den Herren Dr. *G. Cleve*, Dr. *W. Neudert* und Dr. *G. Schulz* danken wir für die Durchführung und Interpretation der physikalischen Messungen, Herrn *S. Matthes* für die elektrophoretischen Trennungen, Fräulein *A. Damerius*, Fräulein *R. Gericke* und Herrn *P. Pretsch* für die Durchführung der präparativen Arbeiten.

Beschreibung der Versuche

Die Bedingungen zur Ermittlung der Konstanten der dargestellten Verbindungen, Aufnahme der Spektren sowie Ausführung der Elektrophorese s. bei Lit.³⁾

Dehydroabietylthioharnstoff (3) und N-Benzoyl-dehydroabietylamin (4). — 2.3 ccm *Benzoylchlorid* wurden bei 10° zu 1.52 g *NH₄SCN* in Aceton getropft und 5 Min. gekocht. 5.7 g (20 mMol) *Dehydroabietylamin*⁴⁾ (**2**) in 10 ccm Aceton wurden in der Siedehitze zugegeben; nach 1stdg. Kochen wurde in 100 ccm Wasser gegossen, mit Essigester ausgeschüttelt, der Extrakt getrocknet und nach dem Eindampfen in 40 ccm 1*n* *methanol. KOH* 15Min. gekocht. Eingießen in 200 ccm Wasser, Extraktion mit Äther, Waschen der Ätherlösung mit Wasser, Trocknen und Eindampfen i. Vak. lieferten 6.6 g rohes **3**, das nach DC durch

wenig **4** verunreinigt war. Für die Analyse wurde 1 g Rohprodukt an 20 g *Kieselgel* chromatographiert. Mit Petroläther/Essigester (1:1) wurden zunächst 155 mg (13%) **4** vom Schmp. 157–158° (aus CH_2Cl_2 /Petroläther) erhalten. – *UV-Spektrum*: $\lambda_{\text{max}} = 219 \text{ m}\mu$ ($\epsilon = 18600$).

$\text{C}_{27}\text{H}_{35}\text{NO}$ (389.6) Ber. C 83.33 H 9.06 N 3.59 Gef. C 82.52 H 9.05 N 3.61

Weitere Elution mit dem gleichen Gemisch ergab 750 mg (72%) öliges **3**; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +16^\circ$ ($c = 10.4$; CHCl_3).

$\text{C}_{21}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{S}$ (344.6) Ber. N 8.13 S 9.30 Gef. N 7.81 S 9.60

N-Dehydroabietyl-S-methyl-isothiuroniumacetat (**5** · $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$). – 61.6 g rohes **3** (ca. 134 mMol) und 27 ccm *Methyljodid* wurden in 640 ccm Methanol 45 Min. gekocht. Nach Eindampfen wurde in 1.5 l Äthanol gelöst, bei 5° mit Wasser bis zur Trübung verdünnt und mit 260 ccm 1*n* methanol. KOH sowie 2.4 l Wasser versetzt. Extraktion mit Äther bei ca. 5°, Waschen der vereinigten Ätherphasen mit Wasser, Filtrieren und Eindampfen i. Vak. lieferten **5**, welches in 600 ccm Äther mit 11.8 ccm Eisessig versetzt wurde. Absaugen nach 16 Stdn. bei 4° ergab 30.6 g (55%) **5** · $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$; Schmp. 157–158° (mit Äther digeriert), $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +1.2^\circ$ ($c = 10.5$; Methanol).

$\text{C}_{24}\text{H}_{38}\text{N}_2\text{O}_2\text{S}$ (418.6) Ber. N 6.70 S 7.66 Gef. N 6.74 S 7.72

N-Methyl-dehydroabietylamin (**19**). – 62.7 g (0.2 Mol) *N-Formyl-dehydroabietylamin*³⁾ wurden mit 22.8 g (0.6 Mol) LiAlH_4 in 2 l absol. Dioxan 18 Stdn. unter Rückfluß gekocht. Es wurde aufgearbeitet und das Rohprodukt an 600 g *Kieselgel* mit Methanol/Chloroform (1:1) chromatographiert: 27 g reines **19**.

Hydrochlorid: Schmp. 300–301° (Zers.; aus Äthanol).

$\text{C}_{21}\text{H}_{34}\text{ClN}$ (336.0) Ber. C 75.09 H 10.20 Cl 10.55 N 4.17
Gef. 74.91 10.36 10.37 4.14

N-Methyl-N-dehydroabietyl-guanidiniumacetat (**20**). – 1.9 g **19** wurden mit 1.0 g *S-Methyl-isothiuroniumacetat* 1 Stde. auf 150° erhitzt; die erkaltete Masse wurde mit Äther und Wasser ausgewaschen und der unlösliche Rückstand aus wäbr. Äthanol (1:1) umkristallisiert. Ausbeute 250 mg (10%) vom Schmp. 262–263° (Zers.); Lit.⁵⁾ Schmp. 265°.

N-Methyl-N-dehydroabietyl-guanidiniumacetat (**21**). – 2.57 g (9 mMol) **2**⁴⁾ wurden in 16 ccm Äthanol heiß gelöst, 2.89 g (17.5 mMol) *N-Methyl-S-methyl-isothiuroniumacetat* in 16 ccm H_2O unter Sieden zugetropft und anschließend 16 Stdn. gekocht. Es wurde eingedampft, das zurückbleibende Öl mit Äther gewaschen, in 40 ccm Butanol/Essigsäure (10:1) gelöst, 3 mal mit je 20 ccm H_2O gewaschen, die Butanolphase vollständig eingedampft, der Rückstand mit 2*n* NaOH versetzt und das rohe *N-Methyl-N-dehydroabietyl-guanidin* (2.8 g) in Äther aufgenommen. Die Ätherlösung wurde eingedampft, der Rückstand in 12.5 ccm 90proz. Äthanol aufgenommen und mit 2.06 g (9 mMol) *Pikrinsäure* gekocht. Das auskristallisierte *N-Methyl-N-dehydroabietyl-guanidiniumpikrat* wurde aus 90proz. Äthanol umkristallisiert. Ausbeute 1.85 g (36%) vom Schmp. 193–195°.

$\text{C}_{28}\text{H}_{38}\text{N}_6\text{O}_7$ (570.6) Ber. C 58.94 H 6.71 N 14.73 Gef. C 58.91 H 7.05 N 14.73

1.42 g (2.5 mMol) *Pikrat* wurden in 25 ccm Äthanol mit 289 mg (2.5 mMol) *Pyridinhydrochlorid* in 25 ccm Äthanol versetzt und aufgeköcht. Das auskristallisierte *Pyridiniumpikrat* wurde abgesaugt und die Mutterlauge eingedampft (542 mg Rückstand). – 500 mg

Rückstand wurden durch *präparative Elektrophorese* in Essigsäure/Ameisensäure-Puffer³⁾ gereinigt und durch Gefrierrocknung isoliert. — **21** enthielt nach *Karl-Fischer-Titration* 2.4% H_2O , die bei den ber. Analysenwerten berücksichtigt wurden.

$C_{24}H_{39}N_3O_2$ (401.6) Ber. C 69.80 H 9.78 N 10.18 Gef. C 70.27 H 9.80 N 9.93

N-Nitro-*N*-dehydroabietyl-guanidin (**22**). — 15.3 g (53 mMol) *Dehydroabietylamin*⁴⁾ (**2**) wurden mit 4.8 g (35 mMol) *N*-Nitro-*S*-methyl-isothioharnstoff in 90 ccm Äthanol 20 Min. unter Rückfluß gekocht und 12 Stdn. stengelassen. Die Kristalle wurden aus Nitromethan umkristallisiert. Ausbeute 11.4 g (88%) vom Schmp. 238–239°.

$C_{21}H_{32}N_4O_2$ (372.5) Ber. C 67.70 H 8.66 N 15.02 Gef. C 67.40 H 8.58 N 14.90

Acetyl-dehydroabietyl-guanidin. — 3.6 g (10 mMol) *Dehydroabietylguanidin-hydrochlorid*⁶⁾ wurden mit 45 ccm Chloroform und 45 ccm 2*n* NaOH 30 Min. gerührt, auf 10–15° gekühlt und mit 2.34 g (30 mMol) *Acetylchlorid* in 15 ccm Chloroform innerhalb von 3 Stdn. versetzt. Es wurde noch 1 Stde. gerührt, die Chloroformschicht abgetrennt, gewaschen, getrocknet und nach Eindampfen aus Diisopropyläther/Tetrahydrofuran (2:1) umkristallisiert. Ausbeute 0.7 g (19%) vom Schmp. 180–182°.

$C_{23}H_{35}N_3O$ (369.5) Ber. C 74.80 H 9.46 N 11.38 Gef. C 74.52 H 9.50 N 11.39

p-Toluolsulfonyl-dehydroabietyl-guanidin. — 3.6 g (10 mMol) *Dehydroabietylguanidin-hydrochlorid*⁶⁾ wurden mit 45 ccm Chloroform und 45 ccm 2*n* NaOH 3 Stdn. gerührt. Die Chloroformschicht wurde abgetrennt, 3 Stdn. über K_2CO_3 getrocknet, mit 0.8 g (5 mMol) *p*-Toluolsulfonylchlorid in 20 ccm Chloroform versetzt, 2 Stdn. gerührt, mit 130 ccm Chloroform verdünnt, gewaschen und getrocknet. Nach Eindampfen wurde aus Äthanol umkristallisiert. Ausbeute 1.1 g (45%) vom Schmp. 203–205°.

$C_{28}H_{39}N_3O_2S$ (481.7) Ber. C 69.78 H 8.16 N 8.73 S 6.65
Gef. 69.79 8.47 8.56 6.72

2-*Dehydroabietyl-amino-pyrimidin* (**23**). — 3.74 g (10 mMol) *Dehydroabietylguanidin-hydrochlorid*⁶⁾ wurden in 100 ccm absol. Äthanol suspendiert, und bis zur Sättigung wurde HCl-Gas eingeleitet. Nach Zusatz von 2.2 g (10 mMol) *Malonaldehyd-tetraäthylacetal* wurde 4 Stdn. gerührt, 12 Stdn. stengelassen, das Filtrat eingedampft, mit Wasser + 2*n* NaOH versetzt, mit Essigester extrahiert und die organische Phase nach dem Trocknen eingedampft. Der Rückstand wurde aus Cyclohexan umkristallisiert. Ausbeute 0.9 g (46%) vom Schmp. 141–143°.

$C_{24}H_{33}N_3$ (363.6) Ber. C 79.28 H 9.15 N 11.56 Gef. C 79.69 H 9.10 N 11.41

Dehydroabietyl-cyanamid (**24**). — 5.7 g (20 mMol) *Dehydroabietylamin*⁴⁾ (**2**) in 20 ccm Äther wurden bei –5° mit 10 ccm 1*n* Bromcyan-Lösung in Äther versetzt. Nach 1 Stde. wurde vom Dehydroabietyl-ammoniumbromid (**2** · HBr) abgesaugt und der Rückstand des eingedampften Filtrats dreimal aus Methanol/Wasser umkristallisiert; Ausbeute 1.12 g (36%) **24** vom Schmp. 131–133°.

$C_{21}H_{30}N_2$ (310.5) Ber. C 81.23 H 9.73 N 9.03 Gef. C 81.52 H 9.85 N 8.93

⁶⁾ Aus Dehydroabietyl-guanidiniumacetat⁵⁾ und konz. Salzsäure; Schmp. 275–281° (aus Äthanol).

N-Dehydroabietyl-O-methyl-isothioharnstoff-hydrochlorid (25). — 0.62 g (2 mMol) **24** wurden in 3.5 ccm 1 *n* methanol. HCl 16 Stdn. bei 20° stengelassen. Zugabe von 10 ccm Äther bei 0° und Absaugen ergab 0.53 g (70%) **25**, nach DC mit Spuren **24** verunreinigt, vom Schmp. 139–141°. 0.24 g wurden erneut mit 2 ccm 1 *n* methanolischer HCl 16 Stdn. bei 4° behandelt. Filtrieren und Kristallisation des eingedampften Filtrats mit Äther/Petroläther ergab 0.09 g reines **25** vom Schmp. 141–142°.

$C_{22}H_{35}ClN_2O$ (379.0) Ber. N 7.39 Cl 9.36 OCH₃ 8.17 Gef. N 7.40 Cl 9.07 OCH₃ 7.87

Dehydroabietylharnstoff (27). — Durch die Lösung von 28.6 g (0.1 Mol) *Dehydroabietylamin*⁴⁾ (**2**) in 100 ccm Toluol bei 20° wurde zunächst 30 Min. HCl-Gas, danach in der Siedehitze Phosgen geleitet, bis sich das Hydrochlorid gelöst hatte (ca. 4 Stdn.). Anschließend wurde mit N₂ gespült und bei Raumtemperatur langsam NH₃ in die Lösung des *Dehydroabietylisocyanats* **26** geleitet. Die NH₃-gesättigte Lösung wurde nach 12 Stdn. eingedampft und aus Diisopropyläther/Tetrahydrofuran (2:1) umkristallisiert. Ausbeute 20.3 g (62%) vom Schmp. 183°.

$C_{21}H_{32}N_2O$ (328.5) Ber. C 76.78 H 9.82 N 8.53 Gef. C 76.78 H 10.07 N 8.58

N-Methyl-N-formyl-dehydroabietylamin (28). — 10.5 g *N-Methyl-dehydroabietylamin* (**19**) wurden in 10.5 ccm Ameisensäure + 3.2 ccm Acetanhydrid gelöst und 20 Stdn. bei 20° stengelassen. Nach 1 Stde. bei 100° wurde eingedampft, nochmals mit 10.5 ccm HCO₂H + 3.2 ccm Acetanhydrid versetzt und 3 Stdn. auf 100° erhitzt. Das nach Eindampfen erhaltene ölige Rohprodukt wurde durch Chromatographie an 300 g Kieselgel mit Methanol/Chloroform (1:1) von noch vorhandenem Ausgangsmaterial getrennt. Ausbeute 9.4 g (82%). — IR: $\nu(C=O) = 1670\text{ cm}^{-1}$. — NMR: $\delta = 2.95\text{ ppm}$ (s; N-CH₃).

N-Methyl-N-propionyl-dehydroabietylamin (29). — 6.0 g (20 mMol) **19** wurden in 5 ccm absol. Dioxan gelöst und 3.2 ccm Pyridin + 3.7 g (40 mMol) Propionylchlorid zugetropft. Nach 24 Stdn. bei 20° wurde aufgearbeitet und das Rohprodukt (7.5 g) weiterverarbeitet.

N-Methyl-N-butyryl-dehydroabietylamin (30). — Es entsteht analog **29** aus **19** und Butyrylchlorid.

N-Methyl-N-lauroyl-dehydroabietylamin (31). — Es entsteht analog **29** aus **19** und Lauroylchlorid. Das Rohprodukt wurde an Kieselgel mit Benzol/Äthanol (98:2) chromatographiert. — IR: $\nu(C=O) = 1660\text{ cm}^{-1}$. — NMR: $\delta = 3.0\text{ ppm}$ (s; N-CH₃).

N-Methyl-N-phenoxyacetyl-dehydroabietylamin (32). — Es entsteht analog **29** aus **19** und Phenoxyacetylchlorid und wurde als Rohprodukt weiterverarbeitet.

Die näheren Angaben zur Darstellung der *Dehydroabietylguanidine* **6–17** sind in Tab. 1 (S. 186), diejenigen für die Herstellung der *tert.-Amine* **33–37** sowie der *quartären Salze* **38–42** in Tab. 2 (S. 188) enthalten.