Arch. Pharm. (Weinheim) 319, 38–42 (1986)

Basisch substituierte Pyrrolidin-2,5-dione, 2. Mitt.¹⁾

Konfiguration der Enantiomere

Joachim Knabe* und Horst Konrad⁺Fachrichtung Pharmazeutische Chemie der Universität des Saarlandes, Im Stadtwald,
D-6600 Saarbrücken

Eingegangen am 2. November 1984

Aus den ORD- und CD-Spektren der in Ethanol rechtsdrehenden Enantiomere der Pyrrolidindione **1a–1c** ergibt sich, daß sie gleiche Konfiguration besitzen. Der chemische Abbau von (+)**1c** führt zu *R*(+)-3-Ethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion [*R*(+)-**1i**]. Hieraus läßt sich für (+)**1a** – (+)**1c** *R*-Konfiguration ableiten. (+)**3a** und (+)**3b**, durch katalytische Hydrierung von (+)**1a** und (+)**1b** gewonnen, besitzen ebenfalls *R*-Konfiguration. Die ORD- und CD-Spektren der 3-(2-Thienyl)pyrrolidindione (+)**2a** und (+)**2b** zeigen, daß beide Verbindungen gleich konfiguriert sind.

Pyrrolidine-2,5-diones with Basic Substituents, II: Configurations of the Enantiomers

The ORD and CD spectra of the enantiomers (+)**1a** – (+)**1c**, which are dextrorotatory in ethanol, show that these compounds possess identical configurations. Chemical degradation of (+)**1c** leads to *R*(+)-3-ethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione [*R*(+)-**1i**]. Therefrom *R*-configuration is deduced for (+)**1a** – (+)**1c**. Compounds (+)**3a** and (+)**3b**, obtained by catalytical hydrogenation of (+)**1a** and (+)**1b**, possess *R*-configuration, too. From the very similar ORD and CD spectra of the 3-(2-thienyl)pyrrolidinediones (+)**2a** and (+)**2b** it can be concluded that both compounds possess identical configurations.

In der vorhergehenden Mitt.¹⁾ wurde über die Herstellung der Racemate und der Enantiomere der *N*-Methylpyrrolidindione **1a–1d**, **2a–2c** und **3a–3d** berichtet.

1-3

Zur Ableitung der relativen Konfiguration der gewonnenen 1-2-Enantiomere wurden deren CD- und ORD-Spektren herangezogen. Die CD-Spektren von (+)**1a** – (+)**1c** weisen 2 Cottoneffekte auf, die in Lage und Intensität gut übereinstimmen (vgl. Abb. 1 und Exp. Teil). Auch die ORD-Spektren von (+)**1a** – (+)**1c** sind fast deckungsgleich (Abb. 2). Danach besitzen die basisch substituierten 3-Phenylpyrrolidindione (+)**1a** – (+)**1c** gleiche Konfiguration. Zur Ermittlung der absoluten Konfiguration von (+)**1a** – (+)**1c** wurde (+)**1c** zu *R*(+)-3-Ethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion [*R*(+)-**1i**]

abgebaut. Da der Abbau ohne Angriff am Chiralitätszentrum erfolgt, verläuft er unter Konfigurationserhalt. (+)1a – (+)1c besitzen demnach *R*-Konfiguration. Dies trifft auch für (+)3a und (+)3b zu, die durch katalytische Hydrierung von (+)1a und (+)1b erhalten wurden.

Die Korrelierung von (+)1c sollte nach Quaternisierung zu 1f durch (eventuell mehrmaligen) *Hofmann*-Abbau relativ problemlos zur Vinylverbindung 1g führen, die dann durch katalytische Hydrierung 1i ergeben sollte. Als dieser Abbau zunächst an racem. 1d studiert wurde, zeigte sich, daß beim *Hofmann*-Abbau von 1e nicht das erwartete 1g, sondern der Alkohol 1h entstanden war, wie dies mehrfach in der Literatur für Produkte des *Hofmann*-Abbaus beschrieben ist²⁾. Auch bei Variation der Abbaubedingungen wurde stets 1h erhalten. Da die Dehydratisierung von 1h zu 1g drastische Bedingungen erfordert, wurde zur Überführung von 1h in 1i ein Verfahren von *Hutchins*³⁾ angewandt, bei dem in einer Eintopfreaktion zunächst die Hydroxylgruppe durch Iod substituiert und das gebildete Iodid anschließend durch Reduktion mit Natriumcyanoborhydrid in das gewünschte Endprodukt 1i verwandelt wird. Hierzu wurde der Alkohol 1h in Hexamethylphosphortriamid⁴⁾ mit Methyltriphenoxyphosphoniumiodid⁵⁾ erwärmt. Die abgekühlte Lösung wurde mit Natriumcyanoborhydrid⁷⁾ versetzt und auf 70° erwärmt. Aus dem Etherextrakt wurde 1i durch SC gewonnen.

Diese Abbaureaktion wurde auf 1f übertragen, das aus (+)1c gewonnen wurde. Dabei trat die zusätzliche Schwierigkeit auf, daß der *Hofmann*-Abbau bis zum Erhalt von einheitlichem 1h mehrmals durchgeführt werden mußte, da die drei Ethylsubstituenten am Stickstoff in etwa gleichberechtigt sind. Schließlich wurde *R*(+)-1i erhalten. Da die Rangfolge der Substituenten in (+)1c und in *R*(+)-1i nach der Sequenzregel die gleiche ist, ergibt sich für (+)1a – (+)1c, (+)3a und (+)3b *R*-Konfiguration.

Die CD- und ORD-Spektren der 3-(2-Thienyl)-Verbindungen (+)2 unterscheiden sich erwartungsgemäß deutlich von denen der 3-Phenylpyrrolidindione (+)1. Sie verlaufen jedoch für (+)2a und (+)2b so ähnlich (Abb. 3 und 4), daß hieraus für diese Enantiomere gleiche Konfiguration abgeleitet werden kann. Die Frage nach der absoluten Konfiguration der optisch aktiven 3-(2-Thienyl)pyrrolidindione 2 bleibt vorläufig offen.

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemischen Industrie für die Förderung dieser Untersuchungen.

Experimenteller Teil

Allg. Angaben vgl.¹⁾. CD- und ORD-Spektren: Automatic Recording Spectropolarimeter Jasco J-20, Japan Spectroscopic Co., Ltd., in Quarzküvetten mit 1, 0,5, 0,1 und 0,02 cm Schichtdicke bei Raumtemp. in Methanol.

(+)-1-Methyl-3-phenyl-3-(1-piperidyl)-ethyl-pyrrolidin-2,5-dion [*R*(+)1a]: CD: λ_{nm} ($[\Theta]$) = 248 (-5200), 235 (0), 207 (+44600). ORD: λ_{nm} ($[\Phi]$) = 281 (+1400), 268 (+400), 215 (+23200), 208 (0), 200 (-23600).

(+)-1-Methyl-3-phenyl-3-(1-pyrrolidyl)-ethyl-pyrrolidin-2,5-dion [*R*(+)1b]: CD: λ_{nm} ($[\Theta]$) = 248 (-5200), 233 (0), 207 (+44400). ORD: λ_{nm} ($[\Phi]$) = 284 (+1200), 270 (+800), 216 (+25200), 206 (0), 200 (-15900).

(+)-3-Diethylaminoethyl-1-methyl-3-phenyl-pyrrolidin-2,5-dion [*R*(+)1c]: CD: λ_{nm} ($[\Theta]$) = 250 (-4000), 236 (0), 208 (+51900). ORD: λ_{nm} ($[\Phi]$) = 276 (+2100), 263 (+800), 215 (+24100), 208 (0).

(+)-1-Methyl-3-(1-piperidyl)-ethyl-3-(2-thienyl)-pyrrolidin-2,5-dion [(+)2a]: CD: λ_{nm} ($[\Theta]$) = 257 (-21700), 245 (0), 233 (+17600), 218 (+1400), 206 (+26200). ORD: λ_{nm} ($[\Phi]$) = 352 (0), 264 (-15000), 256 (0), 244 (+18800), 232 (0), 223 (-9000), 216 (0), 212 (+2600), 210 (0).

Abb. 1: CD-Spektren von (+) 1a [—], (+) 1b [---] und (+) 1c [+++++]

Abb. 2: ORD-Spektren von (+) 1a [—], (+) 1b [---] und (+) 1c [+++++]

(+)-1-Methyl-3-(1-pyrrolidyl)-ethyl-3-(2-thienyl)-pyrrolidin-2,5-dion [(+)**2b**]: CD: λ_{nm} ($[\Theta]$) = 255 (-25600), 245 (0), 233 (+20700), 218 (+2900), 206 (+32300). ORD: λ_{nm} ($[\Phi]$) = 500 (0), 265 (-7200), 260 (0), 245 (+34200), 225 (+3400), 212 (+18300), 206 (0).

Abb. 3: CD-Spektren von (+) 2a [—] und (+) 2b [---]

Abb. 4: ORD-Spektren von (+) 2a [—] und (+) 2b [---]

3-Hydroxyethyl-1-methyl-3-phenyl-pyrrolidin-2,5-dion (**1h**)

Zu einer Lösung von 3 g (10 mmol) **1d** in 10 ml Nitromethan wurden 6 g CH_3I in 10 ml Nitromethan gegeben. Das Gemisch wurde 1 h stehengelassen und danach 1 h unter Rückfluß im Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkühlen wurden das Lösungsmittel und überschüssiges Methyljodid i. Vak. entfernt. Das Methoiodid wurde aus Essigsäureethylester kristallin erhalten und aus Ethanol umkristallisiert. Ausb.: 3,4 g (85 % d. Th.). Schmp. 185°. IR (KBr): 1770, 1700 cm^{-1} (CO). $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 7,5 (s; 5H arom.), 3,2 (s; 14H, 4 NCH_3 und CH_2), 3,0-2,6 (m; 4H, 2 CH_2). $\text{C}_{16}\text{H}_{23}\text{IN}_2\text{O}_2$ (402,28) Ber. C 47,8 H 5,76 N 7,0 Gef. C 47,7 H 5,77 N 7,1.

3,0 g (7,5 mmol) Methiodid wurden in Wasser gelöst über einen stark basischen Anionenaustauscher (Ionenaustauscher III, Merck, $\text{OH}^{\ominus}$ -Form) gegeben. Durch Einengen der wäßrigen Lösung in der Hitze wurde 3-Hydroxyethyl-1-methyl-3-phenyl-pyrrolidin-2,5-dion **1h** erhalten. Ausb. 1,3 g (72 % d. Th.). Schmp. 52°. IR (KBr): 3440 (OH), 1770, 1700 cm^{-1} (CO). $^1\text{H-NMR}$: (CDCl_3) δ (ppm) = 7,3 (s; 5H arom.), 3,6 (t; CH_2), 3,1 (s; CH_2), 3,0 (s; NCH_3), 2,3 (t; CH_2). $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{NO}_3$ (233,27) Ber. C 66,9 H 6,48 N 6,0 Gef. C 67,0 H 6,52 N 6,1.

3-Ethyl-1-methyl-3-pyrrolidin-2,5-dion (**1i**)

1 g (4,3 mmol) **1h** wurde durch 1stdg. Erhitzen mit 3,1 g (6,8 mmol) Methyl-triphenoxyphosphoniomidid in 20 ml Hexamethylphosphortriamid (HMPT) in 3-Iodethyl-1-methyl-3-phenyl-pyrrolidin-2,5-dion überführt, das nicht isoliert wurde. Nach dem Abkühlen wurde mit 2,2 g (35 mmol) NaBH_3CN versetzt und weitere 2 h auf 70° erhitzt. Das bei der Reduktion entstandene **1i** wurde nach Versetzen des Reaktionsgemischs mit gesättigter Kochsalzlösung durch Extraktion mit Ether erhalten. Zur Reinigung von beigemischem Methyldiphenylphosphonat wurde über Kieselgel säulenchromatographiert. Säule: Kieselgel 60, Korngröße 0,2–0,5 mm, CH_2Cl_2 /Essigsäureethylester (19 : 1). Schmp. 31°. IR (KBr): 1770, 1700 cm^{-1} (CO). $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 7,3 (s; 5H arom.), 3,0 (s; 5H, NCH_3 und CH_2), 2,1 (q; CH_2), 0,9 (t; CH_3).

Optisch aktives 3-Hydroxyethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion (**1h**)

Zu einer Lösung von 3 g (+) **1c** in 10 ml Nitromethan wurden 6 g CH_2I in 10 ml Nitromethan gegeben. Das Gemisch wurde 1 h stehengelassen und danach 1 h unter Rückfluß im Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde das Lösungsmittel und überschüssiges Methyljodid i. Vak. entfernt. Das ölige Methiodid wurde ungereinigt in Wasser gelöst und über einen stark basischen Anionenaustauscher (Ionenaustauscher III, Merck, $\text{OH}^{\ominus}$ -Form) gegeben. Beim Verkochen der erhaltenen wäßrigen Lösung wurde unter Ringöffnung ein Gemisch aus Hydroxyethyl- und (Ethylmethyl)-aminoethyl-bernsteinsäureamid erhalten. Anschließend thermischer Ringschluß mit der doppelt molaren Menge Methylamin bei 215° führte wieder zu den jeweiligen Pyrrolidin-2,5-dionen. Nach Extraktion von Hydroxyethyl-pyrrolidin-2,5-dion mit Ether wurde der Rückstand einer weiteren Methylierung mit anschließendem Hofmann-Abbau unterworfen.

Optisch aktives 3-Ethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion (**1i**)

1 g (4,3 mmol) **1h** wurde durch 1 h Erhitzen mit 3,1 g (6,8 mmol) Methyl-triphenoxyphosphoniomidid in 20 ml Hexamethylphosphortriamid (HMPT) in 3-Iodethyl-1-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion überführt, das nicht isoliert wurde. Nach dem Abkühlen wurden 2,2 g (35 mmol) NaBH_3CN zugefügt und 2 h auf 70° erhitzt. Das bei der Reduktion entstandene **1i** wurde nach Versetzen des Reaktionsgemischs mit gesättigter Kochsalzlösung durch Extraktion mit Ether erhalten und zur Reinigung über Kieselgel säulenchromatographiert. Säule: Kieselgel 60, Korngröße 0,2–0,5 mm, CH_2Cl_2 /Essigsäureethylester (19 : 1). Schmp. 47°. $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +15,5$ ($c = 0,45$; Methanol).

Literatur

^{+) Teil der Dissertation H. Konrad, Saarbrücken 1984.}

1. Mitt.: J. Knabe und H. Konrad, Arch. Pharm. (Weinheim) 318, 1015 (1985).
2. s. z.B. C. K. Ingold und C. S. Patel, J. Chem. Soc. 1933, 67; E. D. Hughes und C. K. Ingold, J. Chem. Soc. 1933, 69; E. D. Hughes, C. K. Ingold und C. S. Patel, J. Chem. Soc. 1933, 526.
3. R. O. Hutchins, B. E. Maryanoff und C. A. Milewski, Chem. Commun. 1971, 1097.
4. H. Normant, Angew. Chem. 79, 1046 (1967).
5. J. P. H. Verheyden und J. G. Moffatt, J. Org. Chem. 35, 2319 (1970).
6. S. R. Landauer und H. N. Rydon, J. Chem. Soc. 1953, 2224.