- 22 M. Kuchár, V. Rejolec and O. Němecěk, *Drugs Fut.* 7, 179 (1982).
- 23 J. Hine, *Physical Organic Chemistry*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York 1962.
- 24 M. Charton, *Progr. Phys. Org. Chem.* 13, 119 (1981).
- 25 E. J. King, *Acid Base Equilibria*, in *The International Encyclopedia of Physical Chemistry and Chemical Physics*, E. A. Guggenheim, J. E. Mayer and F. C. Thompson Eds., The Mac Millan Company, New York 1965.
- 26 R. W. Taft jr., *J. Phys. Chem.* 64, 1805 (1960).
- 27 R. P. Bell, *The Proton in Chemistry*, 2nd, Ed., chap. 4, Chapman and Hall, London 1969.
- 28 C. D. Richtie, in *Solute Solvent Interaction*, chap. 4, J. F. Coetzee and C. D. Richtie Eds., M. Dekker, New York 1969.
- 29 I. M. Kolthoff and M. K. Chantooni, *J. Am. Chem. Soc.* 93, 3843 (1971).
- 30 N. M. Ballash, E. B. Robertson and M. D. Sokolowski, *Trans. Faraday Soc.* 66, 2622 (1970).
- 31 J. C. Halle, R. Gaboriaud and R. School, *Bull. Soc. Chim. Fr.* 1970, 2047.
- 32 T. Y. Shen, *Chim. Ther.* 2, 459 (1967).
- 33 N. N., *Chem. Eng. News* 45, 10 (1967).

[Ph 827]

Arch. Pharm. (Weinheim) 317, 883–890 (1984)

Borkomplexe von Malondiimidsäureestern und Dithiomalon-diimidsäureestern

Barbara Krug und Klaus Hartke*

Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität Marburg, Marbacher Weg 6,
D-3550 Marburg/Lahn
Eingegangen am 22. Juli 1983

Malondiimidsäure-diethylester (**2**) bildet mit Bortrifluoridetherat entweder das 4,6-Diethoxy-2,2-difluor-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (**5**) oder dessen Tetrafluorborat **4**. Analog kondensiert **2** mit Diphenylborsäure-ethylester (**7a**), Triethylboran (**7b**) und Borsäuretrimethylester (**7c**) zu den Neutralkomplexen **8a–c**, die sich zum Teil mit Tetrafluorborat zu den Salzen **9a, b** protonieren lassen. Die Umsetzung von Dithiomalon-diimidsäure-dimethylester, der in der tautomeren Form **12** vorliegt, liefert mit **7** die Neutralkomplexe **13a–c** bzw. nach Protonierung die Tetrafluorborate **14a, b**.

Boron Complexes of Malonodiimides and Dithiomalonodiimides

Diethyl malonodiimide (**2**) reacts with boron trifluoride etherate to form 4,6-diethoxy-2,2-difluoro-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadiene (**5**) or its tetrafluoroborate (**4**). In a similar manner, **2** condenses with ethyl diphenyl borate (**7a**), triethylborane (**7b**) or trimethyl borate (**7c**) to give the neutral complexes **8a–c**. These can be partially protonated with HBF_4 to yield the salts **9a, b**. Reaction of **7** with dimethyl dithiomalonodiimide, which exists in the tautomeric form **12**, leads to the isolation of the neutral complexes **13a–c**. Protonation of **13a, b** with HBF_4 yields the tetrafluoroborates **14a, b**.

Die ersten cyclischen Koordinationsverbindungen des Bors mit β -Diketonen wurden 1905 von *Dilthey* und *Mitarb.*¹⁾ beschrieben. Seither sind anstelle von β -Diketonen zahlreiche weitere 6π -Liganden wie β -Ketoimine, 1,3-Diimine, N-Acylamide, N-Acylamide und Biguanide eingesetzt worden²⁾. Cyclische Koordinationsverbindungen des Bors mit Malonsäurederivaten wurden u.W. bisher noch nicht untersucht. Wir haben kürzlich zeigen können, daß Malonamide und Malonamide sechsgliedrige, cyclische Borkomplexe bilden³⁾ und beschreiben nachstehend weitere Untersuchungen mit Malondiimidsäureestern und Dithiomalondiimidsäureestern.

Einige acyclische Borkomplexe mit Imidoestern einfacher Monocarbonsäuren wurden vor einigen Jahren als Raketentreibstoffe patentiert⁴⁻⁶⁾. Ferner sind Additionen von Bor-thioethern an Nitrile bekannt geworden, die zu viergliedrigen Borstickstoffheterocyclen mit Thioimidoester-Struktur führen^{7⁸⁾}. Außerdem findet man in der Literatur verschiedene acyclische Borkomplexe mit Thioimidoestern einfacher Monocarbonsäuren als Liganden⁹⁾.

Borkomplexe mit Malondiimidsäureestern

Nach Untersuchungen von *McElvain* und *Mitarb.*^{10¹¹⁾} läßt sich das aus Malondinitril erhältliche Malondiimidsäure-diethylesterdihydrochlorid (**1**) mit Kaliumcarbonat-Lösung bei 0° zum Malondiimidsäure-diethylester (**2**) deprotonieren. Wir erhielten dabei jedoch schlecht trennbare Gemische aus **2** und dem 3-Amino-3-ethoxyacrylnitril (**3**). Die Bildung von **3** wird nach unseren Erfahrungen durch überschüssigen, in kristallinem **1** eingeschlossenen Chlorwasserstoff verursacht, der sich durch mehrtägiges Trocknen über Natriumhydroxid an der Ölpumpe entfernen läßt. So behandeltes **1** lieferte den reinen Imidoester **2** in fast quantitativer Ausbeute. Er ist bei Raumtemp. mehrere Stunden stabil, zersetzt sich dann aber unter allmählicher Verfärbung zu einer bräunlich-glasigen Masse.

Bei der Umsetzung von **2** mit Bortrifluoridetherat erhält man je nach den Molverhältnissen der Edukte unterschiedliche Produkte. Aus 1 mol **2** und 2 mol Bortrifluoridetherat entsteht in siedendem Chloroform der kationische Komplex **4** als Tetrafluorborat. Demgegenüber bildet sich bei Raumtemp. aus äquimolaren Mengen **2** und Bortrifluoridetherat der Neutralkomplex **5** und das Tetrafluorborat **6**; beide lassen sich auf Grund ihrer unterschiedlichen Löslichkeit leicht trennen. Wie wir an anderen Beispielen gezeigt haben³⁾, sollten **4** und **5** leicht wechselseitig ineinander umzuwandeln sein, z.B. Deprotonierung von **4** mit Triethylamin und Protonierung von **5** mit etherischer Tetrafluorborsäure. Der kationische Komplex **4** wird in wäßriger Lösung leicht zu Malonsäurediethylester hydrolysiert.

Bei Kondensation von Malondiimidsäure-diethylester (**2**) mit solchen Borverbindungen, die keine Säuren abspalten, entstehen unmittelbar die Neutralkomplexe **8**, wie die Beispiele Diphenylborsäure-ethylester (**7a**), Triethylboran (**7b**) und Borsäuretrimethylester (**7c**) zeigen. Von diesen ist der Komplex **8c** am unbeständigsten. Er zersetzt sich bereits bei Protonierung mit etherischer Tetrafluorborsäure bei Raumtemperatur, während **8a, b** dabei in die Salze **9a, b** übergehen.

Die Struktur der Neutralkomplexe **5** und **8a-c** sowie der Tetrafluorborate **4** und **9a, b** geht eindeutig aus ihren analytischen und spektroskopischen Daten hervor, die im Exper. Teil aufgeführt sind. So sollte für **5** und **8a-c** im ¹H-NMR-Spektrum das Signal des olefinischen Protons in 5-Position charakteristisch sein. In der Mehrzahl der Fälle fällt es bei ca. $\delta = 4$ ppm jedoch unter das Quadruplett der O-Ethylgruppe. Klar erkennbar ist es

Schema 1

nur bei **8b** als schwach aufgespaltenes Triplett infolge einer kleinen ^4J -Kopplung mit 1-H und 3-H. Eine eindeutigere Information gibt das ^{13}C -NMR-Spektrum. Hier findet man das C-5-Signal bei ca. $\delta = 60$ ppm als Dublett mit einer ^1J -Kopplung von ca. 170 Hz, wie sie für einen sp^2 -Kohlenstoff charakteristisch ist. Die auf den ersten Blick überraschend hochfeldige Verschiebung von 5-H und C-5 steht mit der Vinamidinstruktur des Borliganden durchaus im Einklang¹²⁾. Bei den Kationen **4** und **9a, b** liegt C-5 als sp^3 -Kohlenstoff vor und zeigt daher im ^1H -NMR ein 2-Protonensignal als schwach verbreitertes Singulett um $\delta = 3,75$ ppm und im ^{13}C -NMR-Spektrum ein Triplett bei ca. 33 ppm (^1J etwa 135 Hz). Außerdem ist die positive Teilladung auf den Ethoxygruppen der Kationen größer als bei den Neutralkomplexen. Dies führt zu einer deutlichen Tieffeldverschiebung, im ^1H -Spektrum von $\delta =$ ca. 4.0 nach ca. 4.4 ppm, im ^{13}C -NMR-Spektrum von 60–65 ppm nach ca. 70 ppm.

Borkomplexe mit Dithiomalon-diimidsäureestern

Die als Ausgangsmaterial benötigten Dithiomalon-diimidsäureester haben wir nicht durch einfache Deprotonierung der Dithiomalon-diimidsäure-dialkylester-dihydrochloride gewinnen können, die ihrerseits aus Malondinitril, Mercaptan und Chlorwasserstoffgas leicht erhältlich sind¹³⁾. Trotz unserer Erfahrung mit **1** isolierten wir dabei überwiegend 3-Amino-3-alkylthio-acrylnitrile als Eliminierungsprodukte. Daher gingen wir von

Malondithioamid (**10**) aus, das sich mit Methyljodid zum Dithiomalondiimidsäure-dimethylester-dihydroiodid (**11**) alkylieren läßt¹⁴. Deprotonierung von **11** mit Natriumhydrogencarbonat-Lösung liefert dann die analysenreine Base, die jedoch im Gegensatz zum Sauerstoffanalogen **2** nicht als Dithiomalondiimidsäure-dimethylester, sondern in der tautomeren Form **12** als 3-Amino-3-methylthio-thioacryl-imidsäure-methylester vorliegt. Die spektroskopischen Daten sprechen für eine wasserstoffverbrückte, symmetrische Struktur: ¹H-NMR (CCl₄): δ (ppm) = 7.30 (br. s, 3 NH), 4.60 (s, 2-H), 2.27 (s, 2 SCH₃). – ¹³C-NMR (CDCl₃): δ (ppm) = 160.6 (s, C-1, -3), 89.7 (d, C-2, ¹J = 164 Hz), 12.3 (q, 2 SCH₃).

Schema 2

12 kondensiert mit Borverbindungen, die dabei keine Säuren freisetzen, zu den Neutralkomplexen **13**. Diese Reaktion läuft mit Diphenylborsäure-ethylester (**7a**) und Borsäuretrimethylester (**7c**) bereits bei Raumtemp. ab, während mit Triethylboran (**7b**) mehrstündiges Kochen in THF erforderlich ist. Die Protonierung von **13a, b** mit etherischer Tetrafluorborsäure liefert die Salze **14a, b**; **13c** zersetzte sich bei diesen Versuchen.

Die im Exp. Teil angegebenen spektroskopischen Daten der Neutralkomplexe **13a-c** und der Tetrafluorborate **14a, b** zeigen im Vergleich zu den bereits beschriebenen Verbindungen **4, 5, 8** und **9** keine Besonderheiten.

Dem Verband der Chemischen Industrie – Fonds der Chemie – danken wir für die Förderung dieser Arbeit.

Experimenteller Teil

IR-Spektren: Perkin Elmer PE 257 und 398. *¹H-NMR-Spektren* (TMS inn. Stand.): Varian T 60 und XL 100 sowie Jeol JNM-FX 100; *¹³C-NMR-Spektren* (TMS inn. Stand.): Varian XL 100 und Jeol JNM-FX 100; *¹¹B-Spektren* (Bortrifluoridetherat inn. Stand.) und *¹⁹F-Spektren* (Hexafluorbenzol inn. Stand.): Jeol JNM-FX 100. *Massenspektren:* Varian MAT 111 und Vacuum Generators 70–70. *Schmp.:* Linström-Gerät, Temperaturangaben unkorrt.

Malondiimidsäurediethylester (**2**)

23.1 g (0.1 mol) **1** (dargestellt nach Lit.¹⁰) in wasserfreiem Benzol werden unter Feuchtigkeitsabschluß mit Diethylether gewaschen und einige Tage i. Ölpumpenvak. über Natriumhydroxid

getrocknet. Anschließend wird das Salz in Diethylether suspendiert und bei -10° mit überschüssiger gesättigter Kaliumcarbonat-Lösung versetzt. Nach kräftigem Schütteln trennt man die Phasen, extrahiert die wäßrige Phase mit Ether, trocknet, dampft i. Vak. ein und destilliert den Rückstand an der Ölpumpe: 14.5 g (92 %) einer farblosen Flüssigkeit vom Sdp._{0,1}: 41° (Lit.¹⁰ Sdp._{0,4}: $62-63^\circ$). – $^1\text{H-NMR}$ (CCl_4): δ (ppm) = 7.11 (mc, 2H, NH), 4.11 (q, 4H, OCH_2), 3.03 (s, 2H, CH_2), 1.28 (t, 6H, CH_3). – IR (KBr): 3350–3240, 2985, 1650, 1375, 1340, 1265, 1090, 1040, 840 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-difluor-1,3-diazonia-2-borato-3,6-cyclohexadien-tetrafluorborat (**4**)

Eine Lösung von 2.5 g (15,8 mmol) **2** in 30 ml CHCl_3 wird unter Rühren zu 4.48 g (31.6 mmol) Bortrifluoridetherat in 20 ml CHCl_3 getropft, 6 h zum Sieden erhitzt und über Nacht bei Raumtemp. stehengelassen. Die ausgefallenen Kristalle werden aus Acetonitril umkristallisiert: 2.43 g (52 %) farblose Nadeln vom Schmp. 145° . $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{B}_2\text{F}_6\text{N}_2\text{O}_2$ (293.8) Ber. C 28.6 H 4.80 N 9.5 Gef. C 28.5 H 4.94 N 9.5. – $^1\text{H-NMR}$ (CD_3CN): δ (ppm) = 8.93 (mc, 2H, NH), 4.40 (q, 4H, OCH_2), 3.87 (mc, 2H, 5-H), 1.41 (t, 6H, CH_3). – $^{13}\text{C-NMR}$ (CD_3CN): δ (ppm) = 178.8 (C-4, -6), 70.0 (OCH_2 , $^1\text{J} = 151$ Hz), 34.4 (im gek. Spektrum br. Multipllett, deshalb ^1J nicht bestimmbar), 13.8 (CH_3). – IR (KBr): 3360, 3240, 2990, 2960, 1690, 1643, 1518, 1255, 1160–990 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-difluor-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (**5**)

Eine Lösung von 2.7 g (19 mmol) Bortrifluoridetherat in 10 ml CHCl_3 wird unter Rühren bei Raumtemp. zu 3.0 g (19 mmol) **2** in 5 ml CHCl_3 getropft. Nach 1 h wird ausgefallenes **6** abfiltriert, das Filtrat i. Vak. eingedampft und der Rückstand aus CHCl_3 umkristallisiert: 1.9 g (49 %) farblose Nadeln vom Schmp. 135° . $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{BF}_2\text{N}_2\text{O}_2$ (206.0) Ber. C 40.8 H 6.36 N 13.6 Gef. C 40.8 H 6.58 N 12.8. – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 5.80 (mc, 2H, NH), ca. 4.30 (liegt unter q, 1H, 5-H), 4.13 (q, 4H, CH_2), 1.34 (t, 6H, CH_3). – $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 167.5 (C-4, -6), 64.7 (CH_2 , $^1\text{J} = 147$ Hz), 60.7 (C-5, $^1\text{J} = 170$ Hz), 13.8 (CH_3). – IR (KBr): 3390, 3340, 2995, 2940, 1575, 1500, 1400, 1200, 1125–1010 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-diphenyl-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (**8a**)

Unter Stickstoff werden bei Raumtemp. zu einer Lösung von 2.1 g (10 mmol) Diphenylborsäureethylester (**7a**) in 30 ml CHCl_3 unter Rühren 1.6 g (10 mmol) **2** in 20 ml CHCl_3 getropft. Nach 1 h wird ohne Erwärmen i. Vak. auf etwa die Hälfte eingeeengt, ausgefallener Feststoff abfiltriert und getrocknet: 3.2 g (99 %) farblose Kristalle vom Schmp. 130° . $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{BN}_2\text{O}_2$ (322.2) Ber. C 70.8 H 7.19 N 8.7 Gef. C 70.7 H 7.36 N 8.6. – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 7.30 (mc, 10 arom. H), 5.10 (mc, 2H, NH), ca. 4.0 (liegt unter q, 1H, 5-H), 3.97 (q, 4H, CH_2), 1.30 (t, 6H, CH_3). – $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 168.6 (C-4, -6), 152.9 (mc, C-1'), 132.0 (C-2'), 127.1 (C-3'), 125.5 (C-4'), 63.6 (OCH_2 , $^1\text{J} = 145$ Hz), 58.6 (C-5, $^1\text{J} = 168$ Hz), 14.4 (CH_3). – IR (KBr): 3415, 3395, 2985, 2940, 1620, 1545, 1455, 1175, 870, 745, 705, 652 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-diethyl-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (**8b**)

22 ml einer 1M Lösung von Triethylboran in THF werden unter Stickstoff mit 3.5 g (22 mmol) **2** 10 h unter Rückfluß gekocht. Nach Eindampfen i. Vak. bleibt ein gelbes Öl zurück, das allmählich erstarrt und aus Petrolether kristallisiert: 2.25 g (98 %) farblose Nadeln vom Schmp. 47° . $\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{BN}_2\text{O}_2$ (226.1) Ber. C 58.4 H 10.25 N 12.4 Gef. C 58.2 H 10.44 N 12.4. – $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 4.43 (mc, 2H, NH), 4.02 (q, 4H, OCH_2), 3.82 (t, ^4J -Kopplung mit NH, 1H, 5-H), 1.35 (t, 6H, OCCCH_3), 0.76 (mc, 6H, BCCH_3), 0.19 (mc, 4H, BCH_2). – $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) = 169.0 (C-4, -6), 63.0 (OCH_2 , $^1\text{J} = 145$ Hz), 56.6 (C-5, $^1\text{J} = 168$ Hz), 17.1 (mc, BCH_2), 14.4 (OCCCH_3), 9.1 (BCCH_3). – IR (KBr): 3390, 2995, 2940, 2865, 1623, 1548, 1470, 1176, 1060, 1020, 870, 746 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-dimethoxy-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (8c)

1.6 g (10 mmol) **2** werden in 20 ml Diethylether mit 2.2 g (20 mmol) Borsäuretrimethylester 4 h unter Rückfluß gekocht und anschließend 10 h bei Raumtemp. gerührt. Die ausgefallenen farblosen Kristalle (1.55 g, 67 %) werden mit Ether gewaschen. Schmp. 154° (Zers.). $C_9H_{19}BN_2O_4$ (230.1) Ber. C 47.0 H 8.32 N 12.2 Gef. C 46.9 H 8.10 N 12.3. – 1H -NMR ($CDCl_3$): δ (ppm) = 5.44 (mc, 2H, NH), 4.10 (liegt unter q, 1H, 5-H), 4.00 (q, 4H, OCH_2), 3.10 (mc, 6H, OCH_3), 1.31 (t, 6H, CCH_3). – ^{13}C -NMR ($CDCl_3$): δ (ppm) = 169.2 (C-4, -6), 63.5 (OCH_2 , $^1J = 146$ Hz), 59.6 (C-5, $^1J = 169$ Hz), 49.1 (OCH_3), 14.3 (CCH_3). – ^{11}B -NMR ($CDCl_3$): 1.7 (s). – IR (KBr): 3185, 2935, 2815, 1615, 1553, 1472, 1160, 1120, 1100, 1072, 966, 952 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-diphenyl-1,3-diazonia-2-borato-3,6-cyclohexadien-tetrafluoroborat (9a)

Unter Rühren und Argon-Begasung wird eine Lösung von 500 mg (1.55 mmol) **8a** in 15 ml $CHCl_3$ zu 250 mg (1.55 mmol) 54proz. etherischer Tetrafluorborsäure in 20 ml Diethylether getropft. Es fallen sofort 570 mg (90 %) farblose, analysenreine Kristalle vom Schmp. 157° (Zers.) aus. $C_{19}H_{24}B_2F_4N_2O_2$ (410.0) Ber. C 55.7 H 5.90 N 6.8 Gef. C 55.1 H 5.86 N 6.8. – 1H -NMR (CD_3CN): δ (ppm) = 8.88 (mc, 2H, NH), 7.34 (mc, 10 arom. H), 4.39 (q, 4H, OCH_2), 3.77 (s, 2H, 5-H), 1.38 (t, 6H, CH_3). – ^{13}C -NMR (CD_3CN): δ (ppm) = 168.5 (C-4, -6), 145.6 (C-1'), 133.9 (C-2'), 128.3 (C-3'), 127.9 (C-4'), 69.2 (OCH_2 , $^1J = 151$ Hz), 33.6 (C-5). – IR (KBr): 3260, 3000, 1680, 1640, 1510–1450, 1223, 1115–985, 895, 750, 705 cm^{-1} .

4,6-Diethoxy-2,2-diethyl-1,3-diazonia-2-borato-3,6-cyclohexadien-tetrafluoroborat (9b)

Unter Argon und Rühren wird bei Raumtemp. zu einer Lösung von 500 mg (2.2 mmol) **8b** in 20 ml Diethylether 360 mg (2.2 mmol) 54proz. ether. Tetrafluorborsäure in 20 ml Diethylether getropft. 620 mg (90 %) fallen sofort als farbloser Feststoff aus. Schmp. 124° (Zers.). $C_{11}H_{24}B_2F_4N_2O_2$ (313.9) Ber. C 42.1 H 7.71 N 8.9 Gef. C 42.1 H 7.89 N 8.9. – 1H -NMR (CD_3CN): δ (ppm) = 8.26 (mc, 2H, NH), 4.34 (q, 4H, OCH_2), 3.69 (s, 2H, 5-H), 1.40 (t, 6H, $OCCH_3$), 0.57 (mc, 10 H, BCH_2 , und $BCCH_3$). – ^{13}C -NMR (CD_3CN): δ (ppm) = 167.4 (C-4, -6), 68.1 (OCH_2 , $^1J = 150$ Hz), 32.8 (C-5, $^1J = 134$ Hz), ca. 14 (mc, BCH_2), 13.9 ($OCCH_3$), 9.1 ($BCCH_3$). – IR (KBr): 3275, 3100–2800, 1685, 1650, 1490–1440, 1395, 1227, 1210, 1170–990, 890 cm^{-1} .

3-Amino-3-methylthio-thioacrylimidsäuremethylester (12)

4.2 g (10 mmol) **11** (dargestellt nach Lit.¹⁴⁾) werden bei 0° mit einer gesättigten Natriumhydrogencarbonatlösung versetzt, bis pH 8 erreicht ist. Dann extrahiert man mit kaltem Diethylether, trocknet und dampft ohne Wärmezufuhr i. Vak. ein. Der ölige Rückstand (1.55 g, 96 %) ist analysenrein. $C_5H_{10}N_2S_2$ (162.3) Ber. C 37.0 H 6.21 N 17.3 S 39.5 Gef. C 37.2 H 6.01 N 17.0 S 39.1. – IR (KBr): 3430, 3310, 2920, 1590, 1505, 1430, 1250, 1113, 1020 cm^{-1} .

4,6-Bis(methylthio)-2,2-diphenyl-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (13a)

Unter Stickstoff und Rühren werden 1.1 g (6.8 mmol) **12** in 50 ml CCl_4 bei Raumtemp. zu einer Lösung von 1.4 g (6.7 mmol) **7a** in 30 ml CCl_4 getropft. Nach 30 min wird i. Vak. etwas eingedampft und der ausgefallene, blaßgelbe Feststoff (2.0 g, 91 %) abfiltriert. Schmp. 141° (Zers.). $C_{17}H_{19}BN_2S_2$ (326.3) Ber. C 62.6 H 5.87 N 8.6 S 19.7 Gef. C 62.4 H 5.58 N 8.5 S 19.5. – 1H -NMR ($CDCl_3$): δ (ppm) = 7.33 (mc, 10 arom. H), 5.72 (mc, 2H, NH), 4.90 (t, $^4J = 2$ Hz, 1H, 5-H), 2.36 (s, 6H, SCH_3). – ^{13}C -NMR ($CDCl_3$): δ (ppm) = 164.4 (C-4, -6), ca. 151 (breit mc, C-1'), 132.3 (C-2'), 127.1 (C-3'), 126.0 (C-4'), 86.4 (C-5, $^1J = 171$ Hz), 13.4 (SCH_3). – IR (KBr): 3400, 3385, 3360, 1550, 1500, 1437, 1410, 710 cm^{-1} .

2,2-Diethyl-4,6-bis(methylthio)-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (13b)

Eine Lösung von 1.62 g (10 mmol) **12** in 10 ml THF wird unter Stickstoff 7 h mit 10 ml einer 1 M Lösung von Triethylboran in THF gekocht. Nach Eindampfen i. Vak. bleibt ein gelbes Öl zurück, das aus Petrolether kristallisiert wird: 1.55 g (67 %) blaßgelbe Nadeln vom Schmp. 59°. $C_9H_{19}BN_2S_2$ (230.2) Ber. C 47.0 H 8.32 N 12.2 S 27.9 Gef. C 47.1 H 8.25 N 12.1 S 27.4. – 1H -NMR($CDCl_3$): δ (ppm) = 5.06 (mc, 2H, NH), 4.66 (t, 4J = 3 Hz, 1H, 5-H), 2.39 (s, 6H, SCH_3), 0.74 (mc, 6H, CCH_3), 0.23 (mc, 4H, BCH_2). – ^{13}C -NMR($CDCl_3$): δ (ppm) = 164.3 (C-4, -6), 84.0 (C-5, 1J = 171 Hz), ca. 14 (mc, BCH_2), 13.3 (SCH_3), 9.15 (CCH_3). – IR(KBr): 3370, 2940, 2905, 2860, 2800, 1555, 1505, 1430, 1342, 1268, 1225, 1145, 1069, 1048, 1030, 971, 964, 901, 870, 780, 685 cm^{-1} .

2,2-Dimethoxy-4,6-bis(methylthio)-3-aza-1-azonia-2-borato-4,6-cyclohexadien (13c)

1.6 g (10 mmol) **12** werden in 20 ml CCl_4 mit 1.3 g (12.5 mmol) **7c** über Nacht bei Raumtemp. gerührt. Dabei fällt **13c** als farbloses Pulver (1.85 g, 79 %) aus. Schmp. 172° (Zers.). $C_7H_{15}BN_2O_2S_2$ (234.2) Ber. C 35.9 H 6.46 N 12.0 S 27.4 Gef. C 35.6 H 6.35 N 11.8 S 27.2. – 1H -NMR($CDCl_3$): δ (ppm) = 6.2 (br. mc, 2H, NH), 4.95 (mc, 1H, 5-H), 3.2 (mc, 6H, OCH_3), 2.45 (s, 6H, SCH_3). – ^{13}C -NMR($CDCl_3$): δ (ppm) = 165.8 (C-4, -6), 85.7 (C-5, 1J = 170 Hz), 49.5 (OCH_3), 13.1 (SCH_3). – MS(m/e): 202 [= 234–32 (CH_3OH)]. – IR(KBr): 3220, 2935, 2820, 1553, 1506, 1417, 1136, 1094, 1030, 933, 925, 775, 709 cm^{-1} .

4,6-Bis(methylthio)-2,2-diphenyl-1,3-diazonia-2-borato-3,6-cyclohexadien-tetrafluorborat (14a)

Zu einer gerührten Lösung von 200 mg (0.6 mmol) **13a** in 10 ml $CHCl_3$ werden unter Argon 100 mg (0.6 mmol) 54proz. ether. Tetrafluorbororsäure in 3 ml Diethylether getropft. 250 mg (98 %) **14a** fallen sofort als farbloses Pulver aus. Schmp. 223° (Zers.). $C_{17}H_{20}B_2F_4N_2S_2$ (415.1) Ber. C 49.3 H 4.87 N 6.8 S 15.5 Gef. C 49.0 H 5.00 N 6.6 S 15.5. – 1H -NMR(CD_3CN): δ (ppm) = 9.80 (mc, 2H, NH), 7.33 (mc, 10 arom. H), 4.03 (mc, 2H, 5-H), 2.65 (s, 6H, SCH_3). – ^{13}C -NMR(CD_3CN): δ (ppm) = 181.3 (C-4, -6), ca. 144 (mc, C-1'), 134.0 (C-2'), 128.5 (C-3'), 128.2 (C-4'), 40.3 (C-5, 1J = 134 Hz), 15.1 (SCH_3). – IR(KBr): 3280, 1621, 1589, 1472, 1433, 1420, 1100–1015, 758, 710 cm^{-1} .

2,2-Diethyl-4,6-bis(methylthio)-1,3-diazonia-2-borato-3,6-cyclohexadien-tetrafluorborat (14b)

Unter Argon werden 141 mg (0.87 mmol) 54proz. ether. Tetrafluorbororsäure in 5 ml Diethylether zu einer gerührten Lösung von 200 mg (0.87 mmol) **13b** in 5 ml $CHCl_3$ getropft. Das Produkt (265 mg, 96 %) fällt sofort analysenrein als blaßgelbes Pulver aus. Schmp. ab 140° (Zers.), bei langsamem Aufheizen ab 190° (Zers.). $C_9H_{20}B_2F_4N_2S_2$ (318.0) Ber. C 34.0 H 6.34 N 8.8 S 20.2 Gef. C 33.9 H 6.42 N 8.6 S 19.7. – 1H -NMR(CD_3CN): δ (ppm) = 9.37 (mc, 2H, NH), 4.10 (s, 2H, 5-H), 2.63 (s, 6H, SCH_3), 0.66 (mc, 10H, BCH_2 und CH_3). – ^{13}C -NMR(CD_3CN): δ (ppm) = 179.0 (C-4, -6), 39.0 (C-5, 1J = 135 Hz), 14.3 (SCH_3), ca. 14 (mc, BCH_2), 9.2 (CCH_3). – IR(KBr): 3290, 2950, 2920, 2875, 1640, 1605, 1425, 1410, 1160–1000 cm^{-1} .

Literatur

- 1 W. Diltthey, F. Eduardoff und F. J. Schumacher, Liebigs Ann. Chem. 344, 300 (1906).
- 2 Als Sammelreferat vgl. B. M. Mikhailov, Pure Appl. Chem. 49, 749 (1977).
- 3 K. Hartke, B. Krug und R. Hoffmann, Liebigs Ann. Chem. 1984, 370.
- 4 American Cyanamid Co. (Erf. S. F. Stafiej und E. A. Takacs), US Pat. 3341582 (1967); C. A. 68, 68486x (1968).
- 5 American Cyanamid Co. (Erf. S. F. Stafiej und E. A. Takacs), US Pat. 3383399 (1968); C. A. 69, 76615z (1968).

- 6 L. E. Benjamin, D. A. Carvalho, S. F. Stafiej und E. A. Takacs, *Inorg. Chem.* **9**, 1844 (1970).
- 7 B. M. Mikhailov und V. A. Dorokhov, *Izv. Akad. Nauk. SSSR Ser. Khim.* **1970**, 1446; *C. A.* **74**, 53881x (1971).
- 8 A. Meller und A. Ossko, *Monatsh. Chem.* **101**, 131 (1970).
- 9 A. Meller und W. Maringgele, *Monatsh. Chem.* **102**, 121 (1971).
- 10 S. M. McElvain und J. P. Schroeder, *J. Am. Chem. Soc.* **71**, 40 (1949).
- 11 S. M. McElvain und B. E. Tate, *J. Am. Chem. Soc.* **73**, 2760 (1951).
- 12 R. Merényi in *Iminium Salts in Organic Chemistry*, Hrsg. H. Böhme und H. G. Viehe in *Adv. Org. Chem.*, Hrsg. E. C. Taylor, Bd. 9, Teil 1, Wiley Interscience, New York 1976.
- 13 K. Hartke und R. Hoffmann, *Liebigs Ann. Chem.* **1980**, 483.
- 14 H. Eilingsfeld, M. Patsch und H. Scheuermann, *Chem. Ber.* **101**, 2426 (1968).

[Ph 828]

Arch. Pharm. (Weinheim) **317**, 890–894 (1984)

Syntheses and Anti-inflammatory Activities of Substituted Arylamino-[*N'*-benzylidene)acetohydrazides and Derivatives

Mahima Verma, Vibha R Gujrati, Manju Sharma, Tirloki N. Bhalla, Anil K. Saxena, Jagdish N. Sinha, Krishna P. Bhargava and Kirpa Shanker*

Department of Pharmacology and Therapeutics, King George's Medical College, Lucknow – 226003, India

Eingegangen am 9. August 1983

The substituted arylamino-(*N'*-benzylidene)acetohydrazides **1–6**, substituted acetic acid arylamino-(*N'*-benzyl)acetohydrazides **7–12** and *N*-(3-chloro-2-oxo-4-phenylazetan-1-yl) (phenylamino)acetamides **13–16**, containing a β -lactam ring were synthesized and studied for their anti-inflammatory activities against carrageenin induced paw oedema in albino rats. Compound **7** was most active (30.6 % at 50 mg/kg p. o.) with minimum acute toxicity. All compounds showed a marked but variable (44–80 %) inhibition of antiproteolytic activity.

Synthese und antiphlogistische Aktivität von substituierten *N*-Arylaminoessigsäure-(*N'*-benzyliden)-hydraziden und Derivaten

Die substituierten *N*-Arylaminoessigsäure-(*N'*-benzyliden)-hydrazide **1–6**, die substituierten *N*-Arylaminoessigsäure-(*N'*-benzyl)-hydrazide **7–12** und die *N*-(3-Chlor-2-phenyl-4-azetanon-1-yl)-phenylaminoessigsäureamide **13–16**, die einen β -Lactamring enthalten, wurden synthetisiert und auf ihre antiphlogistische Aktivität im Carrageenintest an der Rattenpfote geprüft. Auch die antiproteolytische Wirkung der Verbindungen wurde bestimmt. Sie zeigten eine deutliche aber unterschiedliche (44–80 %) Hemmung der antiproteolytischen Wirkung. Die größte antiphlogistische Aktivität zeigte Verbindung **7** mit 30,6 % bei 50 mg/kg p. o. und minimaler akuter Toxizität.

Various clinically useful anti-inflammatory drugs such as indomethacin or salicylic acid are acidic in nature¹. It is well documented that the lactam moiety confers acidic properties