Wissenschaftlicher Teil.

1053. Walther Awe:

**Über die Spaltung des 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmatins
bei der Einwirkung von Jod oder Quecksilber-(II)-azetat.**

VII. Mitteilung über Derivate des Berbins¹⁾.

(Aus dem Pharmazeutisch-chemischen Institut der Universität Göttingen
[Direktor Prof. Dr. K. Feist] und dem Pharmazeutischen Institut der Uni-
versität Breslau [Direktor Prof. Dr. K. Bodendorf]).

Eingegangen am 13. Oktober 1943.

In der VI. Mitteilung¹⁾ haben wir über die eigenartige Spaltung des 9-Benzyl-desoxy-berberins und 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-berberins bei der Einwirkung von alkoholischer Jodlösung und schon vorher gelegentlich anderer Versuche über die gleiche Spaltung bei der Einwirkung von Quecksilber-(II)-azetat²⁾ berichtet. Während Jod und Quecksilber-(II)-azetat bei Berbinen und 9-R-berbinen sonst nur dehydrierend wirken³⁾, indem in das Berbinringsystem lediglich eine oder zwei Doppelbindungen eingelegt werden, entsteht bei der Einwirkung dieser Stoffe auf die 9-Benzyl-derivate des Berberins unter Abspaltung der Benzylseitenkette das unsubstituierte Berberin, dessen Bildung wir durch die Darstellung mehrerer Derivate eindeutig belegten.

Diese unerwartete Reaktion ließ es uns angezeigt erscheinen, sie an einem anderen analog gebauten Alkaloid der Berbinreihe zu überprüfen. Dazu wählten wir das von K. Feist⁴⁾ aus der Colombowurzel isolierte und in seiner Konstitution aufgeklärte, von E. Späth⁴⁾ synthetisierte

---

¹⁾ VI. Mitteilung. Arch. Pharmaz. Ber. Dtsch. Pharmaz. Ges. 276, 253 (1938).

²⁾ Ebenda 271, 37 (1933).

³⁾ J. Gadamer und F. Kuntze, ebenda 253, 278 (1915); K. Feist und W. Awe, ebenda 269, 672 (1933).

⁴⁾ Ebenda 245, 586 (1907). Über die Konstitutionsermittlung und Synthese des Palmatins siehe: K. Feist und G. Sandstede, ebenda 256, 1 (1918); E. Späth und Mitarbeiter, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54, 3064 (1921), 58, 2267 (1925). M. Oberlin, Arch. Pharmaz. Ber. Dtsch. Pharmaz. Ges. 265, 256 (1927).

Palmatin. Das Palmatiniumjodid (I) konnten wir ebenso, wie dies für die Berberiniumsalze⁵⁾ öfter beschrieben worden ist, durch Umsetzung mit Benzyl-magnesium-chlorid nach Grignard in 9-Benzyl-desoxy-palmatin (II) überführen und dieses zum 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmatin (III) reduzieren.

Erhitzen wir III mit alkoholischer Jodlösung oder mit einer Lösung von Quecksilber-(II)-azetat in Essigsäure, so fand auch hier eine Abspaltung der Benzylkette statt, und bei beiden Oxydationsreaktionen erhielten wir Palmatiniumsalze zurück, die wir in Form ihres Reduktionsproduktes, des farblosen, gut kristallisierten und scharf schmelzenden 16,17-Dihydro-desoxy-palmatins (IV) durch Mischschmelzpunktbestimmungen identifizierten.

Damit haben wir diesen eigenartigen an den Benzylderivaten des Berberins zuerst beobachteten Reaktionsverlauf am analog gebauten 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmatin bestätigt. Wir haben diesen Reaktionsverlauf seinerzeit im Sinne der Doppelbindungsregel von O. Schmidt⁶⁾ gedeutet, inder die Bindung C₉ bis C₁₉ von den beiden Benzolringen D und E (III) her geschwächt wird.

⁵⁾ M. Freund und Mitarbeiter, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37, 3336, 4673 (1904); Liebigs Ann. Chem. 397, 1 (1913). K. Feist und W. Awe, Arch. Pharmaz. Ber. Dtsch. Pharmaz. Ges. 269, 672 (1931); ebenda 271, 37 (1933); W. Awe, ebenda 275, 405 (1937).

⁶⁾ Ber. Dtsch. Chem. Ges. 67, 1870 (1934).

Beschreibung der Versuche⁷⁾.

2; 3, 11, 12-Tetramethoxy-9-benzyl-16, 17-dehydroberberin-sulfat (9-Benzyl-desoxy-palmitin-sulfat):

Aus 8 g Benzylchlorid, 2 g Magnesiumspänen und 50 ccm Äther wurde in der üblichen Weise das Reagens bereitet und zu einer Anschüttelung von 4 g Palmitiniumjodid in 50 ccm Äther gegeben.

Nach fünfständigem Erhitzen war die rotbraune Farbe des Palmitiniumjodids fast völlig verschwunden. Am Boden des Reaktionsgefäßes und an den Gefäßwänden befanden sich gelbe Kristallnadeln. Das Gemisch wurde langsam in 200 ccm 2-n Schwefelsäure, die mit 200 g Eisstücken versetzt waren, gegossen. Nach der Klärung⁸⁾ trennte man den Äther im Scheidetrichter ab und schüttelte das Gemisch zur Entfernung des als Nebenprodukt gebildeten Dibenzyls viermal mit je 100 ccm Äther durch. Dann wurde filtriert und die wässrige Lösung langsam, am besten tropfenweise aus einem Scheidetrichter, zu 400 ccm Ammoniakflüssigkeit, die mit 300 g Eisstücken versetzt war, gegeben.

Die hierbei erhaltene Base kristallisierte aus Alkohol, auch nach weiterem Umfällen über das Sulfat, nicht. Die aus wässrigem Alkohol erhaltenen verschierten Produkte wurden in wenig verdünnter Schwefelsäure heiß gelöst und die Lösung mit Alkohol versetzt. Nach dem Filtrieren und Erkalten kristallisierte das Sulfat des 9-Benzyl-desoxy-palmitins in gut ausgebildeten hellgelben Nadeln vom Schmp. 213°.

3.020 mg: 6.870 mg CO₂, 1,510 mg H₂O.

C₂₈H₂₉O₄N.H₂SO₄ (541.25). Ber.: C 62.08%. H 5.77%.
Gef.: C 62.04%. H 5.60%.

Bei einer weiteren Darstellung wurde die Reinigung über das Hydrojodid versucht, das mit Jodkalium gefällt werden kann. Die Salze und besonders die freie Base des 9-Benzyl-desoxy-palmitins scheinen jedoch ebenso wie entsprechende Berberinderivate lichtempfindlich zu sein, wodurch das Arbeiten sehr erschwert wird. Auf die Isolierung der freien Base wurde daher verzichtet.

9-Benzyl-16, 17-dihydro-desoxy-palmitin:

0.5 g des 9-Benzyl-desoxy-palmitin-sulfates oder des Hydrojodids wurden in 30 ccm Eisessig, 10 ccm Wasser und 10 ccm 2-n Schwefelsäure gelöst und mit Zink-Cadmium-Gemisch (7+3) erhitzt. Nachdem die Lösung fast farblos geworden war, wurde, wie bei den analog gebauten Berbinderivaten in früheren Mitteilungen beschrieben⁹⁾, aufgearbeitet. Grünliche Prismen, Schmelzpunkt 163 bis 165°.

4.604 mg: 12.735 mg CO₂, 3.020 mg H₂O.

C₂₈H₃₁O₄N (445.25). Ber.: C 75.46%. H 7.02%.
Gef.: C 75.44%. H 7.34%.

⁷⁾ Die später weiter ausgebauten Versuche sind zuerst in den Dissertationen von H. Etzrodt, H. Unger und O. Nehrlich (Universität Göttingen) beschrieben worden.

⁸⁾ Wenn sich ein Teil des gebildeten 9-Benzyl-desoxy-palmitinhydrojodides zusammenballt und infolgedessen nicht in Schwefelsäure löst, so verreibt man diese Klumpen mit Alkohol. Aus dieser alkoholischen Lösung erhält man das Hydrojodid in meist gut ausgebildeten Kristallen.

⁹⁾ W. A we und H. U n g e r, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 70, 475 (1934).

Oxydation des 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmatins

a) mit Jod. Angewandt: Eine Lösung von 0.2 g 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmin vom Schmelzpunkt 165° und 0.5 g Jod in 30 ccm Alkohol. Nach dreistündigem Erhitzen begannen sich Kristalle abzuscheiden. Nach insgesamt achtstündigem Erhitzen wurde die Lösung aufgearbeitet¹⁰⁾ und die aus Alkohol erhaltenen braunen Kristallnadeln mit amalgamiertem Zink-Cadmium-Gemisch reduziert⁹⁾. Nach dem Umlösen aus Alkohol erhielten wir schwach gelb gefärbte Prismen vom Schmelzpunkt 148°. Mischschmelzpunkt mit 16,17-Dihydro-desoxy-palmin (Schmp. 148° = 148°).

b) mit Quecksilber-(II)-acetat: Die grünelbe Lösung von 0.2 g 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmin in 15 ccm Eisessig und 10 ccm Wasser wurde mit 6 ccm einer 10%igen Lösung von Quecksilber-(II)-acetat „Merck“ versetzt und, als sich nach dreitägigem Stehen nur wenig Quecksilber-(I)-acetat abgeschieden hatte, 4 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Die Farbe ging in rotbraun über und nach dem Erkalten schieden sich 0.421 g etwas rötlich gefärbtes Quecksilber-(I)-acetat ab, während die Theorie für eine Doppelbindung 0.232 g fordert. Da nach dem Entfernen des überschüssigen Quecksilbers als Sulfid und Vertreiben des Schwefelwasserstoffes die Ammoniakfällung in einer Probe nur eine äußerst geringe Trübung ergab, wurde die Lösung mit Kaliumjodid gefällt. Die gesamte Fällung wurde nach dem Absaugen mit amalgamiertem Zink-Cadmium-Gemisch reduziert⁹⁾ und die entstandenen Kristalle durch Schmelz- und Mischschmelzpunkt eindeutig als 16,17-Dihydro-desoxy-palmin vom Schmelzpunkt 148° gekennzeichnet.

Aus 9-Benzyl-16,17-dihydro-desoxy-palmin hatte sich also in beiden Fällen unter Abspaltung der Benzylkette Palminiumjodid gebildet, womit die Versuche in der Berberinreihe bestätigt sind.

1054. Benno Reichert und Werner Dornis:

Über Spaltungen
von Arylmethyl-hexamethylen-tetraminiumhalogeniden.

1. Mitteilung: Die Einwirkung von Schwefeldioxyd auf Arylmethyl-hexamethylen-tetraminiumhalogenide.

(Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.)

Eingegangen am 17. Januar 1944.

Für die Darstellung des Benzylamins sind, wie die Literatur lehrt, mehrere Methoden angegeben worden. Die heute gebräuchlichen Verfahren gehen entweder vom Benzylchlorid oder vom Benzonitril aus. Bei der Umsetzung des Benzylchlorids mit Ammoniak erhält man indessen nicht das gewünschte primäre Amin, sondern es entstehen ferner Di- und Tribenzylamin. Das Benzonitril läßt sich durch geeignete Reduktionsmittel in Benzylamin überführen; da dieser Vorgang aber nicht glatt verläuft, dürfte der Darstellungsmethode präparativ keine große Bedeutung zukommen.

¹⁰⁾ Siehe die gleichartigen Versuche in der Berberinreihe, Anm. 1.