EINE SYNTHESE DES HELIPYRONS

Thomas Kappe und Heinrich Schmidt

Institut für Organische Chemie der Universität Graz, Österreich

(Received in Germany 13 October 1970; received in UK for publication 16 November 1970)

L. Opitz und R. Hänsel¹ gelang vor kurzem die Isolierung eines neuen 4-Hydroxy-2-pyronderivates der Summenformel $C_{17}H_{20}O_6$ aus Helichrysum italicum G. Dorn. Auf Grund der NMR-, IR-, UV- und Massenspektren, sowie aus biogenetischen Gründen formulieren diese Autoren die neue Substanz, die sie Helipyron nennen, als 6,6'-Diäthyl-4,4'-dihydroxy-5,5'-dimethyl-3,3'-methylen-di-2-pyron (3). Um diese Struktur sicherzustellen, soll im folgenden über eine Synthese von 3 berichtet werden.

Von E. Ziegler und H. Junek² ist 1958 eine Synthese für 4-Hydroxy-2-pyrone entwickelt worden, bei der Ketone mit Benzylmalonsäure-bis-2,4-dichlorphenylester zu den entsprechenden 3-Benzylderivaten reagieren. Eine Entbenzylierung kann dann mit $AlCl_3$ durchgeführt werden. Nach diesem Verfahren ist bereits von Ziegler und Nölken³ das Alkaloid Anibin hergestellt worden.

Die Synthese des Helipyrons (3) folgt dem gleichen Prinzip: Die Reaktion von Diäthylketon mit Benzylmalonsäure-bis-2,4,6-trichlorphenylester⁴ bei 245° gibt das 3-Benzyl-2-pyron 1, welches bei 150° mit $AlCl_3$ zum 6-Äthyl-4-hydroxy-5-methyl-2-pyron entbenzyliert wird. Die Umsetzung von 2 mit Formaldehyd liefert schließlich das Helipyron 3, welches in der angeführten Form mit zwei intramolekularen H-Brücken vorliegt⁵.

6-Äthyl-3-benzyl-4-hydroxy-5-methyl-2-pyron (1): 3,9 g Diäthylketon und 16,5 g Benzylmalonsäure-bis-2,4,6-trichlorphenylester⁴ werden im Bombenrohr 30 Min. auf 240-245° erhitzt; die Reaktionsmischung mit Petroläther angerieben und aus Benzol oder verd. Methanol umkrist. Ausb. 3g (41%). Schmp. 150-151°. IR (KBr): 3300-2700 (OH assoz.), 1655s (C=O), 1635sh, 1615sh, 1595w (C=C + Aromat). NMR in DMSO (τ): t 8.87 (CH₃), s 8.05 (CH₃), q 7.47 (CH₂), s 6.22 (CH₂), 2.78 (C₆H₅).

6-Äthyl-4-hydroxy-5-methyl-2-pyron (2): 2 g 1 werden mit 2 g AlCl₃, 10 Min. auf 145-150° erhitzt. Man zersetzt die Schmelze mit verd. HCl und fällt aus NaOH/HCl um. Ausb. 0,6 g (48% d. Th.). Aus Benzol farblose Stäbchen, Schmp. 156-157°. IR in KBr: 3400-2200 (OH assoz.), 1655s (C=O), 1635sh, 1610m/cm (C=C). NMR in DMSO: t 8.84 (CH₃), s 8,12 (CH₃), q 7.46 (CH₂), s 4.67 (H-3).

Helipyron (3): 0,6 g 2 werden in 4 ml Äthanol gelöst, mit 2 Tropfen konz. HCl und 0,4 ml 35proz. CH₂O-Lsg. versetzt und 1 Std. zum Sieden erhitzt. Nach 30 Min. werden nochmals 0,4 ml Formalinlsg. zugefügt. Ausb. 0,5 g (80% d. Th.). Aus Äthanol (z.T. gebogene) Stäbchen, Schmp. 217-218°. (Lit.¹: 217°).

IR in KBr: 3200-2400 (OH assoz.), 1680sh, 1675s (C=O), 1605m/cm (C=C).

(Lit.¹: 3200-2400, 1688s, 1678s, 1672sh).

NMR in CDCl₃: t 8.80 (2CH₃), s 8.03 (2CH₃), q 7.43 (2CH₂), s 6.48 (CH₂), s -1.2 (OH). (Lit.¹: t 8.74, s 8.00, q 7.38, s 6.44).

UV in Äthanol: 295,5 nm, log ϵ = 4.146. (Lit.¹: 293,5 nm, log ϵ = 4.158).

Für die Förderung dieser Arbeit danken wir Herrn Prof. Dr. E. Ziegler.

Literatur:

1. L. Opitz und R. Hänsel, Tetrahedron Letters, 1970 No. 38, 3369.
2. E. Ziegler und H. Junek, Monatsh. Chem. 89, 323 und 678 (1958).
3. E. Ziegler und E. Nölken, Monatsh. Chem. 89, 391 (1958).
4. Th. Kappe, Monatsh. Chem. 98, 883 (1967).
5. vgl. hierzu D. W. Hutchinson und J. A. Tomlinson, Tetrahedron 25, 2531 (1969), und C. Laruelle, Tetrahedron Letters 1970 No. 26, 2235.