k_{-E}/k'_E et de la stéréosélectivité cinétique de la condensation aldolique (k_E/k_T). Si $R = H$, cette équation ne s'applique plus, car on observe alors une équilibration rapide des oxyanions **3** et **4** par interconversion directe, due à la mobilité du proton en α du CN.

D'autre part, lors d'une étude de la réaction d'aldéhydes aromatiques avec $Cl-CH_2-CO_2R$, **10**, et $Cl-CH_2-CN$, **11**, en présence de base,⁴ il a été constaté que la condensation aldolique est partiellement réversible dans le premier cas et irréversible dans le second.

Le passage d'un phosphononitrile **1** à un phosphonoester **7** pourrait aussi provoquer une augmentation de réversibilité de la condensation aldolique et influencerait donc le cours stérique de la réaction des esters **7** avec les aldéhydes.

Nous avons donc entrepris avec les esters une étude analogue à celle qui a été effectuée avec les nitriles:¹ nous examinons ici la réaction du benzaldéhyde et des phosphonoesters **7a** et **7b** en présence d'hydrure de sodium dans le THF; son mécanisme vraisemblable doit être celui du Schéma A.

Nous comparerons notamment le degré de réversibilité de formation des oxyanions k_{-E}/k'_E et k_{-T}/k'_T pour **3** et **4** d'une part et **15** et **16** d'autre part. Nous examinerons donc l'évolution des β -hydroxyphosphonates correspondant à **15** et **16** (**12** et **13**) en milieu basique. Nous tenterons d'interpréter la stéréochimie de la réaction.⁵⁻⁸

RÉSULTATS

Réaction du benzaldéhyde et des esters 7a et 7b. Seule la réaction de PhCHO et de $(\text{EtO})_2\text{P}(\text{O})\text{CH}_2\text{COOEt}$ est décrite:⁵ elle conduit au cinnamate d'éthyle *E*.

La réaction du benzaldéhyde et de **7a** ou **7b** dans le THF à température ambiante en présence de NaH conduit aux cinnamates *Z* (**8a** et **8b**) et *E* (**9a** et **9b**) dans le rapport 3/97, quel que soit l'ester de départ (dosages par CPG).

Ces premiers résultats sont donc différents de ceux qui ont été obtenus avec les nitriles. Dans le THF, **5a/6a** = 15/85 et **5b/6b** = 40/60.

Décomposition des β -hydroxyphosphonates 12 et 13 en milieu basique. Les phosphonates **12** et **13** ont été synthétisés comme les nitriles correspondants. Nous avons opéré comme précédemment en présence d'un aldéhyde compétitif destiné à capter tout ou partie de l'anion mésomère **14** éventuellement formé par rétroaldolisation. Le détail de la méthode est exposé dans.¹

Décomposition en l'absence de *p*-chlorobenzaldéhyde. Par action de NaH (destiné à former un alcoolate) dans le THF à température ambiante sur **12** (**a** ou **b**) ou **13** (**a** ou **b**), puis hydrolyse, on obtient du benzaldéhyde, le cinnamate *E* **9a** ou **b** et du phosphonate **7a** ou **b**.

Décomposition en présence de *p*-chlorobenzaldéhyde. La même réaction est effectuée en présence de 3 mole de *p*-chlorobenzaldéhyde. Les résultats sont portés dans le Tableau 1.

En comparant le résultat des expériences 2 et 3 et de l'expérience 1 ou 5 et 6 et de l'expérience 4, on peut estimer raisonnablement les rapports k_{-E}/k'_E et k_{-T}/k'_T dans chacun des cas (voir référence 1 pour un exposé détaillé de la méthode). Nous obtenons toujours des esters *p*-chlorocinnamiques, quel que soit le β -hydroxyphosphonate de départ (**12** ou **13**). La formation de *p*-chlorocinnamates est plus importante quand on part de **12** que quand on part de **13** (exp 2 et 3, 5 et 6), résultat analogue à ce qui a été observé avec les nitriles.¹ La formation de *p*-chlorocinnamates est plus importante lors de la décomposition de **12a** et **12b** que lors de la réaction directe ($Y_2 < Y_1$ et $Y_5 < Y_4$); c'est l'inverse pour la décomposition de **13a** et **13b** ($Y_3 > Y_1$ et $Y_6 > Y_4$). Dans le cas des nitriles, nous obtenions ce dernier résultat quelle que soit la stéréochimie du β -hydroxyphosphonate de départ.¹

Le rapport des cinnamates stéréoisomères **8b/8b + 9b** formés à partir de **12b** (exp 5) est sensiblement le même que pour la réaction du benzaldéhyde et du phosphonate **7b** (exp 4). Ce

Tableau 1. Rapport $Y = \text{PhCH} = \text{C}(\text{R})\text{COOMe} / p\text{-ClC}_6\text{H}_4\text{CH} = \text{C}(\text{R})\text{COOMe}$ obtenu dans le THF à 25° (dosage par CPG)

Expérience	Produits de départ	Y	8/8 + 9
1	PhCHO + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + 7a + NaH	15/85	< 3%
2	12a + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + NaH	9.5/90.5	< 3%
3	13a + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + NaH	21.5/78.5	< 1%
4	PhCHO + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + 7b + NaH	9.5/90.5	< 3%
5	12b + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + NaH	5.5/95.5	< 3%
6	13b* + 3p-ClC ₆ H ₄ CHO + NaH	32/68	< 1%

*La réaction est effectuée sur un mélange 12b + 13b (20/80); le rapport Y est corrigé des produits formés à partir de 12b.

résultat est différent du cas des nitriles. La décomposition du β -hydroxyphosphonate correspondant à 3b (précurseur de 5b) conduit à un rapport 5b/5b + 6b supérieur à ce qu'on obtient par réaction de PhCHO et de 1b.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Degré de réversibilité de la condensation aldolique. La condensation aldolique du benzaldéhyde et de l'anion 14 est réversible; le degré de réversibilité dépend de la stéréochimie de l'oxyanion intermédiaire. Comme dans le cas des nitriles, $k_{-E}/k'_E > k_{-T}/k'_T$ puisque la formation de p-chlorocinnamates est plus importante quand on part de 12 que lorsqu'on part de 13.

Cependant, l'absence de quantités notables d'ester Z 8b après décomposition de 12b et le fait que $Y_2 < Y_1$ et $Y_5 < Y_4$ indiquent que le degré de réversibilité de la formation des intermédiaires 15a et 15b k_{-E}/k'_E est plus élevé dans le cas des esters que dans le cas des nitriles.

Pour ce qui est du degré de réversibilité de formation des oxyanions 16b (k_{-T}/k'_T) il est du même ordre de grandeur que ce qui est observé pour les nitriles dans le même solvant.¹

Deux interprétations de l'augmentation de k_{-E}/k'_E peuvent être proposées selon qu'on considère une accélération de la rétroaldolisation: $(k_{-E})_{\text{ester}} > (k_{-E})_{\text{nitrile}}$ ou un ralentissement de la deuxième étape, $(k'_E)_{\text{ester}} < (k'_E)_{\text{nitrile}}$.

Il a été montré que l'état de transition de la rétroaldolisation est proche de l'aldéhyde et de l'anion mésomère.⁹ Donc $(k_{-E})_{\text{ester}} > (k_{-E})_{\text{nitrile}}$ signifierait que l'anion mésomère 14 formé à partir de

l'ester serait plus stable que l'anion formé à partir du nitrile 2. Or si cette augmentation du degré de réversibilité correspondait à la stabilisation de l'état initial, il serait logique que k_{-T}/k'_T augmente aussi, ce qui n'est pas observé.

Le ralentissement de la deuxième étape lorsqu'on passe d'un nitrile à un ester permet de comprendre nos résultats: en effet, lors de l'attaque nucléophile de l'oxygène de l'oxyanion sur le phosphore, il se développe une interaction entre le phényle et le groupement nitrile ou le groupement ester: ce dernier étant plus encombrant, on peut concevoir un ralentissement de la réaction.

Cette même interprétation peut s'appliquer au cas du Cl-CH₂-CN 11 et du Cl-CH₂-CO₂R 10. Le mécanisme de la réaction figure sur le Schéma B. Il a été montré que la condensation aldolique de PhCHO et de 17a est irréversible et que seule la formation de l'oxyanion 18b peut être réversible.⁴

Lors de la S_N2 intramoléculaire de 18, il est plausible que $(k'_T)_{\text{nitrile}}$ soit supérieur à $(k'_T)_{\text{ester}}$ étant donnée la gêne stérique plus grande lorsque le groupe phényle interagit avec un groupe ester plutôt qu'avec un groupement nitrile.

Stéréosélectivité de la réaction de Horner-Emmons. La formation de l'ester E 9 est très largement prépondérante, quel que soit R. Le rapport k_{-E}/k'_E étant très élevé, 15 et 16 sont en équilibre ra-

30 cm³ de THF, on ajoute 0.02 mole de **7a** (ou **7b**). On laisse 1 h sous agitation magnétique et sous courant d'azote pour **7a** (2 h pour **7b**), puis on ajoute lentement 0.02 mole de benzaldéhyde dans 20 cm³ de THF. Après 1 h d'agitation à température ambiante, le mélange est traité par l'eau et extrait à l'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée à l'eau, séchée sur Na₂SO₄ et analysée par CPG.

La même réaction est effectuée avec le *p*-chlorobenzaldéhyde. RMN de **9a** et **9b**.¹⁴ RMN *p*-chlorocinnamates de méthyle *E* (H en α de COOCH₃) δ 6.31, ³ J = 16 Hz; (COOCH₃) s 3.71, *p*-chloro α -méthyl cinnamate de méthyle *E*: (CH_3) δ 2.09, ⁴ J = 1.5 Hz; (COOCH₃) s 3.82.

Synthèse des intermédiaires **12** et **13**

A une solution de 0.05 mole de chlorure d'isopropylmagnésium dans 100 cm³ d'éther éthylique sec (ou THF sec) refroidie à -70°C, on ajoute 0.05 mole de phosphonate **7a** (ou **7b**). Après 5 h d'agitation sous courant d'azote, on ajoute lentement à la même température 0.05 mole de benzaldéhyde et on agit encore 5 h. On traite le mélange réactionnel par 40 cm³ d'une solution d'acide acétique 2N et extrait à l'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée à l'eau et séchée sur Na₂SO₄. Après évaporation du solvant sous pression réduite, on obtient une huile.

A partir de **7a** on obtient un mélange de diéthylphosphonates de carbométhoxy-1 hydroxy-2 phényl-2 éthyle-1 *1RS,2RS* (**12a**) et *1RS,2SR* (**13a**) avec un rendement de 14%. Le pourcentage de deux diastéréoisomères est déterminé par RMN du produit brut de la réaction, en considérant l'intensité des pics COOCH₃ (75% de **12a** et 25% de **13a**). Lorsque la réaction est effectuée dans le THF on obtient 27% de **12a** et 73% de **13a**. Rdt = 24%.

A partir de **7b**, on obtient un mélange de diéthylphosphonates de hydroxy-1 phényl-1 carbométhoxy-2 propyle-2 *1RS,2RS* (**12b**) et *1RS,2SR* (**13b**) avec un rendement de 10%. Le pourcentage de **12b** est de 80%, celui de **13b**, 20%. Lorsque la réaction est effectuée dans le THF on obtient environ 60% de **12b** et 40% de **13b**. Rdt = 10%. **12a** est obtenu pur, $F = 99^\circ$, après recristallisation dans l'éther du mélange réactionnel. Pour isoler **13a**, on reprend le mélange réactionnel par du pentane. Il précipite un solide blanc qui est constitué par un mélange de **13a** et **12a**. Après trois recristallisations successives dans un mélange pentane-éther, on obtient **13a** pur, $F = 72^\circ$.

RMN de **12b** et **13b**:

Iso- mère	Solvant	H _A	H _B	H _C	H _D	³ J _{P,H_A}	³ J _{P,H_C}	³ J _{H_C,H_D}	⁴ J _{P,H_D}
12b	CDCl ₃	1.27d	3.77s	5.17d		15.5	8		
	DMSO	1.25d	3.72s	5.38t	5.72q	15.5	5	5	3
13b	CDCl ₃	1.35d	3.69s	5.67d		15.5	9		
	DMSO	1.12d	3.60s	5.51q	5.96d	15.5	9	4.5	

Notons que **12a** et **12b** sont caractérisés par un couplage à longue distance ⁴J_{P,H} dans le DMSO, absent pour **13a** et **13b**.¹⁵

Les spectres de RMN de **12a** et **13a** dans CDCl₃ et DMSO sont décrits.⁸ **12a**: C₁₄H₂₁O₆P (microanalyse); **13a**: C₁₄H₂₁O₆P (microanalyse).

12b est obtenu pur, $F = 141^\circ$, après recristallisation dans l'éther du mélange réactionnel. Nous n'avons pas réussi à isoler **13b** pur. Cependant après plusieurs recristallisations du mélange réactionnel dans un mélange pentane-éther, nous avons obtenu un solide blanc contenant 20% de **12b** et 80% de **13b**. Les spectres de RMN ont été effectués sur ce mélange. **12b**: C₁₅H₂₃O₆P (microanalyse).

Décomposition thermique de **12** et **13**

0.001 mole de **12** (**a** ou **b**) ou de **13a** est portée au reflux dans 10 cm³ de toluène sec pendant 70 h pour **12a** ou **13a** (50 h pour **12b**). La chromatographie en phase gazeuse montre que la réaction est pratiquement terminée au bout des temps considérés (absence de phosphonate **7a** ou **7b**, après extraction à l'éther et lavage à l'eau, qui est dû à la décomposition de **12** et **13** dans les conditions de la chromatographie). Le rapport des pics correspondant à **8** et **9** est: **8a/9a** = 28/72 à partir de **12a**, **8b/9b** = 32/68 à partir de **12b**. **13a** donne le seul ester **9a**.

En présence de catalyseurs basiques tels CaCO₃ ou K₂CO₃ préconisés par Corey dans des cas voisins,¹⁶ on obtient encore moins d'isomère *Z* **8**; en milieu acide (quelques gouttes de CF₃COOH) la décomposition n'a pas lieu. RMN de **8a**: (H en α de Ph) δ 6.90; (H en α de COOCH₃) δ 5.91, ³ J = 12.5 Hz; (COOCH₃) s 3.65.

8b: (CH_3) δ 2.12, ⁴ J = 1.5 Hz; (COOCH₃) s 3.64. RMN des esters éthyliques correspondants sont décrits dans ref 17.

Décomposition de **12** ou **13** en milieu basique

Méthode A. 0.001 mole de **12** (**a** ou **b**) ou de **13a** est dissoute dans 8 cm³ de THF sec. On y ajoute 35 mg de suspension de NaH préalablement lavé. Le mélange réactionnel est agité pendant une heure sous courant d'azote. On le traite alors par l'eau et extrait à l'éther. La phase étherée, lavée et séchée, est analysée par CPG. Dans chaque cas étudié, nous observons trois produits: le benzaldéhyde, l'oléfine *E* **9a** ou **b** selon le cas et le phosphonate **7a** ou **b**.

Nous avons vérifié qu'un mélange **8a/9a** = 28/72 restait inchangé en 1 h dans le THF en présence d'anion phosphonate **7a** en léger excès.

Méthode B. On opère comme précédemment en présence de 0.003 mole de p-chlorobenzaldéhyde qui est ajoutée au milieu réactionnel avant NaH. Les résultats sont portés dans le Tableau 1.

Réaction d'une mole de 7a ou 7b avec une mole de benzaldéhyde et trois moles de p-chlorobenzaldéhyde (Résultats Tableau 1)

Nous avons opéré comme précédemment pour la réaction du benzaldéhyde et des phosphonoesters **7a** ou **b**. Le benzaldéhyde et le p-chlorobenzaldéhyde sont dissous ensemble dans un peu de THF. Nous avons considéré que le coefficient de réponse du détecteur cinnamates/p-chlorocinnamates est sensiblement 1.1 (il s'agit d'un coefficient molaire) c'est à dire le même que pour les cinnamonitriles.¹

Remerciements—Nous remercions vivement Madame J. Seyden-Penne pour les nombreuses et fructueuses discussions que nous avons eues avec elle.

BIBLIOGRAPHIE

- ¹B. Deschamps, G. Lefebvre et J. Seyden-Penne, *Tetrahedron* **28**, 4209 (1972)
- ²B. Deschamps, G. Lefebvre, A. Redjal et J. Seyden-Penne, *Tetrahedron*, **29**, 2437 (1973)
- ³M. Schlosser, *Topics in Stereochemistry*, E. L. Eliel et N. L. Allinger Eds, **5**, 11 (1971)
- ⁴J. Seyden Penne, A. Roux et M. C. Roux-Schmitt, *Tetrahedron* **26**, 2649 (1970); B. Deschamps et J. Seyden-Penne, *Ibid.* **27**, 3959 (1971); M. C. Roux-Schmitt, J. Seyden-Penne et S. Wolfe, *Ibid.* **28**, 4965 (1972)
- ^{5a}A. W. Johnson, *Ylid Chemistry*, Academic Press, New York, 1966, p. 207, et références citées; ^bA. M. Dombrovskii et V. A. Dombrovskii, *Russian Chem. Rev.* **35**, 733 (1966); ^cG. Sturtz, *Colloque Int. C.N.R.S.* **217** (1970) et références citées; ^dG. Sturtz, G. Lavielle et H. Normant, *Chem. Zeit.* **96**, 503 (1972) et références citées
- ⁶K. Sasaki, *Bull. Chem. Soc. Japan* **41**, 1252 (1968); *Nippon Kagaku Zasshi* **89**, 1137 (1968)
- ⁷D. E. McGreer et N. W. K. Chiu, *Canad. J. Chem.* **46**, 2225 (1968)
- ⁸T. H. Kinstle et B. Y. Mandanas, *Chem. Comm.* 1699 (1968)
- ⁹A. T. Nielsen et W. J. Houlihan, *Org. Reactions* **16**, 1 (1968); M. Calmon, B. Le Huseur et J. P. Calmon, *C.R. Acad. Sci. Paris, C* **271**, 933 (1970); M. Calmon et J. P. Calmon, *Bull. Soc. Chim. France* 1885 (1970)
- ¹⁰A. Redjal, résultats inédits
- ¹¹G. Durrant et J. K. Sutherland, *J. Chem. Soc. Perkin I*, 2582 (1972)
- ¹²G. M. Kosolapoff, *Organophosphorus Compounds*, Wiley & Sons, New York, 1950
- ¹³B. A. Arbuzov et V. S. Vinogradova, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **99**, 85 (1954); *Chem. Abs.* **49**, 13925g (1955)
- ¹⁴H. Kasiwagi, N. Nakagawa et J. Niwa, *Bull. Chem. Soc. Japan* **36**, 410 (1963)
- ¹⁵T. Bottin-Strzalko et J. Seyden-Penne, *Tetrahedron Letters* 1945 (1972)
- ¹⁶E. J. Corey et G. T. Kwiatkowski, *J. Am. Chem. Soc.* **88**, 5652, 5654 (1966); **90**, 6816 (1968)
- ¹⁷V. R. Valente et J. L. Wolfhagen, *J. Org. Chem.* **31**, 2509 (1966)