Brèves communications – Kurze Mitteilungen – Brevi comunicazioni – Brief Reports

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans ces communications. – Für die kurzen Mitteilungen ist ausschliesslich der Autor verantwortlich. – Per le brevi comunicazioni è responsabile solo l'autore. – The editors do not hold themselves responsible for the opinions expressed by their correspondents.

Synthese von 22,26-Imino-cholestan-Derivaten¹

In früheren Mitteilungen^{2,3} berichteten wir über die Synthese von Tetrahydro-solasodin⁴ aus 3 β ,16 β -Diacetoxy-5 α -pregnan-20-on, sowie über die Umwandlung dieses sekundärenamins in das Spiroaminoketal-Alkaloid Soladulcin⁵. Im folgenden werden analoge, von einem entsprechenden 16 α -Acetoxy-pregnan-Derivat ausgehende Umsetzungen beschrieben. Diese Untersuchungen zeigen, dass sekundäre und tertiäre Basen vom Typ der *Solanum*-Alkaloide auch über solche relativ leicht gewinnbare 16 α -Hydroxy-Steroide zugänglich sind.

3 β ,16 α -Diacetoxy-5 α -pregnan-20-on (I)⁶ wurde aus 3 β -Acetoxy-16 α ,17 α -oxido-pregn-5-en-20-on⁷ durch Reduktion mit Chrom(II)-acetat, Acetylierung und katalytische Hydrierung des entstandenen 3 β ,16 α -Diacetoxy-pregn-5-en-20-on⁸ dargestellt. Umsetzung von I mit 2-Lithium-5-methyl-pyridin² gab in etwa 75prozentiger Ausbeute

ein einheitliches 20-[5-Methyl-pyridyl-(2)]-5 α -pregnan-3 β ,16 α ,20-triol (II), Smp. 221–222°C und $[\alpha]_D^{25} - 21,6^\circ$ (ber. für C₂₇H₄₁NO₃ (427,6) 75,83% C, 9,66% H, 3,28% N; gef. 75,35% C, 9,30% H, 3,39% N), dem wahrscheinlich (20R)-Konfiguration zukommt. Acetylierung von II unter üblichen Bedingungen lieferte in 88prozentiger Ausbeute das 3,16-Diacetat III, Smp. 233–235°C und $[\alpha]_D^{25} - 80,6^\circ$ (ber. für C₃₁H₄₅NO₅ (511,7) 72,76% C, 8,86% H, 2,74% N; gef. 73,06% C, 8,67% H, 2,80% N). Bei der Wasserabspaltung mit Phosphoroxchlorid/Pyridin erhielten wir in 70prozentiger Ausbeute ein im Dünnschicht-Chromatogramm einheitliches Dehydratisierungsprodukt, Smp. 124–127°C und $[\alpha]_D^{25} + 34,4^\circ$ (ber. für C₃₁H₄₃NO₄ (493,7) 75,42% C, 8,78% H, 2,84% N; gef. 75,65% C, 8,64% H, 2,98% N), dem wir die Konstitution des 3 β ,16 α -Diacetoxy-20-[5-methyl-pyridyl-(2)]-5 α -pregn-20-ens (IV) zuschreiben. Durch partielle Hydrierung von IV mit 10prozentiger Pd/Kohle in Äthanol gewann man in 76prozentiger Ausbeute (20S)-3 β ,16 α -Diacetoxy-20-[5-methyl-pyridyl-(2)]-5 α -pregnan (V), Smp. 230–232°C und $[\alpha]_D^{25} - 111,5^\circ$ (ber. für C₃₁H₄₅NO₄ (495,7) 75,11% C, 9,15% H, 2,83% N; gef. 75,00% C, 8,89% H, 2,94% N). Sowohl bei der weiteren Hydrierung von V als auch bei der Totalhydrierung von IV mit PtO₂/Eisessig und anschließender Verseifung (5prozentige methanolische KOH) entstand als Hauptprodukt das 22,26-Imino-5 α -cholestan-3 β ,16 α -diol VI, Smp. 285–287°C und $[\alpha]_D^{25} + 23,0^\circ$ (ber. für C₂₇H₄₇NO₂ (417,7) 77,64% C, 11,34% H, 3,35% N; gef. 77,54% C, 11,04% H, 3,32% N); Triacetat: Smp. 173–176°C und $[\alpha]_D^{25} - 32,6^\circ$ (ber. für C₃₃H₅₃NO₅ (543,8) 72,89% C, 9,82% H, 2,58% N; gef. 73,06% C, 9,58% H, 2,60% N).

Dieselbe Verbindung VI erhielten wir bei der katalytischen Hydrierung (PtO₂/Eisessig) von 3 β ,16 α -Diacetoxy-20-[5-methyl-pyridyl-(2)]-pregna-5,20-dien, Smp. 152 bis 154°C und $[\alpha]_D^{25} - 28,4^\circ$ (ber. für C₃₁H₄₁NO₄ (491,7) 75,73% C, 8,41% H, 2,85% N; gef. 75,71% C, 8,26% H, 2,89% N), welches auf ähnliche Weise wie IV aus 3 β ,16 α -Diacetoxy-pregn-5-en-20-on synthetisiert wurde.

Zur Bestimmung der Konfiguration an C-22 und C-25 wurde VI über das spontan zum Carbinolamin cyclisierende

¹ *Solanum*-Alkaloide. XVI. Mitteilung. – XV. Mitteilung: K. SCHREIBER und H. RIPPERGER, *Tetrahedron Letters* Nr. 27, 9 (1960).

² K. SCHREIBER und G. ADAM, *Tetrahedron Letters* Nr. 27, 5 (1960).

³ K. SCHREIBER und G. ADAM, *Exper.* 17, 13 (1961).

⁴ (22R,25R)-22,26-Imino-5 α -cholestan-3 β ,16 β -diol.

⁵ 5 α -Solasodin-3 β -ol, (22R,25R)-22,26-Imino-16 β ,22-oxido-5 α -cholestan-3 β -ol.

⁶ H. HIRSCHMANN, F. B. HIRSCHMANN und J. W. CORCORAN, *J. org. Chem.* 20, 572 (1955). – V. SCHWARZ, V. ČERNÝ und F. ŠORM, *Coll. czech. chem. Commun.* 23, 940 (1958). – R. NEHER, P. DESAULLES, E. VISCHER, P. WIELAND und A. WETTSTEIN, *Helv. chim. Acta* 41, 1667 (1958).

⁷ P. L. JULIAN, E. W. MEYER und I. R. RYDEN, *J. Amer. chem. Soc.* 72, 367 (1950). – P. L. JULIAN, E. W. MEYER, W. J. KARPEL und I. R. WALLER, *J. Amer. chem. Soc.* 72, 5145 (1950).

⁸ S. BERNSTEIN, M. HELLER und S. M. STOLAR, *J. Amer. chem. Soc.* 76, 5674 (1954).

⁹ Alle Smp. korrigiert; alle Drehwerte in Chloroform; IR-Spektren in Nujol. Herrn Dr. K. HELLER, Wissenschaftliche Laboratorien des VEB Jenapharm, Jena, danken wir für Aufnahme und Diskussion dieser Spektren. Die Mikroanalysen wurden von Herrn Dr. A. SCHOELLER, Kronach (Obfr.), ausgeführt.

3,16-Diketon in ein 5 α -Solanidan-3-on vom Smp. 146–149°C und $[\alpha]_D^{25} + 40,1$ übergeführt¹⁰, welches mit dem bekannten, aus Tetrahydro-solasodin erhaltenen (22R, 25R)-5 α -Solanidan-3-on (IX)¹¹ identisch war. Folglich entstehen bei der Hydrierung sowohl der 16 α - als auch der 16 β -Acetoxy-20-pyridyl-pregnan-Derivate² als Hauptprodukte 22, 26-Imino-cholestane mit gleicher sterischer Anordnung an den Asymmetriezentren C-22 und C-25. Die Konfiguration an C-16 ist also ohne Einfluss auf den sterischen Verlauf dieser katalytischen Hydrierungen. Dagegen scheint die Anwesenheit einer Acetoxy-Gruppe (oder Hydroxy-Gruppe) an diesem C-Atom für die Stereospezifität dieser Reaktion erforderlich zu sein; denn die Hydrierung des 16-unsubstituierten 3 β -Acetoxy-20-[5-methylpyridyl-(2)]-pregna-5, 20-diens¹², Smp. 167–168°C und $[\alpha]_D^{25} + 4,6^\circ$ (ber. für C₂₉H₃₉NO₂ (433,6) 80,32% C, 9,07% H, 3,23% N; gef. 80,28% C, 9,08% H, 3,27% N) verlief bezüglich C-22 und C-25 nicht stereospezifisch, vielmehr resultierte nach unseren papierchromatographischen Befunden ein Diastereomerenmisch verschiedener 22, 26-Imino-5 α -cholestan-3 β -ole.

Umsetzung von VI mit N-Chlor-succinimid³ führte in 90prozentiger Ausbeute zum N-Chlor-Derivat VII, Smp. ca. 280°C (Zers.) und $[\alpha]_D^{25} - 49,9^\circ$ (ber. für C₂₇H₄₅ClNO₂ (452,1) 71,73% C, 10,26% H, 7,84% Cl, 3,10% N; gef. 72,16% C, 10,41% H, 8,29% Cl, 3,21% N). Beim einstündigen Erhitzen von VII mit überschüssigem Natrium-methylat/Methanol trat HCl-Abspaltung ein. Chromatographie an Al₂O₃ lieferte in 44prozentiger Ausbeute eine Verbindung vom Smp. 168–170°C und $[\alpha]_D^{25} + 114,8^\circ$, die im IR-Spektrum eine starke Bande bei 1648 cm⁻¹ (>C=N-) aufweist und der die Konstitution des (25R)-22, 26-Imino-5 α -cholest-22(N)-en-3 β , 16 α -diols (VIII) zukommt (ber. für C₂₇H₄₅NO₂ (415,7) 78,02% C, 10,91% H, 3,37% N; gef. 78,05% C, 10,98% H, 3,35% N).

Somit findet bei VIII – offenbar aus sterischen Gründen – kein Ringschluss zum Spiroaminoketal statt¹³. Dies steht im Gegensatz zum Verhalten der epimeren CN-ungesättigten 16 β -Hydroxy-Verbindung³, die als solche nicht fassbar ist, sondern nur in der tautomeren, Ring-E-geschlossenen Form, das heisst als Spiroaminoketal-Alkaloid Solaludicin⁵, auftritt. Auch unter energiereicheren Reaktionsbedingungen (20 h Erhitzen mit 10prozentiger methanolischer KOH) erfolgte bei VIII keine Inversion an C-16¹⁴ und dementsprechend keine Cyclisierung. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass für die Synthese tertiärer Basen mit Solanidan-Gerüst (vgl. IX) auch die relativ leicht zu-

gänglichen 16 α -Acetoxy-pregnan-Derivate geeignete Ausgangsverbindungen sind. Darüber hinaus besitzen die synthetisierten Pyridyl- und Piperidyl-Steroide pharmakologisches Interesse¹⁵.

Summary. 3 β , 16 α -diacetoxy-5 α -pregnane-20-one and the analogue pregn-5-ene derivative have been converted into (22R, 25R)-22, 26-imino-5 α -cholestane-3 β , 16 α -diol. The configuration at C-22 and C-25 was determined by transformation into the known (22R, 25R)-5 α -solanidan-3-one. Application of the Ruschig method led to (25R)-22, 26-imino-5 α -cholest-22(N)-ene-3 β , 16 α -diol.

K. SCHREIBER und G. ADAM

Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Forschungsstelle Mühlhausen/Thüringen (Deutschland), 1. Juni 1961.

¹⁰ Zur Methodik vgl. Y. SATO und H. G. LATHAM, J. Amer. chem. Soc. 78, 3146 (1956). – R. KUHN, I. LÖW und H. TRISCHMANN, Angew. Chem. 64, 397 (1952).

¹¹ Y. SATO, H. G. LATHAM und E. MOSETTIG, J. org. Chem. 22, 1496 (1957). Diese Autoren geben für Verbindung VIII Smp. 146–147°C und $[\alpha]_D^{25} + 49^\circ$ (Chlf.) an. Die von Y. SATO und N. IKEKAWA (J. org. Chem. 26, 1945 (1961)) wahrscheinlich gemachte (22R)-Konfiguration wird durch die von uns ermittelten Werte der molaren Rotationsdifferenzen bei der N-Acetylierung, N-Nitrosierung und N-Chlorierung³ von Tetrahydro-solasodin einerseits sowie den beiden an C-22 isomeren Dihydro-tomatidinen andererseits bestätigt (K. SCHREIBER und G. ADAM, unveröffentlicht). Alle diese Konfigurationsordnungen für C-22 sind von der für Solanidin aufgrund stereochemischer Betrachtungen postulierten Raumstruktur abgeleitet (W. E. ROSEN und D. B. ROSEN, Chem. and Ind. 1954, 1581). Ihre endgültige Bestätigung steht noch aus.

¹² Dargestellt aus 3 β -Acetoxy-20-[5-methylpyridyl-(2)]-pregn-5-en-20-ol, das bereits von F. C. UHLE (J. Amer. chem. Soc. 73, 883 (1951); 83, 1460 (1961)) synthetisiert wurde.

¹³ Eine ähnliche, gleichfalls nicht cyclisierende Verbindung, (25R)-16 β , 22-Imino-cholesta-5, 22(N)-dien-3 β , 26-diol, ist von F. C. UHLE und F. SALLMANN (J. Amer. chem. Soc. 82, 1190 (1960)) erhalten worden.

¹⁴ Mit Ringschluss (Lactonisierung) verbundene Epimerisierungen an C-16 sind verschiedentlich beschrieben worden (vgl. A. BOWERS, T. G. HALSALL und G. C. SAYER, J. chem. Soc. (London) 1954, 3070. – N. DANIELI, Y. MAZUR und F. SONDHEIMER, Chem. and Ind. 1958, 1724). – Y. MAZUR, N. DANIELI und F. SONDHEIMER, J. Amer. chem. Soc. 82, 5889 (1960)).

¹⁵ Dem VEB Jenapharm, Jena, insbesondere dem Leiter der dortigen Wissenschaftlichen Laboratorien, Herrn Prof. Dr. A. SCHUBERT, sind wir für die Unterstützung dieser Arbeiten sehr zu Dank verpflichtet.

Synthese von Solanidin aus Demissidin¹

Solanidin² (II) wurde auf folgendem Weg aus Demissidin (I), einem Alkaloid aus der mexikanischen Wildkartoffel *Solanum demissum* Lindl.³, synthetisiert:

Demissidin (5 α -Solanidan-3 β -ol, I)^{3,4} wurde durch Dehydrierung mit CrO₃/H₂SO₄/Dioxan in das bekannte

5 α -Solanidan-3-on^{4, 5} überführt. Dieses lieferte bei der Bromierung in Eisessig in Gegenwart von etwa 2 Mol HBr ein 2, 4-Dibrom-5 α -solanidan-3-on, Smp. 221–224°C und $[\alpha]_D^{25} + 5,2^\circ$ (ber. für C₂₇H₄₁Br₂NO (555,4) 58,38% C, 7,44% H, 28,78% Br, 2,52% N; gef. 58,14% C, 7,46% H, 28,30% Br, 2,67% N; IR-Spektrum: Keto-Bande bei

¹ *Solanum*-Alkaloide. XVII. Mitteilung. – XVI. Mitteilung: K. SCHREIBER und G. ADAM, Exper. 17, 490 (1961).

² Zum Vorkommen von Solanidin vgl. K. SCHREIBER, Chem. Techn. 6, 648 (1954). – K. SCHREIBER, U. HAMMER, E. ITHAL, H. RIPPERGER, W. RUDOLPH und A. WEISSENBORN, Tagungsbericht Nr. 27 der Dtsch. Akad. der Landwirtschaftswiss. Berlin (im Druck).

³ R. KUHN und I. LÖW, Chem. Ber. 80, 406 (1947).

⁴ Vgl. V. PRELOG und O. JEGER, in R. H. F. MANSKE und H. L. HOLMES, *The Alkaloids, Chemistry and Physiology* (New York 1953 und 1960), vol. III, p. 247; vol. VII, p. 343.

⁵ Y. SATO und H. G. LATHAM, Chem. and Ind. 1955, 444; J. Amer. chem. Soc. 78, 3146 (1956).