ÜBER DIE REAKTIVITÄT VON PHOSPHONO- UND
PHOSPHINYLCARBENEN (1)

M. Regitz, H. Scherer und W. Anschutz

Institut für Organische Chemie der Uni-

versität, 66 Saarbrücken 11, Deutschland

(Received in Germany 13 January 1970; received in UK for publication 26 January 1970)

PO-substituierte Carbene (2,3) sind im Gegensatz zu ihren Carbonylanalogen bisher weitgehend unerforscht. Wir haben einige Phosphono- und Phosphinylcarbene auf dem als sicher geltenden Wege der Photolyse (Philips HPK 125 W, Duran-50-Filter) entsprechender Diazoverbindungen (4,5) erzeugt und ihre Reaktivität untersucht.

Cyclohexen wird von Diäthylphosphono-phenyl-carben (IIa) zunächst zum 7-Diäthylphosphono-7-phenyl-norcaran (V) cyclopropaniert. Für endo-ständiges Phenyl spricht neben allgemeinen sterischen Gründen die starke Abschirmung von 2 der insgesamt 8 Methylenprotonen des Cyclohexanringes; sie erscheinen im NMR-Spektrum (CDCl_3) zusammen mit den Cyclopropanprotonen bei $\sigma = 0.3 - 1.1$ ppm. In etwas höherer Ausbeute geht IIa CH-Insertion zum Cyclohexenderivat VI ein. Daneben abstrahiert es Cyclohexen-Wasserstoff unter der Bildung von Diäthylphosphono-phenyl-methyl- und Cyclohexenyl-Radikal (III und IV), die in Form ihrer Dimeren VII und VIII isoliert wurden. Die Radikalkombination III + IV $\rightarrow$ VI (allylständiger Rest) ist ebenfalls möglich. Das Abstraktionsverhalten spricht zumindest für ein teilweises Abreagieren von IIa im Triplettzustand.

Mit Benzol bilden die Carbene IIa und b 1:1- bzw. 1:2-Addukte, denen die Strukturen IXa und b bzw. XIa und b zukommen. Die NMR-Daten (s. Formelschema) belegen eindeutig die Norcaradienstrukturen (6), ohne allerdings geringe Gleichge-

wichtsmengen der valenzisomeren Cycloheptatriene Xa und b auszuschliessen. Die Frage der Temperaturabhängigkeit der NMR-Spektren wird zur Zeit untersucht.

IXa ist chemisch durch Hydrierung zum Norcaran V und durch Diels-Alder-Reaktion mit Maleinsäureanhydrid zum Addukt XII charakterisiert. Diphenylphosphinyl-phenyl-carben (XIVa) liefert mit Benzol ebenfalls ein stabiles Norcaradien [IX, R = Ph; NMR (CDCl₃): δ = 5.6 - 6.3 ppm, 4 olefin. Protonen; δ = 3.3 - 3.7 ppm, 2 Cyclopropanprotonen], während das 1:1-Addukt mit Diphenylphosphinyl-carben (XIVd) in der Cycloheptatrienform vorliegt [X, H statt Ph, R = Ph; NMR (CDCl₃): δ = 5.1 - 5.7 ppm, 1.6-ständige Protonen; δ = 6.1 - 6.8 ppm, 2.3.4.5-ständige Protonen].

Die Photolyse von Phosphinyl-diazomethanen (XIII) in Methanol wurde vor allem auf eine mögliche Wolff-Umlagerung untersucht; sie sollte über die Carbene XIV und die PO-analogen Ketene XV zu den Phosphinsäureestern XVII führen [vgl. l.c. (2)]. Als Konkurrenzreaktion war die OH-Insertion zu den α -Methoxy-phosphin-oxiden XVI zu berücksichtigen. Beide Wege werden mehr oder minder beschränkt (Ausbeuten s. Formelschema). Bemerkenswert scheint die Tatsache, dass sich XIVe nur spurenweise unter Phenyl-Anionotropie vom Carbonyl- zum Carben-Kohlenstoff umlagert. Der XVIIe isomere Diphenylphosphinyl-phenylelessigsäure-methylester

wurde durch DC-Vergleich mit einer authent. Probe nachgewiesen. Die Strukturzuordnung der Isomeren erfolgte auf spektroskopischem Wege. Die Phosphinoxide XVIa-c zeigen im IR-Spektrum PO-Absorption bei $1182 - 1198 \text{ cm}^{-1}$, während sie bei den Phosphinsäureestern VIIc-e bei $1218 - 1234 \text{ cm}^{-1}$ auftaucht. Im NMR-Spektrum (CDCl_3) findet man für XVIa-c das Methinproton als Dublett bei $\delta = 4.5 - 5.0 \text{ ppm}$ ($J = 11 - 13 \text{ Hz}$) und die OCH_3 -Gruppe als Singulett bei $\delta = 3.3 - 3.4 \text{ ppm}$. In den Estern VIIc-e erscheint das Methinproton (bzw. die CH_2 -Gruppe von VIIId) ebenfalls als Dublett bei $\delta = 3.3 - 3.5 \text{ ppm}$ aber mit $J = 17.5 - 19 \text{ Hz}$; auch das OCH_3 -Signal ist aufgespalten ($\delta = 3.6 - 3.7 \text{ ppm}$, $J_{\text{POCH}} = 11 \text{ Hz}$). Ob die Spinzustände der Carbene für die Reaktionsrichtung verantwortlich sind, wird z.Z. untersucht.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemischen Industrie danken wir für finanzielle Unterstützung.

Literatur

- (1) X. Mitteilung über Untersuchungen an Diazverbindungen und Aziden, IX. Mitteilung: M.Regitz und G.Himbert, Liebigs Ann.Chem. 1970 (im Druck).
- (2) M.Regitz, W.Anschütz, W.Bartz und A.Liedhegener, Tetrahedron Letters 1968, 3171.
- (3) D.Seyferth, P.Hilbert und R.S.Marmor, J.Am.chem.Soc. 89, 4811 (1967).
- (4) M.Regitz, W.Anschütz und A.Liedhegener, Chem.Ber. 101, 3734 (1968).
- (5) M.Regitz und W.Anschütz, Chem.Ber. 102, 2216 (1969).
- (6) Zusammenfassung: G.Maier, Angew.Chem. 79, 446 (1967); Angew.Chem.internat. Edit. 6, 402 (1967).