REAKTIVITÄT VON STICKSTOFF-HETEROCYCLLEN
 GEGENÜBER CYCLOOCTIN ALS DIENOPHIL

J. Balcar, G. Chrisam, F.X. Huber und J. Sauer*

Institut für Organische Chemie der Universität Regensburg,
 Universitätsstr. 31, D-8400 Regensburg (West Germany)

Abstract: The cycloaddition rate of cyclooctyne to a number of N-containing heterocyclic compounds can be correlated with the reduction potentials of these dienes provided steric substituent effects are approximately equal.

Orbitalsymmetrie-kontrollierte (4+2)-Cycloadditionen des DIELS-ALDER-Typs lassen sich in vielen Fällen durch Gleichung (1) beschreiben ^{1,2}.

$$(1) \quad \Delta E = \frac{(c_{1HO} \cdot c_{1'LU} \cdot a_{11'} + c_{4HO} \cdot c_{2'LU} \cdot a_{42'})^2}{E_{HO(Dien)} - E_{LU(Phil)}} + \frac{(c_{1LU} \cdot c_{1'HO} \cdot b_{11'} + c_{4LU} \cdot c_{2'HO} \cdot b_{42'})^2}{E_{HO(Phil)} - E_{LU(Dien)}}$$

Bei normalen DA-Reaktionen wird bei Näherungsbetrachtungen der zweite Term vernachlässigt, bei (4+2)-Cycloadditionen mit inversem Elektronenbedarf dagegen Term 1.

Wir haben die Geschwindigkeit der Reaktion der Heterocyclen 1 - 8 mit Cyclooctin als Dienophil in Nitrobenzol gemessen ³. Wir nehmen an, daß die primär erfolgende (4+2)-Cycloaddition der RG-bestimmende Schritt, die sich anschließende N₂-Abspaltung vergleichsweise sehr rasch ist. Unter den Bedingungen der kinetischen Messungen wurden die erwarteten Produkte 9 - 12 in hohen Ausbeuten isoliert und spektroskopisch charakterisiert ⁴.

Die Heterocyclen 1 - 8 gehören den Diensystemen mit inversem Elektronenbedarf an ¹. Da in der gesamten Serie das gleiche Dienophil verwendet wurde, kann man in erster Näherung den Zähler des 2. Terms gleich 1 setzen ¹; Gleichung (1) vereinfacht sich somit zu Gleichung (2). Bei gleichem Dienophil innerhalb unserer Serie sollte die RG direkt von E_{LU(Dien)} bestimmt werden. Wir haben

$$(2) \quad \Delta E \approx \frac{1}{E_{HO(Phil)} - E_{LU(Dien)}}$$

die experimentell gemessenen Halbstufenreduktionspotentiale der Diene ⁵ als relatives Maß für die LUMO-Energie des Diens verwendet. Die Tab. gibt die k-Werte der Cycloaddition und die -E_{1/2}-Werte der Diene wieder. Die Abb. zeigt die Auftragung log k₂ gegen -E_{1/2}, wie sie sich für die

Abb. Auftragung $6 + \log k$ der Cycloaddition von Cyclooctin an die Diene 1 - 8 gegen deren Halbstufenpotentiale.

Tab. Kinetische Daten ($k_2 \cdot 20^\circ$ [l/mol · s] in Nitrobenzol) für Cycloadditionen von 1 - 8 mit Cyclooctin und Halbstenpotentialiale 5 ($-E_{1/2}$ in Acetonitril) der Diene 1 - 8

Dien	$10^6 \cdot k_2$	$-E_{1/2}$	Dien	$10^6 \cdot k_2$	$-E_{1/2}$
<u>1</u> R ¹			<u>4</u> R ⁴		
a C ₆ H ₅	12 100 000	1.22	a C ₆ H ₅	1.20	1.89
b p-MeOC ₆ H ₄	8 480 000	1.25	b CO ₂ CH ₃	69.0	1.69
c p-ClC ₆ H ₄	17 600 000	1.17			
d m-CF ₃ C ₆ H ₄	31 200 000	1.14			
			<u>5</u> R ⁶		
<u>2</u> R ²			a p-NMe ₂ C ₆ H ₄	239	1.81
a p-MeOC ₆ H ₄	20 700	1.30	b p-MeOC ₆ H ₄	714	1.72
b m-MeOC ₆ H ₄	78 200	1.22	c p-CH ₃ C ₆ H ₄	1 100	1.68
c p-ClC ₆ H ₄	92 600	1.15	d C ₆ H ₅	1 420	1.64
d m-ClC ₆ H ₄	133 000	1.13	e p-ClC ₆ H ₄	1 910	1.58
e p-CH ₃ C ₆ H ₄	32 000	1.27	f m-CF ₃ C ₆ H ₄	2 790	1.53
f m-CH ₃ C ₆ H ₄	51 600	1.25		8 280	1.09
g p-NO ₂ C ₆ H ₄	544 000	1.01			
h m-NO ₂ C ₆ H ₄	374 000	1.03	<u>6</u> R ⁷		
i C ₆ H ₅	65 400	1.24	a H	1 260	1.43
j CO ₂ CH ₃	346 000 000	0.84	b H	598	1.46
			c CH ₃	47.8	1.44
<u>3</u> R ³					
a H	286	1.96			
b CH ₃	12.4	2.03			
c C ₆ H ₅	44.4	1.95			
d CO ₂ CH ₃	1 520	1.75			
			<u>8</u> R ⁹		
			a C ₆ H ₅	1 390	1.42
			b p-MeOC ₆ H ₄	661	1.48
			c p-NO ₂ C ₆ H ₄	3 610	1.37
			d p-MeOC ₆ H ₄	922	1.50

Cycloaddition des Maleinsäureanhydrids an substituierte Anthracene bewährt hatte ⁶.

Aus der graphischen Auftragung der Abb. lassen sich folgende Effekte ablesen:

1. Vergleicht man alle kinetischen Daten, so ergibt sich keine lineare Korrelation sondern nur ein breites Band einer Korrelation.
2. Die in der Abb. eingezeichneten Geraden verbinden kinetische Meßpunkte gleichen Substitutionsgrades mit Substituenten ähnlichen Raumbedarfs, nämlich 3-substituierte 1,2,4-Triazine resp. 1,2,4,5-Tetrazine (Gerade 1), 5-Aryl-1,2,4-triazin-3-carbonsäureester (Gerade 2) und Heterocyclen mit Substituenten in den Positionen 1 und 4 des Dien-Systems (Gerade 3). In diesen drei Fällen findet man befriedigende lineare Korrelationen.
3. Sofern die sterischen Verhältnisse nicht vergleichbar sind, liegen die Punkte nicht auf den Geraden (z.B. 3a, 6 und 7c). Einen interessanten sterischen Effekt zeigt z.B. die Serie 3a → 3c → 4a; bei vergleichbarem Halbstufenpotential sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit mit zunehmender Substitution des Diensystems drastisch ab. Aus dem gleichen Grunde liegen mono-substituierte bzw. disubstituierte Triazin- und Tetrazin-Derivate auf verschiedenen Geraden.

Soweit von uns überprüft, ist der Einfluß einer Lösungsmittelvariation auf die Reaktionsgeschwindigkeit klein, die $\Delta S^\ddagger$ -Werte liegen zwischen -30 und -40 Entropieeinheiten.

Wir schlagen als halbquantitatives experimentelles Maß für die Abschätzung der Reaktivität elektronarmer Diene bei DIELS-ALDER-Reaktionen mit inversem Elektronenbedarf die Halbstufen-Reduktionspotentiale der Diene vor. Wir untersuchen zur Zeit, inwieweit sich die von uns gefundene Korrelation auch auf Reaktionen mit unsymmetrischen Dienophilen übertragen läßt.

Dem Fonds der Chemischen Industrie und der BASF AG sei für Sachspenden bestens gedankt.

LITERATUR

Herrn Professor Dr. K. Weissermel zu seinem 60. Geburtstag gewidmet.

- (1) Eine Literaturübersicht bieten J. Sauer und R. Sustmann, Angew. Chem. 92, 773, [1980].
- (2) Dien: C₁, C₄; Dienophil = Phil: C₁'C₂'. HO = HOMO; LU = LUMO.
- (3) Die sehr schnell verlaufenden Reaktionen von 1 und 2 wurden spektroskopisch an den Maxima der (n → π*)-Übergänge verfolgt, die langsameren anhand der N₂-Entwicklung gasvolumetrisch. Sofern nicht bei 20 °C selbst gemessen werden konnte, wurden die in Tab. angegebenen k-Werte aus Aktivierungsparametern errechnet. Im Regelfall sind die k-Werte auf ± 3% reproduziert. Zumeist wurden die Reaktionen zwischen 10 - 90% Umsatz verfolgt. Die experimentell gemessenen k₂-Werte für die Umsetzungen der Diene 7 wurden mit einem statistischen Faktor 2 korrigiert, da nur ein Angriff des Dienophils von einer Seite möglich ist.
- (4) Alle neuen Verbindungen zeigten korrekte CHN-Werte, die spektroskopischen Daten stehen mit den Strukturvorschlägen im Einklang; aus 7c erhielt man nicht das Cycloheptatrien-Derivat 11c sondern das valenzisomere Norcaradien-Derivat.
- (5) T. Troll, Electrochimica Acta 27, 1311 [1982].
- (6) A. Mielert, C. Braig, J. Sauer, J. Martilli und R. Sustmann, Liebigs Ann. Chem. 1980, 954; dort wurde das Oxidationspotential der Anthracene, dem HOMO (Dien) entsprechend, aufgetragen.

(Received in Germany 17 January 1983)